



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>





600030940M

E. 69. m. $\frac{3}{1-3}$.



E. BIBL. RADCL.

*10.
C. 2.*

*13.
1-3.*

~~17. 2~~


H. 12.

C

19149

e. 12.







CURTII SPRENGEL

PROF. BOT. HAL.

FLORAE HALENSIS

TENTAMEN NOVUM.

CUM ICONIBUS XII.

HALAE SAXONUM

SUMTIBUS C. A. KÜMMELII.

1806.



LECTURIS SALUTEM

AUCTOR.

Alter incipit et vicesimus annus, cum Halam Saxonum primum salutarem, peragratu ab ineunte adolescentia Pomeraniae anterioris et Megapolitani ducatus partibus. Ager vero halensis me primis iam annis, quum iuvenis esse coepi, adeo delectavit varietate plantarum et locorum amoenitate, ut cum amicis pervagari totam hanc regionem statuerem. Attamen aliena dein officia obstiterunt; per duodecim, qui sequebantur, annos, paucas duntaxat sylvas, pauca montium iuga percurrere potui. Suscepta autem ante hos novem annos botanicae disciplinae provincia, nullum praetermittendum mihi esse officii mei aut studii munus, maximeque agri halensis divitias herbarias perquirendas esse sensi. Magis magisque hoc studii vitaeque genere oblectatus, omni annorum ultimarum tempore, vel auditoribus botanophilis comitatus, vel solus et-

[1] *

iam adii prata, paludes, sylvas, montes omniaque loca, quae citra quam quatuor milliaria remota sunt ab urbe nostra.

Leysseri venerabilis floram halensem primis annis sequens, mox animadverti, eam, ut rite adolescentes instruantur, haudquaquam sufficere. Quae desideravi, haec fere sunt:

1. Characteres generici et specifici e Linnaei scriptis mutuo sumti saepe differunt a veritate.

2. Multae plantae, ab optimo Leyssero, duces Knauthium et Buxbaumium sequente, indicatae frustra in nostra regione quaeruntur. Non inficior, plures earum olim quidem forte repertas fuisse, sed quum per hos viginti annos nec ab amicis nec a me ipso observatae fuerint, satius duxi eas omittere.

3. Omissae plantae, quae hic sponte crescunt, 94 perfectae et 416 imperfectae, ut loco 1277 flora nostra 1787 numeros contineat.

4. Ultimae classis διακρίσις a nostrorum temporum cognitione longe aliena. Hinc factum est, tirones, qui his imperfectis organicis operam dare volunt, vel summis

impensis pleraque opera recentiora emere debere, vel ab omni omnino eiusmodi studio abstinere. Plures eorum, qui semet quotannis in disciplinam meam tradunt, quibusque naturae amor consuetudinem mecum facere solet, conqueri memini has studii eximii difficultates.

Itaque adgressus sum hoc opusculum eo potissimum animo, ut tironibus faciliorem munirem viam expeditioremque, qua plantarum indigenarum cognitionem sibi parare possint. Quae praestitisse mihi videor, brevius hic monendum esse existimo:

1. *Nullam plantam flōrae nostrae adiudicavi, nisi quam ipse inveni; pauculis exceptis, quae ab amicis fide dignissimis reperiuntur † signo notantur. Gratus agnosco, me amicissimi Kohlii, pharmacopolae Halensis meritissimi, Krusii paedagogi Trebitzensis, Fischeri Halberstadiensis, qui iam Razumovianorum hortorum curam gerit, auditorum denique egregiorum Schulzmorlini Vindelici, Schwieii, pharmacopolae, Fischeri Silefiaci, auxiliis multa debere. . . . Eas species, quas nec Leysserus nec Wohlleben habet, asterisco * notavi.*

2. *Loca natalia curatius indigitare sat-egi; eoque fine circumscripsi vicinas urbi nostrae regiones circulo, cuius radius ubique quatuor milliarja continet, Intra eum circulum pauca me etiamnum latent loca, quorum plantas nondum perquisiverim. Hinc diligenter notavi, quae ad Friburgum usque, quae per Mansfeldiam etc, crescunt.*

3. *Characteres genaricos et specificos ubique et ad meas et ad Acharii, Gärtneri, Jussieui, Lamarkii, Personii, Rothii, Schkuhrii, Schraderi, Smithii, Swartzii, Willdenowii aliorumque observationes emendare studui. Hinc plures plantas longe alio loco constitui, quam qui iis a Linnaeo et Willdenowio adiudicatur. Quod nusquam temere fecisse mihi videor, raro etiam absque auctoritate.*

4. *Synonyma nulla addidi, nisi necessaria Linnaei, Willdenowii, Leysseri paucorumque aliorum,*

5. *Icones ubique optimas studiose addidi,*

6. *Novas species paucas e classe ultima indicavi.*


7. *Classium ordinem alio modo ac vulgo*

fieri solet, institui, summi praepriis Vahl-
lii consilio motus et auctoritate. Classes
Linnaei penultimam et undecimam, utpote
haud idoneas, quasque Linnaeus ipse senex
refecandas esse iudicavit, penitus omisi; se-
ptimam autem rescidi, quod Trientalis an-
theras, numero septenario haudquaquam ad-
strictas esse observavi. Genera in classum
clavibus ita dispescui, ut meliorem tironi-
bus conspectum praeberent.

8. Classi ultimae novum nomen, quod
magis idoneum mihi videbatur, imposui,
licet a novorum nominum adfectione lon-
ge aliepus sim. Plausibusne id dignum iu-
dicetur, expectandum est.

Quae quidem licet omnia summo studio
facta sunt, ingenue tamen fateor, mihimet
ipfi haudquaquam satis fecisse. Certum enim
et exploratum habeo, si alios novem annos
elaborandae huic florae dicare potuissem, mul-
to magis absolutam et a mendis liberam eam
fuisse. Plura iam monuit Bernhardius ami-
cus, plura monebunt alii. At vero consulen-
dum erat auditorum necessitatibus, maxime
quum nullus nostrum vitae suae terminos sta-
tuere possit, quumque officii mei semper du-





sunt lithanthraces cum pyrite et spatha calcareo.

8. Ligna bituminosa passim ad Langendagen, Zscherben, Döllnitz etc. stratis alternis cum luto et argilla proveniunt.

9. Clivosa maxime regio est Mansfeldensis et Friburgensis; planissimae provinciae Delitzschensis, Martisburgensis et Cotheniensis. Clivi nostri calcarei, e porphyrite et τῷ ἰσχυρῷ καυλίμινῳ constituti, plantarum feracissimi sunt. Rariores subalpinae sunt:

Agrostis alpina	Oxytropis pilosa
Sesleria coerulea	———— montana
Plantago Wulffenii	Trifolium strictum
Campanula barbata	Hypericum Kohlianum
Seseli Hippomarathrum	Hieracium florentinum
Euphorbia Gerardiana	Sonchus alpinus
Helianthemum vineale	Artemisia salina
———— Fumana	Cineraria campestris
Teucrium Botrys	Aster Amellus
———— montanum	Carduus cyanoides
Euphrasia lutea	Asplenium Adiantum
Thlaspi perfoliatum	nigrum
———— alpestre	Lichenum etiam alpe-
Brassica orientalis	strium cohors.

10. *Humus vegetabilis agros fertilissimos facit; est autem plerumque lutosa, in vicinia Halae, Martisburgi, Delitzschii, Cothenii etc., aut calcarea per comitatum Mansfeldensem et provinciam Friburgensem passim, aut e τῷ ἐρυθρῷ περικλιμένῳ orta, aut saltem ex argillarubra, circa Hettstadium, Rothenburgum etc. Campi sabulosi fere defunt, nisi tractus haud magnos pone Nietleben, inter Rocken- et Mittelholz, ad Hettstadium etc., iis adnumerare velis.*

11. *Sylvarum et nemorum haud ingens est numerus; neque sylvae satis vastae, neque nimis frondosae, neque nemora a pecorum incurfu immunia. Proxima sylva est Heide, inter Dölau et Nietleben, pinubus, quercubus, betulis confita, montosa pariter ac paludosa, oblectamentum nostrum. Paullo remotiora sunt nemora clivosa Zörge et Lindberg hinter der Heide, Rocken- und Mittelholz hinter Guttenberg: haec praeprimis feracia et amoena, quum pecorum incurfus prohibitus sit. Hic Veronicam spuriam et foliosam, Scorzoneram roseam, Laserpitium latifolium et pru-*

thenicum, Dianthum superbum, multasque alias rariores plantas invenies.

Pretiosissimae autem sylvae nostrarum regionum sunt Erdebornensis, Schmonensis et Loderslebenensis, fagis et quercubus opulentissimae, satis umbrosae, et montosae et paludosae. Ibi Orchides eximiae, Senecio nemorensis et ingens imperfectarum plantarum cohors adest. Eximiae etiam sylvae, die Giehlen dictae, in provincia Friburgensi, ad Schleberode et Ebersrode, nemus Branderodense, nemuscula ad Müncherode et Mücheln haud infimae notae sunt. Mansfeldia ipsa, circulus Salicus, principatus Cotheniensis, provincia Delitzschensis sylvas paucas habent.

12. *Prata copiosa, maxime ad ripas fluviorum Salae et Unstrut; feracia ea et plantis locupletissima, Peucedanum Silaus, Rhinanthus Crista Galli, Pastinaca sativa, Daucus Carota, Geranium pratense, Chrysanthemum Leucanthemum fere omnia prata nostra implent.*

13. *Paludes paucae, neque ingentes, neque satis umbrosae. Hinc caustogassa aut turfa nonnisi ad Dölau, Zabenjiädt*

(cum calce et conchis Schreber lithogr. hal. p. 68. 69.) Bendorf bei Delitzsch et paucis aliis locis invenitur. His paludibus propriae sunt rariores *Tofieldia palustris*, *Salix fusca*, *repens*, *Eriophorum vaginatum*, *Tetraphis pellucida*. Nec apud nos nisi unico loco *Caltha palustris*; rarissimum *Comarum palustre*; nullum, quod sciam, *Ledum palustre*, nulla *Andromeda polifolia*. Paludes tamen circa Bitterfeld egragiam certe messim largiuntur.

14. De aquis locuturi, satis mirari nequimus, nostram mediterraneam regionem plantas maritimas plures nobis impertire, quae et ad lacus salfos (alterum perperam dulcem dictum, quum fere aequè salus sit) et in pratis variis crescunt. *Salicornia* enim, *Chenopodium maritimum*, *Samolus Valerandi*, *Aster Tripolium*, *Glaux maritima* cum *Confervis* plurimis prata incolunt, lacubus his et rivo Salzke dicto, qui ex iisdem aquam in Salam devehit, vicina.

15. Fluvius unicus Sala a Leucopetra inde variis anfractibus et inter praecipites plurimum rupes, ad Alsleben usque nostram

impensis pleraque opera recentiora emere debere, vel ab omni omnino eiusmodi studio abstinere. Plures eorum, qui semet quogannis in disciplinam meam tradunt, quibusque naturae amor consuetudinem mecum facere solet, conqueri memini has studii eximii difficultates.

Itaque adgressus sum hoc opusculum eo potissimum animo, ut tironibus faciliorem munirem viam expeditioremque, qua plantarum indigenarum cognitionem sibi parare possint. Quae praestitisse mihi videor, brevius hic monendum esse existimo:

1. *Nullam plantam flôrae nostrae ad-iudicavi, nisi quam ipse inveni; pauculis exceptis, quae ab amicis fide dignissimis reperi-tae † signo notantur. Gratus agnosco, me amicissimi Kôklli, pharmacopolae Halen-sis meritissimi, Krusii paedagogi Treb-nitzenfis, Fischeri Halberstadiensis, qui iam Razumovianorum hortorum curam gerit, auditorum denique egregiorum Schulz-morlini Vindelici, Schwieii, pharma-copolae, Fischeri Silefiaci, auxiliis multa debere. . . . Eas species, quas nec Leyfserus nec Wohleben habet, asterisco * notavi.*

haerens, tandemque ad Osendorf in Elsteram effusus; die Salzke, quam iam supra memoravimus, et pauci alii.

16. *Excursionum botanicarum utiliter instituendarum regio nostra uherrimam offert occasionem. Sunt enim loca, haud adeo remota, quae vel Linnaeus ipse optatissima nuncupasset: e. g. pagus Kölmensis, cuius monticuli calcarei et stagnum salsum tum alpestres tum marinas largiuntur plantas; nemusculum Seebense, nemora pone Gutenberg. Musci etiam, fungi et gastromyi in sylvis nostris, maxime in nemore paludoso ad Nietleben, copiose proveniunt. Hinc fit, ut tirones, qui sedulo me comitantur, prima aestate facile possint ultra mille plantas colligere.*

Conferantur omissa, pag. 417—420, rago.

CLASSIS I.
MONANDRIA.

MONOGYNIA.

Flores incompleti.

1. **HIPPURIS.** *Cal. obsoletus semen coronans. Cor. o. Stigma simplex. Nucula 1-sperma.*
2. **SALICORNIA.** *Cal. o. Cor. o. Squamæ amenti ternæ partes fructificantes includunt. Stylus bipartitus. Sem. 1.*

DIGYNIA.

Flores incompleti.

3. **CALLITRICHE.** *Cor. 2-petala, petalis canaliculatis. Sem. 4 nuda membranaceo-marginata.*

*Orchis, Ophrys, Neottia, Epipactis (XVII).
Alchemilla Aphanes (IV). Zannichellia alustris (XVIII). Salix Helix, purpurea (XX).*

MONOGYNIA.

1. HIPPURIS.

1. *H. VULGARIS*, foliis verticillatis subdenis linearibus acutis. *Curt. n. 48. Fl. dan. 87.*

In aquis stagnantibus ad Passendorf, in piscinis ad Dieskau, in lacu ad Kölme, ad ripas Elsterae pone Radewell. . . Maio, Iunio. 4

2. SALICORNIA.

2. *S. HERBACEA*, geniculis compressis emarginatis, internodiis obconicis, amentis pedunculatis. *Pall. haloph. fasc. 1. tab. 1—3. Fl. dan. 303.*

Varietates duae apud nos occurrunt:

a. *S. prostrata*, *Pall. tab. 3.* caule ramosissimo divaricato trifariam prostrato, articulis apice sub sinuatis, amentis crebris oppositis terminalibus.

ß. *S. acetaria*, *Pall. tab. 1.* annua strictim erecta subramosa rubra, amentis cylindricis oppositis terminalibus.

Utraque copiosissime ad lacum salsum prope Rolsdorf et Seeburg, an der Salzke bei Benken-
dorf und Kölme, ad piscinas Dieskavienles, ad
Dürrenberg. Sept. Oct. ☉

Duo stamina, quae *Försterus* (*Philos. trans-
act. vol. LVII. 1767. tab. 312.*) et *Mührlingius*
(*Ehrharts Beytr. VII. p. 178*) observarunt, in
hac solummodo specie interdum occurrunt.

DIGYNIA.

3. CALLITRICHE.

3. *C. VERA*, monoica, foliis inferioribus oblongis, superioribus subrotundis integerrimis. *Flor. dan. 129.*

In aquis stagnantibus et fossis prope der Fasanerie, Passendorf, auf dem Badeplatz. Maio. ☉

MONANDRIA.

8

4. *C. INTERMEDIA*, hermaphrodita, foliis inferioribus linearibus apice bifidis, superioribus ovalibus emarginatis. *Schk. t. 1. fig. 6. Sturm I. 3.*

Ibidem, sed rarius. Mai. Aug. ☉

5. *C. AUTUMNALIS*, hermaphrodita, foliis omnibus linearibus apice bifidis. *Lüfel fl. pruss. t. 38.*

Ibidem, praesertim vero ad Holzweilig in fossis. Aug., Sept. 4

Folia summa in tribus his speciebus rosulam formant, ut caespites adpectu formosi aquae innatare videantur.

CLASSIS II.

D I A N D R I A.

MONOGYNIA.

* *Flores completi inferi monopetali regulares.*

4. *LIGUSTRUM*. *Cal.* 4-dentatus. *Cor.* 4-fida. *Bacca* 2-locularis, loculis sub 2 spermis.

5. *SYRINGA*. *Cal.* 4-dentatus. *Cor.* infundibuliformis, limbo 4-fido. *Caps.* 2-locularis, seminum margine membranaceo.

** *Flores completi inferi monopetali irregulares. Fructus capsulares.*

1 *

4 CLASSIS II. DIANDRIA.

6. VERONICA. *Cal.* 4- raro 5-partitus.
Cor. rotata 4-fida subinaequalis. *Capsf.*
2-locularis obcordata.

7. GRATIOLA. *Cal.* 5-partitus. *Cor.*
2-labiata resupinata. *Stam.* 2 sterilia.
Stigma 2-lobum. *Capsf.* 2-locularis,
dissepimento valvis parallelo.

8. UTRICULARIA. *Cal.* 2-phyllus ae-
quâlis. *Cor.* ringens calcârata. *Capsf.*
1-locularis.

*** *Flores completi inferi monopetali.*
Fructus nudi.

9. LYCOPUS. *Cal.* tubulosus 5-fidus.
Cor. tubulosa subaequalis 4-loba, lobo
superiori latiori emarginato. *Semina*
4 retusa.

10. SALVIA. *Cal.* subcampanulatus 2-la-
biatus. *Cor.* ringens. *Filamenta* basi
pedicello transverso adfixa. *Semina* 4
elliptica saepe mucilaginosâ.

**** *Flores completi superi.*

11. CIRCAEA. *Cal.* 2-phyllus superus.
Cor. 2-petala. *Capsf.* 2-locularis non
dehiscens, loculis 1-spermis.

***** *Flores incompleti.*

MONOGYNIA.

5

12. **FRAXINUS.** *Cal.* o. *Cor.* o. *Stamina* hypogyna; antherae subsessiles. *Stigma* 2-fidum. *Samara* 2-ocularis. *Semen* 1 vel pauca pendula.
13. **LEMNA.** *Cal.* 1-phyllus latere dehiscens. *Antherae* didymae. *Stigma* capitatum. *Capf.* 1-ocularis.

DIGYNIA.

14. **ANTHOXANTHUM.** *Gluma ext.* 1-flora 2-valvis. *Gluma int.* 2-valvis oblonga aristata. *Cor.* 2-petala petalis obtusis.

Salicornia herbacea (I). *Schoenus albus* (III). *Lepidium ruderae* (XII). *Cypripedium*. *Calceolus* (XVII). *Salix* (XX).

MONOGYNIA.

4. LIGUSTRUM.

6. **L. VULGARE**, foliis oblongo-lanceolatis integerrimis glabris, thyrsis terminali. *Curt. n.* 51. *Fl. dan.* 1141. *Sturm.* I. 14.

In sepibus, dumetis et collibus nemorosis frequentissime. *Iun.* ‡

5. SYRINGA.

7. **S. VULGARIS**, foliis ovato-cordatis. *Sturm.* I. 2.

In sepibus circa suburbia et pagos frequens. *Maior.* ‡



CURTII SPRENGEL

PROF. BOT. HAL.

FLORAE HALENSIS

TENTAMEN NOVUM.

CUM ICONIBUS XII.

6. VERONICA.

Floribus terminalibus spicato-racemosis.

- * 8. V. LONGIFOLIA, foliis oppositis ternis quaternisque cordato-lanceolatis acuminatis inaequaliter duplicato-ferratis cauleque pubescenti-tomentosis. *Schrader Veronic. p. 26. 27. tab. II. fig. 1. (Icon nostra tab. I.)*

In pratis humidis et dumetis, auf der Pösnitz, bei Radewell, Liebenau, Seeben und Guttenberg. Jul. 4

V. maritima L., quam Leyfserus hic adfert, diversa est foliis lineari-lanceolatis, ovata basi, carinatis, subquaternis fasciculatis: cuius iconem praestantissimus Schraderus exhibet tab. I. fig. 1. comment. cit. Crescit autem solummodo in Scandinavia.

- * 9. V. FOLIOSA, foliis ternis quaternisque ovato-lanceolatis subsessilibus inaequaliter duplicato-ferratis. *Kitaibel hungar. II. f. 102: Schrader l. c. p. 35. tab. II. fig. 5. (Icon nostra tab. I.)*

In collibus nemorosis Zorge, Lindberg, Rokenholz et Mittelholz, Hackenholz bei Brandenrode. Jul. Aug. 2

- * 10. V. SPURIA, foliis ternis quaternisque subsessilibus lanceolatis simpliciter aequaliter serratis. *Schrader l. c. p. 36. tab. II. f. 4. (Icon nostra tab. I.)*

In der Schleberoder Giehle, im Mittelholze, nemoribus umbrosis. Aug. 2

Nullibi in Germania inveniendam esse hanc speciem Schraderus adseverat; sed vere adesse patet e figura.

11. V. SPICATA, foliis oppositis oblongis obtusiusculis crenatis cauleque villosa-pubescentibus, radicalibus obovatis in petiolum decurrentibus, caulinis basi angustatis. *Fl. dan. 52. Engl. bot. 2.*

In pratis editioribus, calcareis ad Giebichenstein, Seeben, Hohenthurm, Bennstädt, Kölmme, Erdeborn etc. Iul. Aug. 2

Vidi varietatem foliis ternis canaliculatis, quae V. complicatae Hofm. phytogr. Blätter, S. 98. satis adfinis esse videtur. Saepius etiam foliis linearibus subintegris, aut spicis pluribus aggregatis occurrit.

12. *V. HYBRIDA*, foliis oppositis ellipticis crenatis cauleque scabro pubescentibus, radicalibus petiolatis ovatis. caulinis subsessilibus. *Engl. bot.* 637. *Willdenow in Schraders Journ.* 1799. I. tab. 3.

In pratis nemorosis ad Loderleben, Hornsburg, sed rarissime. Iul. Aug. 2

Differt a priore foliis radicalibus petiolatis, tum pube tenuiori, quae viridem non mutat superficiem, quum in V. spicata villosa potius adsit pubes, quae canittem plerumque producit.

13. *V. OFFICINALIS*, foliis oppositis oblongis serratis cauleque radicante adscendente villosis, floribus distantibus. *Curt. n.* 33. *Fl. dan.* 248.

In sterilibus sylvestribus der Dölauer Heide, dem Zorge, Lindberg, Seeben, hinter Kröllwitz, bei Gutenberg et alibi copiose. Iun. Iul. 2

14. *V. SERBYLLIFOLIA*, foliis oppositis ovali-oblongis obsolete dentatis trinerviis glabris, bracteis pedicellos excedentibus, *Curt. n.* 5. *Fl. dan.* 492. *Engl. bot.* 1075.

In pratis, pascuis beim Fasanenhause, Schlettau, Wörmnitz. Iun. 2

*** Floribus lateralibus racemosis; foliis oppositis.*

15. *V. BECCABUNGA*, foliis subrotundo-ovalibus obtusis obsolete serratis, caule radicante. *Curt. n.* 15. *Fl. dan.* 511. *Sturm I.* 11.

In fossis et rivulis pone Geistthor, ad Guten-
berg, Teicha, Lettin etc. Maio, Iul. 24.

16. *V. ANAGALLIS*, foliis semiamplexicaulibus lanceolatis serratis, caule erecto. *Curt. n. 56.*
Fl. dan. 903.

In fossis et paludibus ad Nietleben, Lieskau,
Schlettan, Schkopa etc. Iul. 30.

17. *V. SCUTELLATA*, foliis lineari-lanceolatis subintegerrimis, pedunculis pendulis. *Curt. n. 56.*
Fl. dan. 209.

In inundatis auf der grossen Wiese, in Pulver-
weiden, ad Dölau, Nietleben, Radewitz, Lo-
chau etc. Iul. 24.

*Caulis debilis teres inferne repens; folia sessi-
tia subdenticulata, pedicelli capillares post anthe-
sin penduli: corolla dilute coerulea, laciniis super-
rior venis rubicundis picta.*

18. *V. PROSTRATA*, foliis oblongo-lanceolatis obtu-
sis inciso-serratis, caule ascendente. *1. Bauh.
hist. III. 287.*

In collibus apricis ad Kröllwitz, Granau, Quil-
schina, Höhnstädt, Hohenthurm etc. Iun. 24.

19. *V. TEUCRIUM*, foliis inferioribus oblongis superio-
ribus ovato-oblongis grosse serratis rugosis cau-
leque villosis. *Roths neue Beytr., I. p. 69.*

In nemoribus et pratis, auf der Peisnitz, in der
Lucke, in dem Görz bei Wörmnitz. Iun. 24.

20. *V. CHAMAEDRYS*, foliis ovatis sessilibus rugosis
inciso-serratis, caule utrinque linea pilosa.
Curt. n. 4. Fl. dan. t. 418.

In pomariis, pratis, pascuis, sepibus, nemori-
bus fere ubique. Maio, Iun. 24.

*** *Floribus solitariis axillaribus.*

21. *V. PRAECOX*, foliis inferioribus cordatis inciso-
serratis petiolatis, summis oblongis subintegerrimis.

rimis sessilibus, caule erecto simplici pubescente. *Allion. auctar. tab. I. fig. 1.*

In agris vor der Heide, ad Kröllwitz, zwischen Rockenholz und Gutenberg, ad Wansleben, April, Maio. ☉

22. *V. AGRESTIS*, foliis cordato-ovatis inciso-serratis pedunculo brevioribus, laciniis calycis fructiferi cernui ovalibus, caulibus procumbentibus. *Curt. n. 7. Fl. dan. 449.*

In pomariis, hortis, agris et arvis frequens. April. ☉

Planta tota licet pilis raris praedita, folia tamen nitida imò lucida apparent, imò petiolata summa sessilia, corolla coerulea vel albida.

23. *V. ARVENSIS*, foliis ovatis serratis, floralibus lanceolatis pedunculo longioribus, laciniis calycis inaequalibus. *Curt. n. 23. Fl. dan. 515.*

In hortis, pomariis et agris, frequens. April, Maio. ☉

Planta tota hirsuta erecta: folia imò longe petiolata, flores subsessiles pallide coerulei aut subrubicundi.

24. *V. HEDERAEFOLIA*, foliis cordatis quinquelobis, lobo medio maximo, pedunculo brevioribus, laciniis calycinis cordatis acutis ciliatis. *Curt. n. 19. Fl. dan. 428.*

In hortis, pomariis, agris, vulgatissima. April, Maio. ☉

Caules prostrati, uti tota planta, villosi; folia primo adpectu triloba videntur, sed pleraque vero quinqueloba sunt, lobulis obtusis: flores pallide coerulei.

25. *V. TRIPHYLLOS*, foliis infimis indivisis petiolatis subrotundis, superioribus digitato-partitis, pedunculis calyce longioribus, caule patulo. *Fl. dan. 627. Engl. bot. 26. Sturm I. 8.*

In hortis, pomariis et agris copiose. Aprili, Maio. ☉

Caulis *erectus pubescens digitalis parum romosus*: pedunculi *patentes foliis longiores*: corolla *coerulea maiuscula*.

26. V. VERNA, foliis inferioribus subpinnatifidiis, frequentibus tripartitis, floralibus lineari-lanceolatis indivisis pedunculo longioribus, calyce brevioribus. *Engl. bot.* 25. *Fl. dan.* 252. *Sturm* I. 13.

Cum prioribus copiose eodem tempore. ☉

Caulis *hirtus strictus subramosus digitalis*: folia *omnia subsessilia*: calyces *maximi*, corolla *coerulea*.

27. V. ACINIFOLIA, foliis inferioribus oblongis obtusis subcrenatis, floralibus lineari-lanceolatis integris pedunculo brevioribus. *V. romana Al-lion. fl. pedem.* t. 85. f. 2.

In agris editioribus prope Horneburg, Tſheplitz, Hohenſthurm et Landsberg. Maior. ☉

Caulis *digitalis pilosus subsimplex*: folia *infra subpetiolata*: flores *pallide coerulei*.

7. GRATIOLA.

28. GR. OFFICINALIS, foliis lanceolatis sessilibus serrulatis subtrinerviis, pedunculis axillaribus. *Fl. dan.* 363.

In pratis humidis inter Radewell et Schkopa, ad Roitſch, Karsdorf, sed rarius. Iul. Aug. 24

Radix *repens articulata*: caules *simplices dracunculales ut et folia glabri*: flores *rubicundo-flavidi*.

8. UTRICULARIA.

29. U. VULGARIS, nectario conico, labio superiori lateribus reflexo longitudine palati, scapo stricto. *Fl. dan.* 138. *Engl. bot.* 253. *Sturm* I. 13.

In paludibus turfosis. Ipse nunquam florentem, nisi in Pomerania et Megapolitano ducatu, vidi; reperi tamen folia plantae bullis stipata in palude ad Löberbach inter Benndorf et Holzweilig. *Lentibulariam* Rivin. indicat suo tempore *Rehfeldtius* 56. im Zwinger am Rannstädtchen Thore et im Passendorffchen Teiche, ubi et *Buxbaumius* 183. reperisse videtur. At hodie neutri superest.

9. LYCOPUS.

30. *L. EUROPAEUS*, foliis ovato-lanceolatis basi subpinnatifidis sinuato-serratis villosiusculis. *Curt.* n. 34. *Fl. dan.* 1081. *Engl. bot.* 1105.

In fossis et rivulis in Wärmnitz, Nietleben, Granau et alibi. Jul. 24

Caulis *orbitalis ramosus*: flores *verticillati albi flavo punctati*.

10. SALVIA.

31. *S. FRATENSIS*, foliis cordato-oblongis inciso-crenatis superioribus amplexicaulibus, verticillis subnudis, corollis galea glutinosis. *Engl. bot.* 153.

In pratis, pascuis, collibus, nemoribus ipsis vulgatissima. Jun. 24

Caulis *subhirsutus tetragonus*: folia *rugosa, inferiora petiolata*: bractae *parvae cordatae*: verticilli *sexflori*: corolla *coeruleo-violacea*, galea *punctis glutinosis adpersa*.

32. *S. SYLVESTRIS*, foliis cordato-lanceolatis rugulosis inaequaliter duplicato-crenato-serratis superne nudiusculis, caule calyceque villosis, *Jacqu. austr.* t. 212.

Ad margines agrorum et vinearum prope Langenbogen, Dennstädt, Kölme, Höhnstädt, Nechau, sen, Freyburg. Jul. 24

Folia *infima longe petiolata, suprema semiamplexicaulia*, *subtus tenuiter tomentosa*: verticilli *sex-*

flori: bractee purpureae: corolla coerulea, galea punctis albidis adpersa.

33. *S. NEMOROSA*, foliis cordato-lanceolatis aequaliter serratis, caule calyceque incanis, bracteis longitudine calycis.

In coemeterio Erdebornensi et in Lochwitz vor Gerbstädt, Aug. 24

Differt a priore canitie, quum S. sylvestris villosa sit; differt foliis angustioribus aequaliter serratis.

Harminum sylvestre minus salvifolium C. Bauhin. invenerunt Knauth. 102. bei Giechichenstein, an der Heide, Buxb. 161. in limitibus agrorum et vinearum ad Külme et Rolsdorf, Rupp. 221. bei Erdeborn et Eisleben. Leysserus vero invenire nequivit. Mihi adlata fuit ex locis indicatis ab auditoribus Fischero et Schraubio.

11. CIRCAEA.

34. *C. LUTETIANA*, caule erecto, foliis ovatis densitatis opacis pubescentibus. *Curt. n. 34. Fl. dan. 210. Engl. bot. 1056.*

In sylvis caeduis humentibus, nemoribus umbrosis auf der Rabeninsel bei Bülberg, am nördlichen Ende derselben, copiosissime, im Beichlitzer Holze, bei Horneburg und Erdeborn, bei Brehna und Holzweißig, in der Schleberoder Giehle. *Julio. 24*

Caulis erectus cubitalis, pubescens parum ramifusus: folia remota margine subrepanda, opaca (non nitida ut C. alpinac) pubescencia (quandoque glabra): racemus terminalis nudus, floribus albo-rubentibus adpectu gratis.

12. FRAXINUS.

35. *FR. EXCELSIOR*, foliis pinnatis quadriugis, foliolis subsessilibus oblongo-lanceolatis attenuatis serratis. *Fl. dan. 969. Schk. t. 357.*

Ad pagos, in nemoribus ad Gutenberg, Döllnitz,
Collenbey. Apr. 24

Arbor *excelsa*, *corrice cinereo*, *geminis magnis
nigris: post anthesin demum frondescit, primis
pruinis deiici: folia. Flores polygami, feminei
rarissimi. Majculi et hermaphroditi nudi; inter-
dum tamen calyces quadri- aut quinquedentati oc-
currunt antheris binis ternisve onusti. Samarae ob-
longo lanceolatae sub 1-spermae.*

13. LEMNA.

36. L. MINOR, foliis sessilibus ovalibus utrinque pla-
niusculis. *Mich. tab. XI. fig. 2. Engl. bot.
1095. Schk. t. 281.*

In aquis stagnantibus, fossis etc. vulgarissima. Iul.

37. L. GIBBA, foliis sessilibus subtus hemisphaericis,
radicibus solitariis. *Engl. bot. 1233. Wolff
Lemna fig. 11 — 15.*

In eisdem locis cum priore eodem tempore.

38. L. POLYRRHIZA, foliis sessilibus subrotundis, su-
pra leviter sulcatis, subtus subrugosis, radici-
bus confertis. *Mich. l. c. fig. 1. Wolff
l. c. fig. 16 — 21. Schk. t. 281.*

39. L. TRISULCA, foliis petiolatis lanceolatis prolife-
ris. *Mich. l. c. fig. 5. Wolff l. c. fig. 1 — 3.
Engl. bot. 926.*

In fossis, stagnis et lacubus, prope Bruckdorf et
Dieskau, auf dem Badeplatz etc. Florentem non-
dum ipse vidi: videntur *Turnerus (Smith.
fl. brit. III. p. 950.)* et *Wolffius (l. c. p. 22.)*

In aliis speciebus polygamos semper flores ob-
servavi. Radicularum calyptrae aut claviculi in
aliis monocotyledonibus omnino occurrunt. (*An-
leit. zur Kenntniss d. Gewächse, B. III. S. 27, 28.*)

14 CLASSIS III. TRIANDRIA.

DIGYNIA.

14. ANTHOXANTHUM.

40. A. ODORATUM, spica ovato-oblonga, flosculis pendunculatis aristis longioribus. *Host gran austr. l. t. 5. Curt. n. 9. Schrebers Graser, t. 5. Sturm l. 4.*

In pratis, pascuis, nemoribus, ad vias ubique
Maio, Jun. 24

Gramen foenile-optimum, suaveolens, culm pedali, foliis mollibus, raro pilosis, ligula lanceolata, spica pollicari, antheris rubicundis: corollis subtilissima hyalina germen amplexente.

CLASSIS III.

TRIANDRIA.

MONOGYNIA.

* Flores superi.

15. VALERIANA. Cal. maturus pappus plumosum fistens. Cor. 1-petala 5-fida basi gibba. Sem. 1 calyce corticatum.

16. FEDIA. Cal. 3-5-dentatus. Cor. 1-petala 5-fida. Caps. coronata 3-lobularis, loculo unico fertili.

17. IRIS. Spatha 1-aut multiflora. Cor. 6-partita, laciniis alternis reflexis. Styl. pars superior trifida petaliformis.

stigmatē plicaeformi sub quavis styli lamina. *Capf.* 3-locularis.

18. GLADIOLUS. *Spatha* 2-valvis 1-flora. *Cor.* 6-partita subringens. *Stamina* sub labio superiori antestylum, curvata. *Stigma* 3-fidum. *Capf.* 3-locularis.

** Flores inferi graminei: semen unicum.

Cyeroideae: *glumae simplices univalves.*

19. SCHOENUS. *Glumae* paleaceae congestae, inferiores steriles. *Sem.* subrotundum, basi fetis obvallatum.

20. CYPERUS. *Glumae* paleaceae distiche imbricatae. *Sem.* imberbe.

21. SCIRPUS. *Glumae* convexae undique in spicas ovatas congestae. *Semen* nucamentaceum, fetis ad basin obvallatum.

22. ERIOPHORUM. *Glumae* convexae undique in spicas ovatas congestae. *Semen* nucamentaceum, pappo ad basin capillari.

Gramineae: *glumae 2-valves.*

23. NARDUS. *Gluma* simplex. *Semen* gluma tectum.

16 CLASSIS III. TRIANDRIA.

DIGYNIA.

* *Glumae uniflorae vagae.*

24. PANICUM. *Gluma ext.* 3-valvis, valvula tertia minima. *Gluma int.* 2-valvis mutica persistens.
25. ALOPECURUS. *Gluma ext.* 2-valvis. *Glum. int.* 1-valvis, apice simplici versus basin aristata.
26. PHLEUM. *Glum. ext.* 2-valvis truncata bicuspidata. *Glum. int.* 2-valvis, valvis acutiusculis.
27. PHALARIS. *Glum. ext.* 2-valvis, valvis carinatis aequalibus. *Glum. int.* 2-valvis in externa latens.
28. MILIUM. *Glum. ext.* 2-valvis, ventricosa. *Glum. int.* 2-valvis persistens.
29. AGROSTIS. *Glum. ext.* 2-valvis, valvis acutis. *Glum. int.* 2-valvis caduca.
30. STIPA. *Glum. ext.* 2-valvis. *Glum. int.* 2-valvis, valva altera arista tortili longissima basi articulata.
31. ANDROPOGON. *Gluma* hermaphrodita sessilis cum mascula pedicellata; *ext.* 2-valvis mutica cartilaginea,

interna 2-valvis, $\frac{3}{4}$ aristata; arista tortili, ♂ mutica.

** *Glumae 2-florae vagae.*

32. AIRA. *Glum. ext.* 2-valvis. *Glum. int.* 2-valves semini maturo adnascentes.

33. MELICA. *Glum. ext.* 2-valvis, valvis ovatis concavis. *Glum. int.* binae 2-valvis, cum rudimento tertiae.

34. HOLCUS. *Glum. ext.* 2-valvis, valves lanceolatis. *Glum. int.* binae, altera hermaphrodita mutica, altera mascula aristata.

*** *Glumae multiflorae vagae.*

35. DACTYLIS. *Glum. ext.* 2-valvis compressa, valva maiore carinata. *Glum. int.* 2-valvis, valva interiore acuta bifida.

36. POA. *Glum. ext.* 2-valvis. *Glum. int.* 2-valvis, valvis ovatis acutiusculis mucis margine scariosis.

37. SESSLERIA. *Glum. ext.* 2-valvis subtriflora aristata. *Glum. int.* 5-dentata.

38. BRIZA. *Glum. ext.* 2-valvis cordata obtusa. *Glum. int.* ventricosa cordata obtusa persistens.

39. FESTUCA. *Glum. ext.* 2-valvis acuminata. *Glum. int.* 2-valvis acuminata, arista si adest ex ipso apice valvarum.

18 CLASSIS III. TRIANDRIA.

40. BROMUS. *Glum. ext.* 2-valvis acuminata. *Glum. int.* 2-valvis, valva exteriori infra apicem aristata, interiore ciliata.

41. AVENA. *Glum. ext.* 2-valvis acuta. *Glum. int.* 2-valvis teretiuscula persistens, valva exteriori e dorso aristam tortilem geniculatam emittente.

42. ARUNDO. *Glum. ext.* 2-valvis. *Glum. int.* 2-valvis, basi lanugine cincta, persistens.

**** *Glumae spicatae: corollae priorum: rhachis scrobiculata.*

43. LOLIUM. *Glum. ext.* 1-valvis multiflora, subulata. *Glum. int.* 2-valvis acuminata.

44. CYNOSURUS. *Involucrum* monophyllum laterale. *Glum. ext.* 2-valvis multiflora. *Glum. int.* 2-valvis.

45. TRITICUM. *Glum. ext.* 2-valvis multiflora. *Glum. int.* 2-valvis subpersistens. *Rhachis* dentata.

46. HORDEUM. *Involucr.* 6-phyllum 3-florum. *Glum.* simplices, 2-valves aristatae persistentes.

***** *Flores inferi incompleti.*

MONOGYNIA.

19

47. POLYCNEMUM. *Cal.* duplex, externus 2-phyllus, internus 5-phyllus foliolis paleaceis. *Utriculus* 1-spermus.

TRIGYNIA.

48. MONTIA. *Cal.* 2 phyllus. *Cor.* 1-petala. *Capf.* 3 valvis 3-sperma.
49. HOLOSTEUM. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala. *Capf.* subcylindrica apice defliscens.

* *Juncus conglomeratus subverticillatus*
(Pl.) *Carex. Sparganium. Typha. Amarantus Blitum.* (XVIII.)

MONOGYNIA.

15. VALERIANA.

41. *V. dioica*, foliis radicalibus ovalibus subserratis, caulinis lyrato-pinnatis. *Curt. n.* 47. *Fl. dan.* 687. *Sturm I.* 9.

In pratis humidis et palustribus frequens, ad Nietleben, Canena, Bruckdorf, Seeben, Gutenberg etc. Maio, Iun. 4

Planta spithamea vel dodrantalis, mascula minor, nonnunquam vere hermaphrodita: flores dilute carnei.

42. *V. officinalis*, foliis omnibus pinnatis, foliolis lanceolatis subuniformibus dentatis. *Curt. n.* 67. *Fl. dan.* 570. *Sturm I.* 9.

Ad fluviorum ripas et in nemoribus elatioribus, sylvis caeduis: Zorgs, Lindberg, Mittel- und Rothenholz, Hackenholz bei Mueheln etc. Iunio, Iulio. 24

2a CLASSIS III. TRIANDRIA.

Quae in sylvis provenit, humanam saepe altitudinem superat, odore gravi aromatico radicis illico cognoscitur: flores carnei aut albi.

16. FEDIA.

43. *F. OLITORIA*, caule dichotomo, foliis oblongis obtusis, rariter serrato-incisis, fructu nudo. *Curt. n. 54. Sturm l. 2.*

In hortis, pomariis, agris cultis frequens. Aprilis, Maio.

44. *F. DENTATA*, caule dichotomo divaricato, foliis oblongis subserratis, fructu tridentato, dentibus binis brevissimis. *Engl. bot. 1370.*

Isidem cum priore locis eodem tempore.

Utraque haec species sub Valeriana Locusta L. latet. Equidem sequor Gärtnerum, qui primus distinxit.

17. IRIS.

- * 45. *I. PUMILA*, barbata, scapo unifloro foliis ensiformibus breviori, tubo exserto, corollae laciniis oblongis obtusis. *Iacqu. flor. austr. I. 1.*

In muris limosis ad Quersfurt et Leimbach. Jun.

Floris purpureo-coerulei partes ratione scapi longissimae.

46. *I. SQUALENS*, barbata, scapo multifloro foliis ensiformibus altiori, laciniis corollae deflexis replicatis, erectis emarginatis. *Iacqu. l. c. 5.*

In muris limosis ad Quersfurt, in vineis ad Kölm, Höhnstadt, Freyburg passim. Jun. 24

Corolla lutea: laciniae deflexae venis reticulatis fusco-violaceis, erectae et styli pars superior ferdide luteae.

47. *I. GERMANICA*, barbata, scapo multifloro foliis ensiformibus falcatis longiori; laciniis corollae internis integerrimis, tubo germen excedente. *Blackwell t. 69.*

In nemoribus et sylvis ad Dölau, Lieskau, Rocken- und Mittelholze, in der Brennau bei Fienstädt etc. Iun. 24

Corolla *plerumque purpureo-violacea.*

48. *I. PSEUDACORUS*, imberbis, foliis ensiformibus, laciniis corollae alternis stylo inciso minoribus.

Curt. n. 33. Fl. dan. 494.

Ad ripas Salae, in fossis ad Passendorf, Nietleben, auf der kleinen Wiese et alibi vulgarissima. Iun. 24

Corolla *constanter lutea unicolor*, spathae *longiores virides.*

49. *I. SIBIRICA*, imberbis, foliis linearibus, scapo subtrifloro-tereti, germine trigono. *Iacqu. l. c. 3.*

In pratis et nemoribus humidiusculis ad Seeben, Dölau, Nietleben, in der Lucke, dem Beichlitzer Holze et alibi. Iun. 24

Corolla *coerulea, rarius albida.*

18. GLADIOLUS.

50. *GL. COMMUNIS*, spathis tubo longioribus, floribus secundis, foliis ensiformibus nervosis.

In pratis sylvaticis ad Brehna, Löbejün, im Brandender Holze rarius. Iun. 24

Flores *rosei, purpurei.*

Cyperoideae: *glumae simplices 1-valves.*

19. SCHOENUS.

51. *SCH. ALBUS*, culmo subtriquetro folioso, foliis linearibus, floribus fasciculatis. *Schk. t. 7.*

Fl. dan. 320.

In paludibus turfosis ad Dölau et Benndorf am Löberbach bei Delitzsch, copiosissime. Iul. Aug. 24

Radix *tuberosa*: culmus *dodrantalis*: flores *congesti albidi, bracteis albescentibus.*

22 CLASSIS III. TRIANDRIA.

20. CYPĒRUS.

52. *C. FLAVESCENS*, culmo trigono nudo, umbella subcomposita triphylla, spicis confertis lanceolatis, glumis obtusis. *Hofst III. t. 72. Schk. t. 7.*

In inundatis, pratis humidis cum lunco bufonio et Sagina procumbente, auf der großen Wiese, auf dem Görz bei Wörmnitz, hinter Gutenberg. Aug. Sept. ☉

Planta palmaris, foliis carinatis glabris mucronatis: vaginulis truncatis rubellis ad pedunculorum basin. Nonnunquam spiculae binæ aut unica sessilis ad culmi apicem involucri duntaxat ad phyllum habent.

53. *C. FUSCUS*, culmo trigono basi folioso, umbella compolita triphylla, spicis linearibus confertis, glumis acutis imbricatis. *Hofst III. t. 73. Fl. dan. 179. Schk. t. 7.*

In inundatis auf der kleinen Wiese bei der Schleuse. Aug. ☉

Simillimus priori, sed spiculae minores angustiores nigrescentes, glumis acutis linearibus.

21. SCIRPUS.

* *Spica unica.*

54. *Sc. PALUSTRIS*, culmo tereti nudo, spica subovata terminali, radice repente. *Hofst III. t. 55. Fl. dan. 273. Engl. bot. 131. Sturm I. 9.*

In pratis, pascuis, fossis copiosissime. Maio, Juniq. 24

Varietas occurrit culmo vix palmari, *Sc. acicularis fl. dan. 167.*

- * 55. *Sc. CAESPITOSUS*, culmo tereti striato basi vaginato multiplici-lquamoso, spica terminali, glumis exterioribus maximis. *Hofst III. t. 59. Sturm I. 10.*

In paludibus prope Lieskau; Liederstädt, ad Crumpa an der Göl. Iul. 24

E radice fibrosa caespitosa culmi numerosi simplicissimi, digitalia palmares dodrantaes, basi squamis membranaceis albido-fuscis obvallati surgunt, sine foliis radicalibus apice spicam parvam rufam gerentes. Glumae duae exteriores, parum per inaequales totam spicam aequant.

*56. Sc. RAUCIFLOUS, culmo tereti striato nudo basi vaginato, foliis radicalibus culmum subaequantibus, spica terminali pauciflora, glumis exterioribus minoribus. Sc. *Bacothryon* Linn. suppl. 103. *Hofst* III. t. 58. *Sturm* I. 10? *Engl.* bot. 1122.

In pratis uliginosis, auf der Jungfernwiese am Gräben, ad lacum Kölmense. Iun. 24

E radice caespitosa culmi simplicissimi semi-digitalis teretes, graciles, basi nudi, foliis radicalibus culmo similibus, surgunt, spicam sub 4-floram apice gerunt, cuius glumae exteriores minores sunt.

57. Sc. ACICULARIS, culmo subquadrangulo, basi vagina mutica, foliis radicalibus filiformibus culmum subaequantibus, spica ovata acuta terminali, glumis exterioribus maioribus. *Hofst* III. t. 60. *Sturm* I. 10. *Fl. dan.* 287.

In locis inundatis sub aquis purioribus, auf der grossen Wiese, ad Trebnitz. Iul. Aug. 24

Radix fibrosa caespitosa: Culmus tenuissimus vix quadrangularis, simplicissimus, bi-triuncialis: folia culma conformia radicalia: spica exigua viridi-ferruginea: semina vero basi setosa, seta quatuor, tempore deciduis.

* * Culm tereti polystachyo.

58. Sc. LAEVSIS, culmo nudo, panicula cymose decomposita terminali, spiculis ovatis. *Hofst* III. t. 61. *Fl. dan.* 1142.

In aquis purioribus fluviorum, sinibus, stagnis et lacubus satis frequens: Iul. 4

Radix repens horizontalis valida; culmi recti nudi, 4-5-pedales glabri; variat culmo hinc complanato.

59. SC. CARICIS, culmo teretiusculo nudo, spica disticha compressa involucri monophyllo brevioris: spiculis multifloris. Schoenus compressus L. Carex uliginosa L. Host III. t. 57.

In pratis humidis umbrosis ad Gutenberg, Nietleben et Granau. Jun. 4

Culmus semipedalis, infra teretiusculus; sub spica triquetus; folia radicalia linearia carinata; spica viridi-fusca.

60. SC. SETACEUS, culmo nudo setaceo, spicis lateralibus subgeminis sessilibus ebracteatis, seminibus imberbibus. Host III. t. 65. FA dan. 31. Sturm I. 10.

In glareosis inundatis ad lacum dulcem: semel quoque ad ripas Salae hinter den Königl. Salinen. Iul. 4

*** Culmo triquetro, panicula foliacea.

61. SC. MARITIMUS, culmo folioso, panicula congesta foliacea terminali, glumis mucronatis lacero-trifidis. Curt. n. 48. Host III. t. 67. Engl. bot. 542. Sturm I. 13.

In fossis et paludibus copiose. Iul. 4

Radix repens nodosa Culmi tripedales foliosi, angulis asperis; folia linearia longissima marginata; spicae badias, glumis apice mucronatis incisfis.

62. SC. SYLVATICUS, culmo folioso, cyma foliacea terminali, pedunculis nudis supradecompositis, spicis confertis. Host III. t. 68. Fl. dan. 307.

In fossis et nemorosis humidis ad Seeben, Gutenberg, in der Lucke, minus frequens. Jun. Iul. 4

Spicae fusco-virides.

22. ERIOPHORUM.

- * 63. *E. VAGINATUM*, culmis vaginatis teretiusculis, spica solitaria, glumis scariosis. *Hofst I. t. 39. Curt. n. 37. Fl. dan. 236. Sturm I. 10.*

In palude turfosa ad Oberschmion, bei Lodersleben am breiten Saal, rarius. Apr. 4

Culmi caespitosi, obsolete trigoni vel teretiusculi, vagina altera ad basin inflata membranacea mucronulata, altera altiore apophylla obrusa circumdati: folia omnia radicata, basi membranacea vaginantia: glumae omnes plumbeae.

64. *E. POLYSTACHYON*, culmis teretibus foliosis, foliis planis, spicis pluribus pedunculatis, radice fibrosa. *Engl. bot. 563. E. latifolium Hopp. Sturm I. 10.*

In pratis uliginosis copiose, ad Passendorf, Nietleben etc. Maio. 4

Radix fibrosa, nec repens. Folia lanceolata versus apicem acute carinata, basi vaginantia. Spicae post anthesin lana copiosa semina cingente e longinquo conspicua.

65. *E. ANGUSTIFOLIUM*, culmis teretibus foliosis, foliis canaliculatis apice triquetris, spicis pedunculatis, radice repente. *Curt. n. 37. Hofst I. t. 37. Engl. bot. 564. Sturm I. 10.*

In pratis uliginosis bei Gutenberg, Trebnitz. Maio. 4

Gramineae: gluma 2-valvis.

23. NARDUS.

66. *N. STRICTA*, spica setacea recta secunda. *Hofst II. t. 4. Sch ab. t. 7. Fl. dan. 1022. Engl. bot. 290. Schk. I. 9.*

26 CLASSIS III. TRIANDRIA.

In ericetis sabulosis, hinter der Heide, bei Dölau an der Nordseite der Heide; bei Kröllwitz auf dem Ochsenberge etc. frequens. Iul. 24

Planta tota culmo, foliis, spica rigida; folia angustissima tetragona glaucescentia, pubescentia; glumae cinereae aristatae scabrae.

DIGYNIA.

24. PANICUM.

67. P. VERTICILLATUM, spica verticillata, spiculis quaternis, involuclis unifloris bifetis scabris, culmis diffusis. Host II. t. 13. Curt. n. 44.

In hortis et agris cultis vulgare. Iun. Iul. ☉

Folia marginae scabra, ligula brevissima ciliari; involuclla flore duplo longiora.

68. P. VIRIDE, spica cylindrica, spiculis confertis, involuclis bifloris multifetis, setulis sursum aculeatis, gluma interna glabriuscula. Host II. t. 14. Curt. n. 44. Fl. dan. 852. Leers tab. II. fig. 2.

In arvis, maxime arenosis, minus frequens, ad Trotha etc. Iul. ☉

Culmi scabri geniculati; folia lato-lanceolata aspera subundulata; ligula pilosa; glumae nec nervosae nec rugosae, sed lente cominus conspectas scabriusculas; involuclli setae longitudine variae.

69. P. GLAUCUM, spica cylindrica, spiculis confertis, involuclis bifloris multifetis, setulis glabriusculis, glumis internis transverse rugulosis. Host II. t. 16. Schreb. t. 25.

In agris cultis et hortis satis copiose. Iun. Iul. ☉

Differt a priori: foliorum glauco colore, culmo sub spica sulcato, involucllorum setis glabriusculis flavidis constanter duplo flosculos excedentibus, maxime vero glumis internis non glabriusculis sed transverse rugulosis.

70. *P. CRUS GALLI*, spica decomposita, spiculis alternis coniugatisque subdivisis, glumis aristatis hispidis, pedunculo angulato. *Hofst II. t. 19. Leers tab. II. fig. 3.*

In hortis et agris cultis frequens. Iul. ☉

Rhachin quinquangularem, qualem Linnæus vult, eum præceptore Weigelio, Leyssero et Smithio, varius observavi; hinc inter P. Crus corvi et Crus galli nulla certa differentia.

71. *P. SANGUINALE*, spicis digitatis basi interiore nodosis, floribus geminis muticis, altero pedicellato, vaginis foliorum punctatis. *Hofst II. t. 17. Curt. n. 41. Schreb. t. 16. Fl. dan. 388.*

In hortis et agris cultis frequens. Iun. Iul. ☉

Culmi decumbentes geniculati; vaginae foliorum pilosae subtuberculatae; spicae umbellatae lineares, rhachi flexuosa alata.

25. ALOPECURUS.

72. *A. PRATENSIS*, culmo erecto laevi, spica subpaniculata densa, glumis externis villosis basi connatis. *Hofst II. t. 31. Curt. n. 50. Schreb. t. 19. f. 1. Leers tab. II. f. 4. Sturm I. 8.*

In pratis humentibus et pomariis. Maio, Iun. ☿

Glumae internae rarius aristatae ac in aliis speciebus, hinc falsa differentia; corollae muticae.

73. *A. AGRESTIS*, culmo erecto scabriusculo, spica simplici gracili, glumis nudiusculis basi connatis carina dilatatis. *Hofst III. t. 12. Schreb. t. 19. f. 2. Curt. n. 17. Leers t. II. f. 5.*

In hortis, pratis editionibus, ad vias satis copiose. Iun. ☉?

74. *A. GENICULATUS*, culmo adscendente geniculato, spica subpaniculata cylindrica, glumis rotatis pilosis. *Hofst II. t. 32. Curt. n. 57. Engl. bot. 1250. Fl. dan. 861. Leers t. II. f. 7.*

28 CLASSIS III. TRIANDRIA.

In aquis stagnantibus frequens: e. g. auf dem Ba-
deplatz, bei Nietleben etc.

26. PHLEUM.

75. *PHL. PRATENSE*, spica cylindrica longissima, glu-
mis dorso ciliatis arista longioribus, culmo erec-
to, radice fibrosa. *Hofst III. t. 9. Schreb.*
t. 14. Engl. bot. 1076. Leers t. III. f. 1.

In pratis ubique. Aestate. 24

76. *PHL. NODOSUM*, spica cylindrica, culmo adscen-
dente, radice bulbosa. *Fl. dan. 380. Leers*
t. III. f. 3.

In apricis, ad margines nemorum et sylvarum:
e. g. der Heide, bei Gutenberg. Aestate. 24

27. PHALARIS.

77. *PH. PHLEOIDES*, panicula spicaeformi cylindrica,
glumis lineari-lanceolatis glabriusculis, margi-
ne interiori retuso, culmo simplici. *Hofst II.*
t. 34. Fl. dan. 531. Engl. bot. 459.

In campis elatis arenosis, pratis editioribus, vor
der Heide, auf dem Bischofsberge, bei Gutenberg.
Iun. Iul. 24

28. MILIUM.

78. *M. EFFUSUM*, floribus paniculatis diffusis muticis.
Hofst III. t. 22. Curt. n. 43. Fl. dan. 1143.
Engl. bot 1106. Leers t. VIII. f. 7.

In nemorosis humidis frequens. Iun. Iul. ☉

29. AGROSTIS.

* *Aristatae.*

79. *A. SPICA VENTI*, panicula patula capillari ramo-
sissima, glumae internae arista longissima stric-
ta. *Hofst III. t. 47. Fl. dan. 853. Leers*
t. IV. f. 1.

Inter segetes, solo arenoso subhumido copiose.
Iun. Iul. ☉

80. *A. ARUNDINACEA*, panicula elongata, glumae internae basi subvillosae arista rectiuscula glumam externam excedente.

In montosis nemorosis, dem Mittelholze, der Brennau non infrequens. Iul. 24

Culmi 3-pedales aut orgyales teretes glabri; folia linearia involuta retrorsum scabra glaucescentia, vaginis glabris, ligulis subnullis. Panicula plusquam dodrantalis, lanceolata elongata, albido rutilans, ramis subdivisis scabriusculis. Gluma externa patula glabra, internam superans, valvis acuminatis subscariosis; gluma interna viridis glabra versus basin pilis nonnullis, apice valvulae alterius arista rectiuscula, quae glumam externam superat.

Huc etiam *Arundo Calamagrostis* Leyfs.

81. *A. CANINA*, panicula semiverticillata, glumae internae nudae arista incurva glumam externam coloratam excedente, culmo decumbente ramoso. *Fl. dan.* 161? *Leers t. IV. f. 2.*

In pratis humidis, pascuis et pomariis. Iun. Iul. 24

82. *A. COMPRESSA*, panicula verticillata coarctata, glumae internae aristula minima occultata, culmo adscendente. *Willd. A. dubia* *Leers t. 4. f. 4.*

In montosis apricis sylvaticis an der Heide rarius. Iul. 24

Radix subrepens. Culmi pedales aggregati teretes glabri foliosi. Folia radicalia angustissima setacea scabra, culmea paullo latiora breviter longe vaginantia; vagina glabra; ligula integra obtusa. Panicula lanceolata coarctata, ramis verticillatis hispidiusculis. Pedicelli apice intrascati. Gluma externa internam longe excedens colorata, valvulis carina scabris lanceolatis; gluma

interna hyalina, valvulis obtusiusculis, altera infra apicem brevissime aristata, aristula flexuosa plerumque ita occultata, ut nonnisi lente augente conspiciatur.

Auctoritate Willdenowii distinxi, licet adfinitas insignis cum A. canina adsit.

83. *A. ALPINA*, panicula oblonga subcoarctata, glumis hispidiusculis coloratis, internae valvula altera truncata aristata, arista geniculata glumam externam excedente, foliis inferioribus setaceis, superioribus planiusculis. *Leyf. in Abh. der Hall. naturf. Gesellsch. I. p. 364. Host. III. t. 49.*

In rupibus ad Kröllwitz. Iun. ☉

** *Muticae.*

84. *A. VULGARIS*, panicula patente, ramulis divaricatis capillaribus, glumis aequalibus, internae valvula altera duplo brevior! retusa, altera apice 3-fida. *A. capillaris Fl. dan. t. 153. Leers t. IV. f. 3. (nec L. cf. Smith. ic. ined. t. 54.)*

In pratis, pomariis, versuris agrorum et nemoribus herbidis vulgaris. Iun. 24

85. *A. STOLONIFERA*, panicula oblonga coarctata glumis patenti-divaricatis, valvulis aequalibus lanceolatis extus pubescentibus, culmo ramoso repente. *Fl. dan. 564. (sat mediocris!) Leers t. IV. f. 6.*

In nemoribus et pratis humidis umbrosis. Iun. 24

86. *A. ALBA*, panicula oblonga laxiuscula, glumarum congesto-verticillatarum valvulis aequalibus lineari-lanceolatis nitidis carina scabris, culmo adscendente radicante. *Engl. bot. 1189. Leers t. IV. f. 5.*

Huius varietas est A. sylvatica Hudf., quae differt glumis majoris spadicis, internis post anthesin elongatis incrassatis.

: In pratis paludosis et nemoribus humentibus, ad Seeben, Dölau, Lieskau infrequens. Iun. Iul. 24

30. STIPA.

87. *ST. PENNATA*, aristis lanatis. *Morif. sect. VIII. tab. 7. f. 9.*

In montosis et rupestribus apricis ad Kröllwitz, der Heide et alibi frequens. Iun. 24

88. *ST. CAPILLATA*, aristis nudis curvatis, glumis coloratis semine longioribus, foliis planiusculis intus pubescentibus. *Hofst III. t. 5.*

In collibus siccis aridis apricis hinter der Heide, ad Bennstädt, Kölme etc. Iun. 24

31. ANDROPOGON.

89. *A. ISCHARNIUM*, spicis digitatis plurimis, pedicellis villosis, aristis geniculatis nudis. *Hofst II. t. 3. Schreb. t. 33.*

In collibus apricis ad Kröllwitz, ad vias bei Bennstädt, am Zorge copiose. Iul. Aug. 24

32. AIRA.

* *Muticae.*

90. *A. CRISTATA*, panicula spicaeformi, glumis pubescentibus pedunculo longioribus, internis acuminatis inaequalibus. *Poa cristata Leyss. Hofst II. t. 75.*

In collibus apricis, ad vias ubertim. Iun. 24

Quam recte Linn. spec. pl. Airam vocaverat, quum glumae plerumque biflorae sint, neque fere unquam quadriflorae, eam alii perperam ad Poam traduxerunt. Resituit antiquum genus Smith. Glumarum mucro quandoque in brevem aristam transit.

91. *A. AQUATICA*, panicula patente, glumis internis laevibus obtusis externas excedentibus, foliis planis. *Hofst II. t. 41. Curt. n. 10.*

34 CLASSIS III. TRIANDRIA.

In fossis et paludibus ad Passendorf, maxime an
der Salzke. Iul. 24

•• *Aristatae.*

92. A. CAESPITOSA, panicula patente, ramis verticilla-
tis, glumis internis basi subvillosis, arista recta.
Hofst II. t. 42. Leers t IV. f. 8.

In pratis humentibus abundat. Iul. Aug. 24

93. A. FLEXUOSA, panicula patente subtrichotoma,
pedunculis flexuosis, glumis internis basi villo-
lis, aristis geniculatis, foliis radicalibus seta-
ceis. *Hofst II. t. 43. Schreb. t. 30. Fl.*
dan. 157. Leers t. V. f. 1.

In nemoribus montosis Zorogs, Lindberg, Heide,
Hackenholz, Mittelholz etc. Iul. 24

Gulmus cubitalis, plerumque nudiusculus aut
parum foliosus, folia radicalia setacea scabra glau-
ca: panicula nitida glumis vel subspadicibus vel
pallidis: glumae internae constanter basi villis
tinctae, quibus itaque nullum certum discrimen
inter A. montanam et flexuosam statuitur: neque
pedunculi semper admodum flexuosi, sed in nemo-
ribus maxime montosis rectiusculi observantur.
Ceteroquin A. montana L. nec in Britannia, nec
in Germania etiamnum observata est. Etenim,
quam sic vocant Leersius, Hofmannus,
Hudsonius, Witheringius, nostrae adiu-
dicanda est.

94. A. CANESCENS, panicula coarctata, aristis apice
incrassatis medio barbatis, culmo folioso ad-
scendente, foliis setaceis longe vaginantibus.
Fl. dan. 1023. Engl. bot. 1190. Schk. I. t. 12.

In campis arenosis vor der Heide, bei Lettin;
etiam ad Lindberg, bei Lieskau etc. Iul. 24

95. A. PRAECOX, panicula simpliciuscula coarctata,
glumis internis sessilibus basi nudis aristatis api-
ce bifidis, foliis setaceis, vaginis inflatis angula-
tis. *Curt. n. 25. Fl. dan. 383. Engl. bot. 1296.*

In campis arenosis vor der Heide, hinter derselben, bei Bennstädt, zwischen Lieskau und Dölau etc. Maio. ☉

5. A. CARYOPHYLLÆA, panicula trichotoma divaricata; glumis internis sessilibus basi obsoleto pilosis, aristâ geniculata dorsali, foliis setaceis.

Curt. n. 65. Fl. dan. 382. Host II. t. 44.

In campis arenosis vor der Heide, links des Fußsteiges, der von den Weinbergen hinein führt; bei Lieskau und Dölau. Iun. ☉

A priore differt: 1. culmo altiori; 2. panicula trichotoma divaricata; 3. adpectu glumarum purpureo-argenteorum nitido; 4. glumis basi obsoleto pilosis.

33. MELICA.

* Glumis internis imberbibus.

17. M. UNIFLORA, panicula secunda ramosa, glumis erectis, interna fertili unica. Host II. t. 11.

Curt. n. 51. Fl. dan. 1144. Engl. bot. 1058.

In nemoribus montosis ad Erdeborn, Hornburg, Lodersleben, rarius. Iun. 24

Præter glumam fertilem sessilem viridem alia idest pedicellata albida vacua; gluma externa purpurea. Ligula acuminata purpurea antè et vaginæ erigitur.

18. M. NUTANS, panicula coarctata secunda simpliciter, floribus pendulis, glumis internis binis fertilibus. Curt. n. 70. Host II. n. 10.

Engl. bot. 1059. Schreb. t. 6. Leers t. III. f. 4.

In nemoribus montosis, der Heide, Lindberg, Zorge, Mittelholz. Iun. 24

19. M. CORBULÆA, panicula coarctata pedunculis flexuosis, floribus erectis cylindricis, glumis internis quaternis laxiusculis acuminatis, binis fertilibus. Curt. n. 60. Host II. t. 8. Fl. dan. t. 239.

34 CLASSIS III. TRIANDRIA.

In nemorosis humidis, pratis umbrosis abundat.
Aug. 24

Culmus *sesquipedalis*, *basi uninodis*; *floresculi*
plerumque purpurei.

** *Glumis internis barbatis*.

100. *M. CILIATA*, panicula spicaeformi cylindrica,
glumis externis internas superantibus, internae
alterius maioris valvula externa villis longis
cincta. *Hofst II. t. 12.*

In montosis apricis ad Kröllwitz, Quilschina,
Salzmünde, Hettstädt. Iun. 24

34. HOLCUS.

101. *H. LANATUS*, culmis, foliis glumisque externis
villosis, internis nudiusculis, masculae arista
incurva gluma externa inclusa. *Hofst I. t. 2.*
Curt. n. 38. Fl. dan. 1181. Engl. bot. 1163.
Schreb. t. 20. f. 1.

In pomariis, pratis, nemusculis humidis ubertim.
Iun. Iul. 24

102. *H. MOLLIS*, culmis, foliis glumisque externis gla-
briusculis, internis basi subhispidis, masculae
arista geniculata glumam externam excedente.
Curt. n. 54. Schreb. t. 20. f. 2.

In nemoribus ad Löbejün, ad Branderode, Mön-
cherode im Langenberg, sed rarius. Iun. Iul. 24

103. *H. AVENACEUS*, glumis externis inaequalibus gla-
bris, internis basi pilosis, alterius masculae ari-
sta dorsali tortili geniculata glumam excedente,
alterius hermaphroditae aristula subterminali
recta brevi. *Avena elatior L. Curt. n. 52.*
Hofst II. t. 49. Schreb. t. 1.

In pomariis, pratis et pascuis ubique; per totam
aestatem. 24

*Varietatem radice nodosa tuberosa, in Rocken-
et Mittelholze, Willdenowius speciem singula-*

rem facit, *Avenas bulbosae* nomine insignitand, quod, meo arbitrio et suffragio *Smithii*, immerito fit.

35. DACTYLIS.

104. *D. GLOMERATA*, panicula secunda supradecomposita glomerata. *Hofst II. t. 94. Schreb. t. 8. f. 2. Fl. dan. 743. Engl. bot. 335. Sturm I. 6.*

In pratis, pascuis, hortis, ad vias, in versuris ubique. Iun. 4

36. POA.

105. *P. AQUATICA*, panicula erecta ramosa laxa, spiculis sexfloris linearibus, glumis internis obtusis septemnerviis. *Hofst II. t. 60. Curt. n. 56. Fl. dan. 920. Engl. bot. 1315.*

In fossis et ad ripas fluviolorum frequens. Iun. 4

106. *P. FLUITANS*, panicula ramosa divaricata, spiculis appressis teretibus multifloris, glumis obtusis 7-nerviis basi duplicato-nerviis. *Smith. Festuca fluitans L. Curt. n. 6. Hofst II. t. 77. Fl. dan. 237. Schreb. t. 3*

In fossis et rivulis lente fluentibus frequens. Iun. 4

107. *P. DISTANS*, panicula effusa, ramis semiverticillatis demum reflexis, spiculis 5-floris, glumis obtusissimis obsoleta 5-nerviis nitidis. *P. retroflexa Curt. n. 61. P. distans L. mant. Hofst II. t. 63. P. salina Pollich. Leyfs.*

Ad vias et in ruderatis, maxime salinis, in den Pulverweiden, in den Salzköthen, an der Salske etc. frequens. Iun. 4

108. *P. COMPRESSA*, panicula secunda coarctata, culmo ascendente compresso, spiculis ovato-lanceolatis subsexfloris, glumis angulosis basi villos connexis. *Hofst II. t. 70. Fl. dan. 742. Engl. bot. 365.*

96 CLASSIS III. TRIANDRIA.

In muris limosis, hortis et ad vias infrequens.
Iun. Iul. 2

109. *P. ALPINA*, panicula patente ovata, spiculis cordato-ovatis subtruncatis 4-floris, glumarum internarum valvulis villosis, basi liberis. *P. brioides Wohleben suppl. ad Leyfs. flor. hal. p. 5.* *P. badensis Willd. spec. pl. 1. p. 592.*

In vineis ad Bennstädt et Kölme. Iun. 2

Glumae purpureo-spadiceae; folia breviter ligulata superioribus elongatis laceris.

110. *P. BULBOSA*, panicula ovata ramis flexuosis, spiculis ovatis 4-floris, glumis villo connexis, culmo basi bulboso, foliis ferrulatis. *Hofst II. t. 65. Engl. bot. 1071. Vail. parisi. t. 7. f. 8.*

In collibus apricis ad Giebichenstein et Kröllwitz copiose. Maio. Iun. 2

Semper vivax (i. e. glumis bulbosis) apud nos occurrit. Folia spiculaeque glaucae, haec xerampelino-variegatae.

111. *P. PRATENSIS*, panicula diffusa, ramis verticillatis horizontalibus, spiculis 3—5-floris, glumis lanceolatis nervosis basi villo connexis, radice repente, culmo erecto, ligula abbreviata obtusa. *Hofst II. t. 61. Curt. n. 14. Engl. bot. 1073. P. trivialis Leyfs.*

In pratis, pomariis, versuris ubique. Iun. Iul. 2

P. angustifolia Leyfs. et Leers t. VI. f. 3. huc quoque pertinet, nec differt nisi spiculis constanter 5-floris, foliis inferioribus angustissimis rigidulis, vaginis inferioribus scabriusculis.

112. *P. TRIVIALIS*, panicula diffusa, ramis alternatim decompositis, tandem horizontalibus, spiculis subtridoris, glumis lanceolatis nervosis, basi villo connexis, radice fibrosa, culmo adscendente, ligula elongata acuta. *Hofst II. t. 62.*

Curt. n. 15. Engl. bot. 1072. Leers t. VI. f. 5. P. pratensis Leyss. P. palustris Winkl. dubia Leers t. VI. f. 5. (NB. Poa palustris L. est Fl. dan. 750. diversa.)

In hortis, pratis, versuris ubique. Iun. Iul. 2

Spiculis paullo maioribus, radice fibrosa, matine vera ligula elongata acuta a priore differt.

113. *P. ANNUA*, panicula divaricata, spiculis ovatis sub 4-floris, glumis remotiusculis nervosis liberis, culmo decumbente compresso, vaginis ancipitibus, foliis transversim rugulosis undulatis. *Hofst II. t. 64. Curt. n. 2. Engl. bot. 1141. Leers t. VI. f. 1.*

In hortis et pascuis ubique. Per totam aetatem. ☉

114. *P. NEMORALIS*, panicula attenuata ramis capillaribus, spiculis subtrifloris mucronatis scabris, glumis basi liberis, ligula brevissima crenulata culmo subcompresso. *Hofst II. t. 71. Engl. bot. 1265. Fl. dan. 749.*

In lucis et nemoribus. Iun. Iul.

Nonnunquam P. angustifoliae aut P. palustris nomine venit.

115. *P. TRINERVATA*, panicula diffusa, spiculis quadrifloris lanceolatis glabris, glumis acuminatis dorso scabriusculis apice coloratis trinerviis remotiusculis. *P. sylvatica fl. dan. 1145.*

In nemoribus montosis ad Erdeborn, Helsta, Hornburg. Iun. 2

Culmus teres subcubitalis; foliorum vagina scabra, ligula obtusa sublacera; glumarum apices bellosi purpurei. Cf. Schrad. spicil. p. 4.

116. *P. SUBVERTICA*, panicula patente, ramis subverticillatis demum declinatis, spiculis quadrifloris, glumis remotiusculis liberis acuminatis coloratis, culmo compresso, vaginis foliorum obtusiusculorum ancipitibus. *Hofst III. t. 13.*

38. CLASSIS III. TRIANDRIA.

In nemoribus montosis ad Erdeborn, Lodersleben, Trebnitz. Iul. 24

Culmus tripedalis; paniculae rami scabri; spiculae xerampelino - purpureae.

117. *P. DECUMBENS*, panicula subsimplici coarctata, ramulis erectis, spiculis ovatis quadrifloris glumarum externarum longitudine, ligula brevissima ciliata. *Smith. fl. brit. I. p. 107. Host II. t. 72. Fl. dan. 162. Festuca decumbens L.*

In campis aridis vor der Heide, linker Hand am Fußsteige von den Weinbergen. Iul. 24

118. *P. DURA*, panicula contracta spicata, spiculis sessilibus alternis quadrifloris, glumis remotiusculis glaberrimis obtusis, culmo compresso ramoso geniculato, foliis apice rotundatis. *Host II. t. 73. Cynosurus durus L. Poll. fl. palat. I. t. 1.*

In sterilibus beim Fürstengarten nach der Saale zu, auf dem Pfännerhelsplatze, auf der Efelwiese bei Querfurt. Maio. ☉

37. SESSLERIA.

119. *S. COERULEA*, spica ovate-oblonga imbricata, bracteis alternis apice erosis. *Host II. t. 98. Cynosurus coeruleus L. Jacqu. ic. rar. I. t. 21. Sturm I. 6.*

In collibus calcareis auf dem Vogelsberge bei Bennstädt, bei Zscheplitz und Möncherode im Freyburgschen. Apr. 24

38. BRIZA.

120. *Br. MEDIA*, spiculis ovatis 7-floris, gluma externa internis brevior, ligula brevissima obtusa. *Host II. t. 29. Fl. dan. 258. Engl. bot. 340. Sturm I. 2. Schk. I. t. 14.*

In pratis, pascuis frequentissima. Iun. 24

Br. minor Linn., quae stipula lanceolata longissima et gluma externa internas excedente dif-

frs., apud nos non obvia. (Cf. *Hofst II. t. 28. Engl. bot. 1316.*)

131. *BR. ERAGROSTIS*, spiculis lanceolatis 16-floris, glumis coloratis, vaginae pubescentis ora barbata. *Schreb. t. 39.*

In agrorum versuris prope Vitzsburg, Oberschmon et Leimbach, rarissime. Iun. ☉

39. FESTUCA.

132. *F. OVINA*, panicula subsecunda, glumis teretiusculis basi glabris, culmo tetragono, foliis setaceis scabris. *Hofst II. t. 84. Leers t. VIII. f. 3. 4.*

In collibus apricis aridis abundanter. Iun. 24

Glumae vel muticae vel aristatae, viridi-coeruleae, vel xerampelinae; culmus magis vel minus tetragonus. Ex his varietatibus exponuntur F. rubra Leyss., amethystina Ej., tenuifolia Hofm., quae ad F. ovinam traducendae sunt.

133. *F. DURIUSCULA*, panicula secunda diffusa, spiculis late ovatis, glumis patulis aristatis ciliatis, culmo tereti, radice fibrosa. *Hofst II. t. 83. Engl. bot. 470. Leers t. VIII. f. 2. (Fl. dan. 848. huc non pertinet.)*

In pratis, pascuis et collibus herbidis sat frequens. Iun. 24

- * 134. *F. HETEROMYLLA*, panicula secunda rariusculante, spiculis ovatis, glumis subpatulis glabrusculis aristatis, culmo tereti; supra angulato, foliis caulinis planis subpubescentibus. *Jacqu. coll. II. p. 93. F. dumetorum fl. dan. 700. F. nemorum Leyss. Abh. der hall. naturf. Ges. p. 369.*

In nemoribus montosis, Rockenholz, Mittelholz, Lindberg, in der Brennau bei Fienstädt, im Langenberg bei Möncherode, Schleheroder Giehle etc. Iun. 24

40 CLASSIS III. TRIANDRIA.

- * 125. *F. SYLVATICA*, panicula secunda nutante, ramis laxis bracteatis, spiculis compressis muticis, foliis ensiformibus striatis radice repente. *Hofst II. t. 78. F. calamaria Smith fl. brit. I. p. 121.*

In nemoribus humidis ad Lodersleben semel legi.
Iun. 2

- * 126. *F. PRATENSIS*, panicula secunda erectiuscula laxa, spiculis linearibus compressis obtusiusculis, glumis cylindricis obsolete nervosis. *Curt. n. 66. F. elatior B. L.*

In pratis et pascuis humentibus. Iun. 2

127. *F. ELATIOR*, panicula subdiffusa nutante ramossissima laxa, spiculis ovato-lanceolatis acutis, glumis cylindricis obsolete nervosis. *Hofst II. t. 79. Curt. n. 66.*

In pratis et pascuis ubertim. Iun. 2

128. *F. MYRUS*, panicula secunda nutante elongata, glumis subulatis aristatis apice scabris, foliis setaceo-subcarinatis brevissimis. *Hofst II. t. 93. Engl. bot. 1412. Leers t. III. f. 5.*

In collibus aridis ad Kröllwitz, vor der Heide.
Iun. ☉

40. BROMUS.

129. *Br. SECALINUS*, paniculae racemosae patentis ramis semiverticillatis subsimplicibus, spiculis ovatis compressis 10-floris, glumis teretiusculis turgidis. *Hofst I. t. 12. Engl. bot. 1171.*

In arvis frequens. Iun Iul. ☉

Br. squarrosus L., quem nonnulli hic invenire voluerunt, vix differt a Br. secalino. Tota species dubia Smithii auctoritate fl. brit. I. p. 129.

130. *Br. MOLLIS*, paniculae erectae coarctatae ramis subdivisis semiverticillatis, spiculis ovatis, glumis imbricatis depresso nervosis pubescentibus.

*Hofst I. t. 19. Engl. bot. 1078. Curt. n. 3.
Schreb. t. 6. f. 1.*

In pascuis et agris vulgaris, Iul. ♂

*Varietas humillima, panicula depauperata, Br.
natus Weig. obs. t. 1. f. 9, frequenter occurrit.*

131. *Br. lanxensis*, paniculae patentis ramis subdivi-
sitis, spiculis lanceolatis 8-floris subcoloratis,
glumis ellipticis imbricatis depressis glabriuscu-
lis margine scariosis. *Hofst I. t. 14. Leers
t. XI. f. 3. (Br. arvensis fl. dan. t. 293, non
huius loci.)*

Inter segetes, praesertim ad Seeben rarius. Iul. ♂

132. *Br. xanthus*, paniculae erectae ramis subfim-
plicibus, spiculis truncatis sub 5-floris, glumis
acuminatis glabriusculis, foliis radicalibus an-
gustissimis ciliato-pilosis. *Engl. bot. 471. Br.
agrestis Allion. Hofst I. t. 10. Br. peren-
nis Villars. Br. arvensis Pollich.*

In pascuis arenosis unter dem Vogelsberge bei
Bennstädt, *Kohl*, bei Karsdorf und Burgschei-
dungen. Iul. 4

133. *Br. asper*, paniculae nutantis ramis subdivi-
sitis, spiculis lineari-oblongis sub 8-floris,
glumis lanceolatis subnerviis asperis, foliis
inferioribus hirsutis. *Hofst I. t. 7. Engl.
bot. 1172. Br. hirsutus Curt. n. 18. Br.
montanus Pollich.*

In nemoribus et dumetis humidiusculis ad Erde-
born, *Kollenbey*, *Schkopa*, *Beuchlitz*, passim.
Iul. ♂

134. *Br. exarilis*, paniculae nutantis ramis subfim-
plicibus semiverticillatis, spiculis truncatis sub
8-floris, glumis patentibus remota longissime
acuminatis scabriusculis, foliis pubescentibus,
Hofst I. t. 16. Curt. n. 4. Leers t. XI. f. 4.

In agris, hortis, pomariis fere ubique. Iun. etc. ♂

42 CLASSIS III. TRIANDRIA.

135. *Br. tectorum*, paniculae secundae cornuae ramis subsimplicibus semiverticillatis pubescentibus, spiculis oblongis sub 6-floris, glumis lanceolatis subimbricatis ciliatis margine scariosis, vaginis foliorum deorsum pubescentibus. *Hofst. I. t. 15. Leers t. X. f. 2.*

In hortis, ad vias, in tectis stramineis ubertim. Iul. etc. ☉

136. *Br. giganteus*, paniculae secundae nutantis ramis subdivisis, spiculis ovato-lanceolatis glabris quinquefloris, glumis lanceolatis ventricosis glabriusculis, arista flexuosa, foliis ensiformibus nervosis. *Hofst. I. t. 6. Cart. n. 53. Fl. dan. 440. Schreb. t. 11. Leers t. X. f. 1.*

In dumetis et nemusculis humentibus ad Passendorf, Schlettan, Kollenbey copiose. Iul. 2

137. *Br. inermis*, paniculae erectae patentis ramis verticillatis subdivisis demum nutantibus, spiculis subteretibus linearibus glabris, glumis imbricatis coloratis submuticis. *Hofst. I. t. 9. Schreb. t. 13.*

In pratis fertilibus ad Gimritz, auf der grossen Wiese frequens. 2

41. AVENA.

138. *A. fatua*, paniculae erectae ramis subdivisis pendulis, spiculis subtrifloris, glumis basi pilosis omnibusque aristatis enervibus. *Hofst. II. t. 53. Schreb. t. 15.*

Inter segetes abundat. Iul. ☉

- * 139. *A. strigosa*, paniculae subcontractae ramis simplicibus, spiculis subtrifloris, glumarum nitidarum nudarum valvula exteriori triaristata, arista media dorsali tortili longissima. *Hofst. II. t. 50.*

Inter segetes, praesertim Avenam et Hordeum. Iul. ☉

140. *A. PUBESCENS*, panicula erecta racemosa, spiculis subtrifloris, receptaculis barbatis, glumis externis internisque membranaceis diaphanis, foliis planis pubescentibus. *Hofst II. t. 50. Fl. dan. 1203. Leers t. IX. f. 2. A. sesquitectia L. et Leyss. huc pertinet.*

In pratis umbrosis, nemoribus humentibus ad Gutenberg, Bölberg, hinter Bennstädt, bei Kröllwits. Iun. Iul. 24

141. *A. PRATENSIS*, panicula erecta racemoso-spicata, spiculis subquinquefloris, rhacheos dentibus receptaculisque pilosis, foliis involutis ferrulatis nudis. *Hofst II. t. 51. Engl. bot. 1204. Fl. dan. 1203. Leers t. IX. f. 1.*

In pratis editioribus ad Gutenberg et Rockenholz. Iul. 24

142. *A. FLAVESCENS*, paniculae laxae subnutantis ramulis semiverticillatis capillaribus, spiculis obovatis subtrifloris, glumis remotiusculis, receptaculis pilosis, foliis planis subpubescentibus. *Curt. n. 35. Schreb. t. 9. Leers t. X. f. 5.*

In pratis editioribus et ad vias vulgaris. Iul. 24

42. ARUNDO.

143. *A. PHRAGMITES*, panicula diffusa ramosissima; spiculis quinquefloris, glumis inaequalibus acutius muticis nervosis. *Engl. bot. 401. Leers t. VII. f. 1.*

In fossis, lacubus, stagnis et piscinis vulgarissima. Aug. 24

144. *A. FRIGIOS*, panicula erecta, glumis externis unifloris, internas aristatas excedentibus, imbricato-congestis secundis, foliis lanceolatis. (*Engl. bot. 402. non opt.*)

In fossis umbrosis, Pulverweiden. Aug. 24

145. *A. COLORATA*, panicula erecta glomerata, glumis externis secundis unifloris internas multi-

44. CLASSIS III. TRIANDRIA.

as excedentibus, foliis lanceolatis. *Phalaris arundinacea* L. *Hofst* II, t. 33. *Fl. dan.* 259. *Leers* t. VII. f. 3.

In fossis, stagnis, ad ripas fluviorum vulgarissima. Iulio, 24

43. LOLIUM.

146. *L. PERENNE*, spiculis muticis glumae ext. longioribus, glumis int. lanceolatis. *Hofst* I, t. 25. *Engl. bot.* 315. *Schreb.* t. 37.

In hortis, pascuis, pratis fere ubique. Aestate; 24

147. *L. TEMULENTUM*, spiculis aristatis glumae ext. brevioribus, glumis internis ellipticis, calmo superne scabro. *Hofst* I, t. 26. *Fl. dan.* 160. *Engl. bot.* 1124. *Schreb.* t. 36.

Inter segetes frequens. Aestate. ☉

* 148. *L. ARVENSE*, spiculis submuticis longitudine glumae externae, glumis internis ellipticis, calmo glaberrimo, *Smith. Moris. sect. VIII.* t. 2, f. 1.

Inter segetes rarius; eodem tempore. ☉

44. CYNOSURUS.

149. *C. CRISTATUS*, involucris pectinatis distichis, muticis, spica simplici lineari. *Hofst* II, t. 96. *Schreb.* t. 8. f. 1. *Engl. bot.* 316. *Leers* t. VII. f. 4.

In pascuis siccioribus vulgaris. Iun. Iul. 24

45. TRITICUM.

150. *T. SYLVATICUM*, spica nutante secunda, spiculis remotis teretiusculis sub 7-floris, glumis imbricatis subpubescentibus, aristis glumae excedentibus, *Bromus sylvaticus* *Hofst* I, t. 21. *Br. pinnatus* *fl. dan.* 164. *Br. gracilis* *Weig. obs.* t. 1. f. 11. *Leyss. fl. hol. et Abb. des Hall. nat. Ges.* p. 370.

In nemoribus ad Zöberitz, Kollenbey, Guten-
berg, Fienstädt, Neehausen etc. Iul. 2.

151. TR. PINNATUM, spica erecta disticha, spiculis remotis teretiusculis sub 10-floris, glumis imbricatis hispidis, aristis gluma brevioribus, foliis nudiusculis. *Bromus pinnatus* Host I. t. 22.

In campis editoribus ad vias, zwischen Seeberg et Gutenberg, bei Bennstädt et alibi. Iul. 2.

Br. pinnatus L. (sub quo *Br. sylvaticus* Pollich. f. *gracilis* Weig. et *Br. pinnatus* Weig. laevis) ad *Bromos* pertinere nequit, tum quod spicatum est gramin, tum quod arista ex ipso apice valvulae prodit. Hinc, praecedente Hallero (hist. stirp. helv. II. p. 212. 213. n. 1431. 1432.) *Triticum* nuncupandum est utrumque.

152. TR. REPENS, spica erecta disticha, spiculis ovatis quinquefloris, glumis omnibus nervosis acuminatis subulatis subaristatis, foliis planis, radice repente. Host Fl. t. 21. Fl. dan. 748. Schreb. t. 26.

In cultis et agris frequens. Iul. 2.

153. TR. CANINUM, spica erecta demum nutante disticha, spiculis ovatis quadrifloris, infimis geminis, glumis longe aristatis, foliis planis subhirsutis, radice fibrosa. *Elymus caninus* L. Host II. t. 25. Leers t. XII. f. 4.

In nemoribus auf dem Trothaischen Werder, der Peisnitz, dem Rocken- und Mittelholze. Iul. 2.

46. HORDEUM.

154. H. MONTANUM, involuorum foliolis intermedii laevicolatis ciliatis, glumis lateralibus masculis aristatis. Host I. t. 32. Curt. n. 55. Fl. dan. 629.

Ad vias, in ruderalis, versuris fere ubique. August. ☉

46 CLASS. III. TRIANDR. TRIGYN.

155. *H. scabellum*, involuerorum foliis omnibus fetaceis scabris, glumis lateralibus masculis subaristatis. *Hofst* I. t. 33. *H. pratense* Engl. bot. 409.

In pratis vulgatissimum. Aestate. 2.

Radix fibrosa perennis, interdum tuberosa; culmi altiores priori, stricti superne nudi, spica praecedente angustior, strigosior; glumae laterales longius pedicellatae multoque brevius aristatae.

47. POLYCNUM.

156. *P. arvense*, caule ramoso, foliis subulatis triquetris. *Sohl.* I. t. 5.

In campis editioribus arenoso-calcareis, ad Benz, Stadt, Kölme, Langenbogen etc. Jul. ☉

TRIGYNIA.

48. MONTIA.

157. *M. fontana*. *Michel.* t. 13. f. 2. *Fl. dan.* 131. *Curt.* n. 32. *Engl. bot.* 1206. *Sturm* I. 11.

In campis herbidis, locis humidis inundatis, am Dölauer Wege nach der Heide zu (*Kohl.*) Maio. ☉

Herba debilis, glabra ramosa subsucculenta vis digitalis; folia opposita spathulata integerrima; flosculi albi; variat interdum partium numero.

49. HOLOSTEUM.

158. *H. umbellatum*, floribus umbellatis. *Fl. dan.* 1204. *Engl. bot.* 27.

In agris, arvis, hortis, muris limosis abundanter. Apr. ☉

Variat nonnunquam partium numero.

CLASS. IV. TETRAND. MONOG. 249

CLASSIS IV.

TETRANDRIA.

MONOGYNIA.

* *Flores monopetali monospermi inferi:*
aggregati.

50. GLOBULARIA. *Anthod. imbricatum.*
Rec. paleaceum. Cal. tubulosus 5-den-
tatus. Cor. subbilabiata. Sem. nudum.

** *Flores monopetali monospermi superi:*
aggregati.

51. DIPSACUS. *Anthod. polyphyllum.*
Rec. paleaceum. Cal. 1-phyllus. Sem.
columnare, pappo cyathiforini.

52. SCABIOSA. *Anthod. polyphyllum,*
subimbricatum. Rec. villosum aut pa-
leaceum. Cal. duplex papposus, arista-
tus aut membranaceus. Utriculus 1-
spermus.

53. SANGUISORBA. *Anthod. o. Cal. 2-*
phyllus inferus. Cor. rotata supera.

*** *Flores monopetali dispermi superi.*
Rubiaceae Juss. Stellatae Batsch.

54. SHERARDIA. *Cal. 4-dentatus per-*

48 CLASSIS III. TETRANDRIA.)

fistens. Cor. infundibuliformis. Sem.
calyce coronata.

55. ASPERULA. Cor. tubulosa. Sem.
nuda.

56. GALIUM. Cor. rotata. Sem. nuda
subglobosa.

**** Flores monopétali polyspermi in-
feri.

57. PLANTAGO. Cal. 4-fidus. Cor. 4-
fida limbo reflexo. Stam. longissima.
Caps. 2-locularis circumscissa.

58. CENTUNCULUS. Cor. tubulosa.
Caps. 1-locularis circumscissa.

***** Flores tetrapétali.

59. CORNUS. Cal. minimus superus 4-
dentatus. Drupa 2-locularis.

***** Flores apétali.

60. PARIETARIA. Cal. 4-fidus. Sem.
calyce tectum.

61. ALCHEMILLA. Cal. 8-fidus. Sem.
nudum.

/TETRAGYNIA.

62. SAGINA. Cal. 4-phyllus. Cor. 4-pe-
tala. Caps. 1-locularis.

MONOGYNIA.

49

63. **RADIOLA.** *Cal. multifidus. Cor. 4-petala. Caps. 8-locularis 8-valvis.*

64. **POTAMOGETON.** *Cal. o. Cor. 2-petala. Sem. 4 corticata.*

† *Gentiana uliginosa, campestris, Crucjata, Rhamnus catharticus, Evonymus europaeus, Ulnus campestris. Cuscuta europaea (V), Convallaria bifolia (VI), Cl. XI. tota, Cardamine hirsuta (XII), Urtica, Alnus (XVIII), Viscum (XIX).*

MONOGYNIA.

50. GLOBULARIA.

159. **GL. VULGARIS,** caule herbaceo simplicissimo, foliis radicalibus spathulatis retusis, caulinis oblongo-lanceolatis integerrimis cuspidatis: *Morif. f. VI. t. 15. f. 46. Schk. t. 21.*

In montosis apricis calcareis ad Bennstädt, Kölme, Seeburg, copiose. 24

51. DIPSACUS.

160. **D. SYLVESTRIS,** foliis oppositis serratis, paleis rectis, involucris inflexis capitulo longioribus. *Curt. n. 34.*

In sepibus humidiusculis ad Nietleben, Roitsch hinter Brehna, sed rarius. Iul. ♂

D. fullonum; ubertim cultus, viz spontaneus, paleis uncinatis, foliis omnibus connato-perfoliatis, involacro capitulum non excedente dignoscitur.

161. **D. PILOsus,** foliis petiolatis auriculatis, involucris deflexis capitulo aequalibus. *Curt. n. 9.*

In dumetis, ad fossas prope Kölme, Quillschina, Benckendorf et Neehausen. Aug. 24

50 CLASSIS IV. TETRANDRIA.

52. SCABIOSA.

* *Corollulis 4-fidis.*

162. *Sc. succisa*, corollulis aequalibus, foliis radicalibus ovali-lanceolatis integerrimis, caulinis lanceolatis subintegris, floribus subglobosis.

Curt. n. 32. Fl. dan. 279.

In pascuis et nemusculis subhumidis ad Nietleben, Granau, Schlettau, Gutenberg frequens. Aug. 24

Rec. villosum. Cal. setaceus et membranaceus.

163. *Sc. arvensis*, corollulis radiantibus, foliis pinnatifidis incis, caule hispido. *Curt. n. 48. Fl. dan. 447.*

In pratis omnibus et campis herbidis vulgaris. Iun. Iul. 24

* *Rec. villosum. Cal. subpaleaceus, membranaceus.*

** *Corollulis 5-fidis.*

164. *Sc. columbaria*, corollulis radiantibus, foliis radicalibus subintegris ovatis lyratis crenatis, caulinis pinnatifidis laciniis linearibus. *Fl. dan. 314. Engl. bot. 1311.*

In pratis editioribus, campis arenosis, montosis apricis. Iul. Aug. 8

Flores coerulei aut ochroleuci; folia radicalia saepius decidua aut magis vel minus pinnatifida ludunt, sicut et caulina, quae quandoque bipinnatifida. *Sc. ochroleuca itaque (monente praeceptore Weigelio obs. bot. p. 23. 24.) sola varietas esse videtur.*

53. SANGUISORBA.

165. *S. officinalis*, spicis ovatis. *Fl. dan. 97. Engl. bot. 1312.*

In pratis humidis, den Pulverweiden, ad Gimritz copiose. Iul. Aug. 24

54. SHERARDIA.

166. *Sh. arvensis*, foliis omnibus verticillatis, floribus terminalibus. *Curt. n. 53. Fl. dan. 439.*

- Inter segetes copiose, hinter Kröllwitz, bei Nietleben, Passendorf. ☉

55. ASPERULA.

167. *A. ODORATA*; foliis octonis lanceolatis, florum fasciculis pedunculatis, seminibus hispidis. *Curt. n. 43. Fl. dan. 562. Schk. t. 23.*

In nemoribus humidis ad Seeben, in der Heide et alibi frequens. Maio. Iun. 24

168. *A. TINCTORIA*, foliis linearibus, inferioribus senis, intermediis quaternis, caule flaccido, floribus plerisque trifidis.

In sylvaticis et nemoribus montosis, ad Gutenberg, in der Heide. Iun. 24

169. *A. CYNANCHICA*; foliis quaternis linearibus inaequalibus, superioribus oppositis, caule erecto, floribus 4-fidis. *Engl. bot. 33.*

In montosis apricis vulgarissima. Aestate. 24. Flores purpurascens.

56. GALIUM.

* *Seminibus glabris.*

170. *G. CRUCIATA*, foliis quaternis ovatis hirsutis, caule simplici piloso, pedunculis lateralibus 2-phyl-
lis. *Engl. bot. 143. Sturm I. 7. Valantia Cruciata L.*

In nemoribus, sylvis fere omnibus. Maio. Iun. 24

171. *G. PALUSTRE*, foliis quaternis obtusis inaequalibus, caulibus diffusis. *Fl. dan. 423.*

In fossis fere omnibus, paludibus. Iun. Iul. 24

172. *G. ULIGINOSUM*; foliis senis lanceolatis retrorsum serrato-aculeatis mucronatis rigidis, corollis fructu maioribus.

In fossis, pratis humidis. Iul. 24

173. *G. BOCCONT*, foliis senis subasperis mucronatis, pedunculis subtrichotomis; caulibus tetrago-

52 CLASSIS IV. TETRANDRIA.

nis prostratis basi pubescentibus. *Willd. G. sylvestre Leyfs., asperum Schreb.*

In nemoribus montosis, Heide, Zorgs, Lindberg, bei Gutenberg, Roeken- und Mittelholz copiose. Maio, Iul. 24

- *174. *G. SCABRUM*, foliis subocionis linearibus scabris mucronatis, caule subtetragonó adscendente basi ramoso. *Jacqu. austr. 422.*

In montosis calcareis, auf dem Vogelsberge bei Bannstädt, bei Gutenberg Iun. 24

175. *G. SPURIMUM*, foliis subocionis lanceolatis margine cauleque retrorsum aculeatis, pedunculis axillaribus 3-floris; feminibus nutantibus rugulosis.

Inter segetes. Maio, Iun. Iul. ☉

176. *G. VERUM*, foliis octonis linearibus fulcatis integerrimis scabris, floribus paniculatis congestis. *Curt. n. 63. Fl. dan. 1146.*

In pratibus, versuris, ad vias vulgatissimum. Iul. 24
Flores *constanter lutei.*

177. *G. MOLLUGO*, foliis octonis ellipticis obtusiusculis mucronulatis margine scabris, floribus paniculatis divaricatis. *Fl. dan. 455.*

In pratibus, aggeribus, ad versuras, in campis herbidis vulgatissimum. Iun. Iul. 24

178. *G. SYLVATICUM*, foliis verticillatis lato-lanceolatis laevibus subtus scabris, floralibus binis, pedunculis capillaribus, caule teretiusculo laevi debili.

In nemoribus et sylvis umbrosis maxime im Roeken- und Mittelholze. Aug. Sept. 24

179. *G. GLAUCUM*, foliis verticillatis lineatis, pedunculis subtrichotomis teretiusculo, floribus congestis. *Jacqu. austr. t. 81. (Fl. pertinet.)*

montensis nemorosis, Lindberg, Zorgs, Hackenholz. *Iun. Jul.* 24

Huc sine dubio: G. montanum altissimum, foliis angustissimis, subtus albicantibus R. upp. jen. 5, quod ad G. montanum falso reducitur.

•• *Seminibus hispidis.*

180. *G. BOREALE*, foliis quaternis lanceolatis subinaequalibus trinerviis glabris, caule erecto. *Fl. dan. 1024. Engl. bot. 105.*

In pratis fere omnibus. *Iun. etc.* 24

181. *G. APARINE*, foliis octonis lanceolatis carinatis scabris retrorsum aculeatis, caule flaccido. *Curt. n. 17. Engl. bot. 816. Fl. dan. 495.*

In sepibus, dumetis, versuris vulgare. *Iup. O*

57. PLANTAGO.

182. *PL. MAJOR*, foliis ovatis glabriusculis petiolo brevioribus, scapo tereti, spica cylindrica. *Curt. n. 16. Fl. dan. 461. Hayne und Dreves t. 25.*

In pratis, pascuis et ad vias ubique. *Aestate.* 24

183. *PL. MEDIA*, foliis ovatis pubescentibus petiolo longioribus, scapo tereti, spica cylindrica. *Curt. n. 48. Fl. dan. 581.*

Ibidem eodem tempore. 24

184. *PL. LANCEOLATA*, foliis lanceolatis nervosis utrinque acutis, scapo angulato, spica ovata. *Curt. n. 15. Fl. dan. 437. Engl. bot. 507.*

Ibidem eodem tempore. 24

185. *PL. MARITIMA*, foliis linearibus canaliculatis subintegerrimis basi lanatis, scapo tereti, spica cylindrica. *Fl. dan. 243. Engl. bot. 175.*

In inundatis salis et pratis ad lacum salum bei Rolandorf; Seeburg, ad stagnum Kölmense, Dietlau; Liebenau, Dölau etc. *Aug.* 24

54 CLASSIS IV. TETRANDRIA.

Folia interdum subdentata, unde varietas *P. dentata* Roth. et Wöhlleb.

* 186. *PL. WULFFENII*, foliis linearibus semicylindraceis laxiusculis margine diaphanis basi lanatis, scapo tereti pubescente, spica cylindrica, bracteis calyce brevioribus.

Pl. subulata Wulff. in Jacqu. collect. 1. p. 204 — 206. t. 10. (excl. synonym. Linn.)

Coronopus f. *Serpentina Goritiensis Matthiol. com.* in Dioscor. p. 286 Dodon. p. 109. Lebel. hist. p. 240. f. 2.

Coronopus, serpentaria omnium minima I. Bauhin. hist. III. p. 511.

Plantago mollis f. *Holosteum strictissimo folia maius* C. Bauh. pin. 190. Moris. III. sect. 8. tab. 16. f. 27.

Plantago n. 9. Gerard. gallopr. p. 334.

Pl. maritima β *minima* Poiret. encycl. 5. p. 382.

Coronopus serpentina omnium minima Knauth. 151.

Plantago gramineo folio minor Buxb. 263. *Pl. maritima* β *subulata* Leyss. 35. *Pl. subulata* Wöhlleb. 8. Roth., Hofm.

An den Hügeln und Weinbergen bei Köln, Mülberdorf und Rolsdorf (Knauth.) In solo argilloso prope Dölau. Iun. Iul. 2.

NB. *Pl. subulata* L. in Galloprovincia credit, toto coelo a nostra diversa. Namque planta solummodo uncialis, quum nostra palmaris sit aut spithamea: folia *Pl. subulatae* rigidissima subpungentia unguicularia caespites formant rosaceos densissimos centro lanatos; nostrae folia laxiuscula, ne *subulata* quidem, sesquipollicaria margine diaphana et sub lente fere ciliata caespitem unicum formant rarum. *Pl. subulatae* scapus foliis vix, nostrae duplo longior; illius spica semiunguicularia,

nostrae pollicaris. Ad Pl. subulatam pertinent:
Holosteum strictissimo folio minus C. Bauh. pin.
 190. *Serpentina omnium minima* Lobel. stirp.
 hist. 240. f. 3. *Coronopus maritimus* Raynaudeti
 10. Bauh. hist. III. p. 511., ic. bona. *Holosteum*
f. Serpentaria omnium minima Morisf. III. sect. 8.
 t. 17. f. 29. *Pl. foliis triangulari-prismaticis*
Guettard obs. II. p. 428. *Pl. n. 8. Gerard*
gallopr. 334.

Pl. maritima differt: seatura altiore, foliis la-
tioribus, margine non diaphanis, carnosis, sub-
inde dentatis, spica longiore, bracteis calyce fere
longioribus.

Pl. serpentina Vill. differt: foliis basi nudis,
recurvatis, bracteis calyce longioribus. Ad hanc
pertinent: Pl. mollis f. Holosteum laeve massiliense
C. Bauh. pin. 290. *Coronopus massiliotum* C.
 Bauh. hist. III. 510. *Morisf.* III. sect. 8. t. 17.
 f. 28. *Pl. recurvata* Linn. mantiss. et forte *Pl. in-*
curvata Murr. comm. gott. 1780. p. 19. t. 6.

58. CENTUNCULUS.

187. *C. MINIMUS.* Curt. n. 31. *Fl. dan.* 177.
Engl. bot. 531.

In ericetis inundatis vor der Heide rarius. Iul. ☉

Caulis uncitilis parum ramosus; folia alterna
 sessilia ovata integerrima glabra; flores axillares
 solitarii albidi aut rubicundi sola meridie expansi.

59. CORNUS.

188. *C. MASCULA*, arborea, umbellis involucrum ae-
 quantibus. Schk. t. 24.

Ad vineas circa Rolsdorf, in sepibus ad Schmon,
 Leimbach. Mart. h. 2 (Flores lutei.)

189. *C. SANGUINEA*, arborea, ramis rectis, foliis ova-
 tis tuncoloribus, cymis depressis. *Fl. dan.* 481.
Engl. bot. 249.

56 CLASSIS IV. TETRANDRIA.

In sylvis et sepibus vulgaris. Maio, Jun. 5. Ra-
mi sanguinei; flores albi.

60. PARIETARIA.

190. *P. OFFICINALIS*, foliis lanceolato-ovatis basi
uninerviis, involucri septemfidi triflori laciniis
ovatis, caule erecto. *Curt. n. 39. Schk.
Fl. t. 344. Fl. dan. 521. Engl. bot. 879.
Sturm I. 9.*

In ruderatis et ad muros desolatos e. g. arcis Mau-
ricianae. Aestate. 4.

61. ALCHEMILLA.

191. *A. VULGARIS*, foliis plicatis lobatis, corymbis
terminalibus. *Fl. dan. 693. Engl. bot. 597.
Sturm I. 2.*

In pratis nemorosis ad Döllnitz, Liebenau, syl-
vaticis ad Lodersleben, Schleberode, passim.
Jun. 4.

192. *A. APHANES*, foliis planis trilobatis incisus, flo-
ribus axillaribus glomeratis submonandris. *Fl.
dan. 973. Schk. t. 26.*

In campis editioribus arenosis, inter Roken- et
Mittelholz et alibi copiose. Aestate. ☉

TETRAGYNIA.

62. SAGINA.

193. *S. PROCUMBENS*, caulibus procumbentibus radi-
cantibus glabris, petalis brevissimis integris.
Curt. n. 27. Engl. bot. 880. Schk. t. 27.

In ambulacris hortorum, arenosis, muris, locis
inundatis frequens. Aestate. ☉?

194. *S. APETALA*, caulibus erectiusculis pubescenti-
bus, petalis obsoletis emarginatis. *Curt.
n. 49. Engl. bot. 881.*

In agris editioribus hinter der Bergschenke. Ae-
state. ☉

63. RADIOLA.

195. R. WILLEBRAND SMITH. *Fl. dan.* 178. *Engl. bot.* 893. *Linum Radiola* L.

In inundatis sabulosis, maxime hinter der Heide in den Fahrwegen nach Kölme, Lieskau etc. Iul. ☉.

64. POTAMOGETON.

196. P. NATANS, foliis inferioribus linearibus, superioribus oblongo-ovatis petiolatis natantibus. *Fl. dan.* 1025. *Sturm* I. 9.

In fossis, lacubus, stagnis vulgaris, e. g. auf dem Badeplatz, Iul. 2.

197. P. PERFOLIATUS, foliis cordatis amplexicaulibus omnibus immerfis. *Fl. dan.* 196. *Engl. bot.* 168.

In stagnis, lacubus et fluviis copiose. Iun. 2.

198. P. LUCENS, foliis ovato-lanceolatis in petiolo attenuatis omnibus immerfis, stipula multiflora coarctata. *Fl. dan.* 195. *Engl. bot.* 376.

Iisdem locis cum priori. Iun. 2.

199. P. CRISPUS, foliis lanceolatis alternis undulatis serratis omnibus immerfis. *Curt. n.* 49. *Fl. dan.* 927.

200. P. COMPRESSUS, foliis linearibus obtusis, stipulis folio latioribus subbifidis, caule compresso. *Fl. dan.* 203. *Engl. bot.* 418.

Ibidem cum prioribus.

- * 201. P. GRAMINEUS, foliis lineari-lanceolatis alternis sessilibus stipula latioribus, caule tereti subdichotomo. *Fl. dan.* 222. (*Smith. engl. bot.* t. 1285. *hunc tamen alium habet: P. heterophyllum.*)

In fossis hinter der faulen Kneipe. Iun. 2.

58 CLASSIS V. PENTANDRIA.

202. *P. PUSILLUS*, foliis linearibus oppositis alternisque stipula angustioribus basi patentibus, caule tereti, pedunculis axillaribus. *Engl. bot.* 215.

Ibidem cum prioribus.

203. *P. PECTINATUS*, foliis setaceis parallelis approximatis distichis basi vaginantibus. *Fl. dan.* 186. *Engl. bot.* 323. Huc etiam *P. marinus* *Smith*, *fl. brit.* I. p. 197.

CLASSIS V.

PENTANDRIA.

MONOGYNIA.

* Flores monopetali inferi 4-spermi.
Semia corticata, Asperifoliae.

† Corollae faux clausa fornicibus.

65. *MYOSOTIS*. Cor. hypocrateriformis quinquefida subemarginata.

66. *ANCHUSA*. Cor. infundibuliformis. Semina basi forata.

67. *CYNOGLOSSUM*. Cor. infundibuliformis.

68. *ASPERUGO*. Cal. fructus compressus, lamellis plano-parallelis sinuatis.

69. *LYCOPSIS*. Cor. tubus incurvatus.

†† *Corollae faux radiis clausa,*

70. BORAGO. *Cor. rotata;*

71. SYMPHYTUM, *Cor. tubuloso-ventricosa,*

††† *Corollae faux nuda pervia,*

72. LITHOSPERMUM. *Cor. infundibuliformis. Cal. 5-partitus,*

73. PULMONARIA. *Cor. infundibuliformis. Cal. prismatico-pentagonus.*

74. ECHIUM, *Cor. irregularis. Stigma bipartitum,*

.. ** *Flores 1-petali inferi angiospermi,*

† *Capsula unilocularis,*

75. ANAGALLIS. *Cor. rotata: Caps. circumscissa. Stam. hirsuta,*

76. LYSIMACHIA, *Cor. rotata: Caps. 10-valvis, Filamenta basi subconnata,*

77. PRIMULA, *Cor. tubo cylindrico. Caps. ore 10-dentato. Stigm. globosum.*

78. ANDROSACE, *Cor. hypocrateriformis, faucis annulo tumida. Caps. ore 5-dentato.*

79. HOTTONIA, *Cor. hypocrateriformis. Stam. fauci imposita,*

60 CLASSIS V. PENTANDRIA.

80. MENYANTHES. *Cor.* hirsuta. *Stigm.*
2-fidum.

†† *Capsula bilocularis.*

81. VERBASCUM. *Cor.* rotata. *Stigm.*
simplex. *Stam.* declinata barbata.

82. CHIRONIA. *Cor.* hypocrateriformis.
Antherae demum spirales.

83. DATURA. *Cor.* infundibuliformis.
Cal. deciduus. *Caps.* 4-valvis.

84. HYOSCYAMUS. *Cor.* infundibuli-
formis. *Stam.* inclinata. *Caps.* oper-
culata.

85. CONVULVULUS. *Cor.* campanulata
plicata. *Stigmata* duo. *Caps.* 2-vel 3-
locularis. *loculis* 2-spermis.

86. SOLANUM. *Bacca* 2-locularis. *Cor.*
rotata. *Antherae* subcoalitae apice por-
ro gemino dehiscentes.

87. PHYSALIS. *Bacca* 2-locularis. *Cor.*
rotata. *Antherae* conniventes. *Cal.* in-
flatus.

88. VINCA. *Folliculi* duo erecti. *Cor.*
hypocrateriformis.

*** Flores 1-petali superi.

89. CAMPANULĀ. Cor. campanulata. Stigm. 3-fidum. Stam. basi dilatata fornicata. Caps. 3 — 5-locularis, lateribus forata.

90. SAMOLUS. Cor. hypocrateriformis. Caps. 1-locularis apice 5-dentata.

91. LONICERA. Cor. irregularis basi gibba. Bacca 2-locularis polysperma.

92. JASIONE. Flores aggregati. Anthod. polyphyllum. Cor. 5-partita laciniis linearibus. Antherae coalitae. Stigma clavatum. Caps. semi 2-locularis; apice dehiscens, dissepimento ad axin diviso.

93. PHYTEUMA. Cor. 5-partita, laciniis apice conniventibus. Stigma 2 — 3-fidum. Caps. 2 — 3-locularis latere forato.

**** Flores 5-petali inferi.

94. RHAMNUS. Cal. urceolatus corollifer. Bacca 3-locularis.

95. EUONYMUS. Cal. planus 4 — 5-fidus. Petala 4, 5. Caps. 4 — 5-locularis colorata. Sem. arillata.

62 CLASSIS V. PENTANDRIA.

96. IMPATIENS. *Cal.* 2-phyllus.
irregularis calcarata. *Antherae*
connatae. *Caps.* 5-locularis elastica
filicis.

97. VIOLA. *Cal.* 5-phyllus basi pro-
tus. *Cor.* 5-petala irregularis pro-
cornuta. *Antherae* subcohaere
Caps. 3-valvis 1-locularis.

***** *Flores 5-petali superi.*

98. RIBES. *Petala* et *stamina* caly-
ferta. *Stylus* 2-fidus. *Bacca*
sperma.

99. HEDERA. *Stylus* simplex. *Bac-*
sperma calyce cincta.

***** *Flores incompleti.*

100. GLAUX. *Cal.* 1-phyllus color
Caps. 5-sperma supera.

101. THESIUM. *Cal.* 1-phyllus sta-
fer. *Sem.* 1-corticatum.

DIGYNIA.

* *Flores 1-petali inferi.*

102. CUSCUTA. *Cal.* 4 — 5-fidus.
4 — 5-fida. *Caps.* 2-locularis basi
cumscissa.

103. ASCLEPIAS. *Cal.* 5-dentatus
sistens. *Cor.* 5-partita. *Pollines* 1

mplices tuberculis 5 annexae sub plicis
yli haerentes. *Nectaria* 5 cuculla-
ti. *Folliculi* duo, feminibus papposis.

GENTIANA. *Cor.* basi tubulosa.
apf. 1-locularis 2-valvis.

** *Flores incompleti.*

ATRIPLEX. Flores ♂♀ mixti. *Cal.*
pentagonus persistens. ♀ 2-valvis
ersistens. *Sem.* 1.

CHENOPODIUM. Flores omnes ♂
cal. pentagonus 5-partitus persistens.
sem. 1. lenticulare.

HERNIARIA. *Capf.* 1-sperma cor-
cata calyce 5-partito tecta. *Filamenta*
sterilia.

ULMUS. *Cal.* 5-fidus. *Samara* com-
presso-membranacea.

*** *Flores 5-petali superi dispermi.*
Umbellatae.

A. Involucro universali partialique.

ERYNGIUM. Flores capitati. *Rac.*
aleaceum. *Sem.* muricata.

HYDROCOTYLE. *Umbella* sim-
lex. *Sem.* compressa.

62 CLASSIS V. PENTANDRIA.

96. IMPATIENS. *Cal.* 2-phyllus. *Cor.* irregularis calcarata. *Antherae* apice connatae. *Capf.* 5-locularis elastice difiliens.

97. VIOLA. *Cal.* 5-phyllus basi productus. *Cor.* 5-petala irregularis postica cornuta. *Antherae* subcohaerentes. *Capf.* 3-valvis 1-locularis.

***** *Flores 5-petali superi.*

98. RIBES. *Petala* et *stamina* calyci infera. *Stylus* 2-fidus. *Bacca* 5-sperma.

99. HEDERA. *Stylus* simplex. *Bacca* 5-sperma calyce cincta.

***** *Flores incompleti.*

100. GLAUX. *Cal.* 1-phyllus coloratus. *Capf.* 5-sperma supera.

101. THESIIUM. *Cal.* 1-phyllus staminifer. *Sem.* 1-corticatum.

DIGYNIA.

* *Flores 1-petali inferi.*

102. CUSCUTA. *Cal.* 4 — 5-fidus. *Cor.* 4 — 5-fida. *Capf.* 2-locularis basi circumscissa.

103. ASCLEPIAS. *Cal.* 5-dentatus persistens. *Cor.* 5-partita. *Pollines* binas

Amplices tuberculis 5 annexae sub plicis
styli haerentes. *Nectaria* 5 cuculla-
ta. *Folliculi* duo, seminibus papposis.

104. GENTIANA. *Cor.* basi tubulosa.
Capf. 1-locularis 2-valvis.

** *Flores incompleti.*

105. ATRIPLEX. Flores ♂♀ mixti. *Cal.*
♂ pentagonus persistens. ♀ 2-valvis
persistens. *Sem.* 1.

106. CHENOPODIUM. Flores omnes ♂
Cal. pentagonus 5-partitus persistens.
Sem. 1. lenticulare.

107. HERNIARIA. *Capf.* 1-sperma cor-
ticata calyce 5-partito tecta. *Filamenta*
5 sterilia.

108. ULMUS. *Cal.* 5-fidus. *Samara* com-
presso-membranacea.

*** *Flores 5-petali superi dispermi-*
Umbellatae.

A. *Involucro universali partialique.*

109. ERYNGIUM. Flores capitati. *Réc.*
paleaceum. *Sem.* muricata.

110. HYDROCOTYLE. *Umbella* sim-
plex. *Sem.* compressa.

64 CLASSIS V. PENTANDRIA.

111. **SANICULA.** *Umbellae subcapitatae disco abortiente. Semina uncinato-muricata.*

112. **BUPLEURUM.** *Involucella umbellulis maiora pentaphylla. Petala involuta. Fructus subrotundus compressus striatus.*

113. **ASTRANTIA.** *Involucella lanceolata patentia aequalia colorata. Flosculi centrales abortientes. Fructus rugosus.*

114. **DAUCUS.** *Involucra pinnatifida. Corollae subradiatae. Fructus muricatus.*

115. **CAUCALIS.** *Involucra indivisa. Corollae radiatae. Flores disci 7. Fructus subovatus striatus setis rigidis muricatus.*

116. **CONIUM.** *Involucella dimidiata sub 3-phylla. Petala aequalia. Fructus ovatus utrinque 5-costatus; costis ante maturitatem crenatis.*

117. **SELINUM.** *Involucra reflexa. Petala inflexo-cordata aequalia. Cal. integer. Fructus nudus ovali-oblongus.*

compresso-planus margine alatus medio 3-costatus.

118. ATHAMANTA. *Petala* inflexo-emarginata. *Cal.* integer. *Fructus* pilosus, ovali-oblongus convexus margine subalatus, medio costatus.

119. PEUCEDANUM. *Cal.* 5-dentatus. *Flores* disci abortivi. *Involucra* brevissima. *Fructus* ovali-oblongus convexus margine alatus, medio costatus.

120. LASERPITIUM. *Petala* inaequalia. *Fructus* utrinque quadrialatus.

121. HERACLEUM. *Involucrum* caducum. *Flores* radiantes. *Fructus* ellipticus planus apice emarginatus obsolete striatus margine alatus.

122. SIUM. *Corollae* aequales. *Fructus* sub lanceolatus convexus, utrinque 3-costatus (non alatus.)

B. *Involucro* partiali, universali nullo.

123. OENANTHE. *Corollae* diffformes, disci sessiles steriles. *Fructus* oblongus subangulatus calyce 5-dentato stylisque coronatus.

124. PHELLANDRIUM. *Corollae* dif-
formes omnes fertiles. *Fructus* ovatus
subangulatus calyce 5-dentato stylisque
coronatus.
125. CICUTA. *Corollae* regulares. *Fruc-*
tus subrotundus striatus.
126. AETHUSA. *Involucella* dimidiata
3-phylla pendula. *Fructus* subrotun-
dus costatus.
127. IMPERATORIA. *Cal.* 5-dentatus.
Corollulae aequales. *Fructus* ovalis
convexus margine alatus, medio 3-co-
status, apice stylis persistentibus refle-
xis coronatus.
128. SCANDIX. *Flores* radiantes. *Fruc-*
tus subulatus sulcatus vel asper.
129. CHAEROPHYLLUM. *Involucella*
reflexa concava. *Fructus* subulatus
laevis.
130. SESELI. *Umbellulae* subglobosae.
Fructus ovatus striatus.
Et Involucris nec partialibus nec uni-
versalibus.
131. PASTINACA. *Corollae* aequales
petalis integris inflexis. *Fructus* ovalis
planus margine alatus.

TRIGYNIA. TETRAGYNIA. 67

132. **ANETHUM.** *Corollae* aequales petalis integris inflexis. *Fructus* ovalis emarginatus convexus striatus margine alatus.

133. **CARUM.** *Involucrum* univ. submonophyllum. *Petala* emarginata inflexa. *Fructus* elliptico teretiusculus costatus.

134. **APIUM.** *Involucrum* univ. monophyllum. *Petala* inflexa aequalia. *Fructus* ovato-cordatus angulatus.

135. **PIMPINELLA.** *Fructus* ovato-oblongus striatus. *Stigmata* subglobosa.

136. **AEGOPODIUM.** *Fructus* teretiusculus costatus. *Petala* emarginata inflexa.

TRIGYNIA.

137. **VIBURNUM.** *Cal.* superus 5-partitus. *Cor.* 5-fida. *Bacca* monosperma.

138. **SAMBUCUS.** *Cal.* superus 5-partitus. *Cor.* 5-fida. *Bacca* 3-sperma.

TETRAGYNIA.

139. **PARNASSIA.** *Cal.* 5-partitus. *Cor.* 5-petala *Squamæ* 5 ciliatae apicibus globulosis. *Caps.* 4-valvis.

68 / GLASSIS V. PENTANDRIA.

PENTAGYNIA.

140. STATICE. *Cal.* 1-phyllus integer plicatus scariosus. *Cor.* 5-petala. *Sem.* 1 superum.

141. LINUM. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala. *Stamina* basi coalita. *Caps.* supera 10-valvis 10-ocularis.

HEXAGYNIA.

142. DROSERA. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 5-petala. *Caps.* supera 1-ocularis 3-valvis polysperma.

POLYGYNIA.

143. MYOSURUS. *Cal.* 5-phyllus appendiculatus. *Petala* 5, ungue tubuloso nectarifero. *Sem.* numerosa nuda.

Polygonum amphibium (VII), *Stellaria media*. *Cerastium semidecandrum*. *Spergula arvensis*, *pentandra* (VIII), *Erodium cicutarium* (XIII), *Classis tota* XVI. *Xanthium*. *Eryonia* (XVIII), *Humulus* (XIX).

MONOGYNIA.

65. MYOSOTIS.

204. *M. scorpioides*, seminibus glabris, foliis elliptico-lanceolatis, racemis ebracteatis multifloris. *Engl. bot.* 480.

α. *M. arvensis* Roth., Willd., Hofm. Fl. dan. 583. Foliis hirtis, corolla coerulesc., caule subsimplici.

γ. *M. latifolia* hirsuta. Dill. in Raii syn. 2. 9. f. 2.

δ. *M. palustris* Roth., Hofm. Foliis scabrisculis, corollis azureis, caule ramoso. Curt. n. 28. Sturm I. 5.

Habitat α. in arvis aridis ☉, γ. in umbrosis sylvaticis ☉, δ. in fossis, paludibus et ad scaturigines. 4. Per totam aetatem.

305. *M. LAPPULA*, feminibus glöchidas exserentibus, foliis lanceolatis pilosis. Fl. dan. 692.

In ruderalis, vineis, muris, Iun, Iul. ☉

66. ANCHUSA.

306. *A. OFFICINALIS*, spicis imbricatis secundis, bracteis ovatis, foliis lanceolatis. Fl. dan. 572. Sturm I. 18.

In ruderalis arenosis, versuris agrorum, ad Bölsberg, Lettin, Lieskau et alibi frequens. Iun. 24

67. CYNOGLOSSUM.

307. *C. OFFICINALE*, staminibus corolla brevioribus, foliis lato-lanceolatis tomentosis sessilibus. Curt. n. 43. Fl. dan. 1147. Engelm. bot. 2. 921. Sturm. I. 9.

In pagis ruderalis, ad vias. Maio, Iun. 24 Flores sordide rubræ. Odor totius plantae murinus.

* 308. *C. SYLVATICUM*, staminibus corolla brevioribus, foliis spatulato-lanceolatis lucidis nudiusculis subtus scabris. Wulff. in Jacqu. coll. 2. p. 77.

In sylvaticis umbrosis, in der Heide, auf dem Lindberge, bei Lodersleben passim. Iun. 8 Flores coeruleo-rufescentes. Odor non murinus.

70. CLASSIS V. PENTANDRIA.

68. ASPERUGO.

209. *A. PROCUMBENS*, calycibus fructua complanatis,
Fl. dan. 552.

In hortis, pomariis, ruderatis solo pinguiori.
Maio, ☉

69. LYCOPSIIS.

210. *L. ARVENSI*, foliis lanceolatis hispidis, calycibus
florescentibus erectis, *Curt. n.* 57. *Fl. dan.* 435. *Engl. bot.* 938.

In arvis et ad vias passim. Iun. ☉

211. *L. FULLA*, foliis integerrimis, caule erecto, calycibus
fructescentibus inflatis pendulis, *Jaeger. austr. t.* 188.

In agris inter segetes, solo maxime arenoso.
Iun. ☉

70. BORAGO.

212. *B. OFFICINALIS*, foliis omnibus alternis, calycibus
patentibus. *Engl. bot.* 36. *Sturm I.* 8.

In ruderatis, hortis, inter olera. Iun. ☉

71. SYMPHYTUM.

213. *S. OFFICINALE*, foliis ovato-lanceolatis decurrentibus,
Curt. n. 38. *Fl. dan.* 664. *Engl. bot.* 817. *Sturm I.* 17.

In pratia et ad fossas vulgatissima. Aest. 24 Flores
luteo-albidi; purpurei sunt in *S. patenti* *Sibth. oxon.* 70, quae varietas huius calyce
patenti est.

72. LITHOSPERMUM.

214. *L. OFFICINALE*, seminibus laevibus, corollia calycem
vix superantibus, foliis lanceolatis acutiusculis venosis. *Fl. dan.* 1084. *Engl. bot.* 134.
Sturm I. 5.

In nemoribus montosis et ad margines eorum,
in der Heide etc. Iun. 24

215. *L. ARVENSE*, seminibus rugosis, corollia calyce

MONOGYNIA.

71

sem. vix superantibus, foliis obtusis aveniis,
Fl. dan. 456. *Engl. bot.* 123.

In ruderatis, arvis, agris ubique. Apr. — Iun. ☉

216. *L. QUADRIFIDIO-CORRULGUM*, seminibus laevibus,
corollis calycem longe superantibus, foliis lan-
ceolatis acutis avenis. *Jacqu. austr.* t. 14.
Engl. bot. 117.

In nemoribus montosis, der Heide, Mittel- und
Rockenholz et alibi passim. Iun. 24

73. PULMONARIA.

217. *P. ANGUSTIFOLIA*, foliis radicalibus lanceolatis
Fl. dan. 483.

In nemoribus montosis, der Heide, Mittel- und
Rockenholz et alibi vulgaris. Apr. Maib. 4.

218. *P. OFFICINALIS*, foliis radicalibus ovato-corda-
tis hirsutis. *Fl. dan.* 482. *Engl. bot.* 118.

In nemorosis, der Heide, der Giehle, dem Ro-
cken- und Mittelholze. Variat foliis albo-macu-
latis rarius, ad Liebenau. Apr. Maio. 24

74. ECHIMUM.

219. *E. VULGARE*, caule tuberculato hispido, foliis
caulinis lanceolatis hispidis, spicis lateralibus
pitosis deflexis. *Fl. dan.* 445. *Engl. bot.* 181.
Scurm. I. 18.

In arvis et ruderatis vulgare. Iun. Iul.

Huc *E. violaceum* *With.* 233. caule ramosis-
si, staminibus longissimis, quae varietas interdum
occurrit.

75. ANAGALLIS.

220. *A. ARVENSIS*, foliis ovatis subtus punctatis, cau-
le procumbente ramofo. *Curt. n. 1.* *Fl. dan.*
88. *Engl. bot.* 529. *Scurm.* I. 1.

In arvis, agris et hortis vulgaris. Aestate. ☉

Variet floribus puniceis (*A. phoenicea* *Hefm.*
et *coeruleis* (*A. coerulea* *Ej.*)

72 CLASSIS V. PENTANDRIA.

76. LYSIMACHIA.

221. L. VULGARIS, paniculata racemia terminalibus, foliis ovato-lanceolatis acutis. *Curt. n. 49. Fl. dan. 689.*

Ad ripas Salae, in pratis sylvaticis in der Lucke ad Beuchlitz, Wörmlitz frequens. Iul. Aug. 2.
Folia opposita, saepius ternā quaternā.

222. L. NEMORUM, pedunculis axillaribus solitariis folia superantibus, staminibus eglandulosis, caule procumbente, foliis ovatis acutis. *Curt. n. 56. Fl. dan. 174. Engl. bot. 527. Sturm I. 1.*

In nemoribus montosis ad Ziegelrode, Lodersleben, Branderode rarius. Iul. 2.

223. L. NUMMULARIA, pedunculis axillaribus solitariis folio brevioribus, staminibus glandulosis, caule repente, foliis subcordatis. *Curt. n. 25. Fl. dan. 493. Engl. bot. 528.*

Ad parietes fossarum ubertim, in nemorosis humidis auf der Peisnitz, in der Lucke. Iun. 2.

77. PRIMULA.

224. PR. VULGARIS, foliis dentatis rugosis, scapulis unifloris, corollae limbo plano. *Smith fl. brit. I. 222. Engl. bot. 4. Curt. n. 65. Fl. dan. 194. Sturm I. 14. Pr. veris γ. L. Pr. veris δ. Leyss. Pr. elatior β. Willd. Pr. sylvestris Scop.*

In nemoribus humidiusculis ad Liebenau, Döllnitz, Gutenberg rarius. Apr. 2. Flores suaveolentes.

225. PR. ELATION, foliis dentatis rugosis medio contractis, scapo multifloro, corollae limbo plano. *Smith Engl. bot. 513. Sturm I. 14. Pr. veris β. L. Pr. veris γ. Leyss. Pr. inodora Hofm.*

In paludibus, dumetis et nemorosis ad Kollenbey.

Radewell, Döllnitz. Apr. Maio, 2 Flores in-
odori,

326. *P. VERIS*, foliis dentatis rugosis medio con-
tractis, scapo multifloro, corollae limbo con-
cavo. *Smith Engl. bot. 5. Curt. n. 67.*
Fl. dan. 433. Sturm I. 14. Pr. officinalis
Jacqu., Roth., Hafn.

In pratis, pascuis, campis herbidis copiosissime.
Eodem tempore. 2

78. ANDROSACE.

327. *A. ELONGATA*, foliis lanceolatis dentatis, um-
bella fructifera elongata, corollae calyce angu-
lato brevioribus. *Jacqu. austr. t. 330.*

In rupibus ad Kröllwitz rarissime. Maio, ☉

79. HOTTONIA.

328. *H. PALUSTRIS*, racemis verticillato-multifloris,
foliis pectinato-multifloris immersis. *Curt.*
n. 4. Fl. dan. 487. Engl. bot. 364.

In agris stagnantibus, lente fluentibus, auf dem
Badeplatz, bei Radewell, Liebenau etc. Maio
Iun. 2

80. MENYANTHES.

329. *M. TRIFOLIATA*, foliis ternatis. *Curt. n. 40.*
Fl. dan. 541. Engl. bot. 495. Sturm I. 8.

In pratis paludosis ad Gutenberg unter dem Tan-
nenberge copiosissime, ad Canena, Holzweißig,
Behndorf, bei Delitzsch. Maio, Iun. 2

81. VERBASCUM.

330. *V. THAPSUS*, foliis decurrentibus utrinque to-
mentosis, caule simplici, *Fl. dan. 631. Engl.*
bot. 549.

In ruderalis sterilibus passim. Iul. Aug. ♂

331. *V. PHLOMOIDES*, foliis ovalis utrinque tomen-
tosis, inferioribus petiolatis, superioribus ses-
silibus.

74 CLASSIS V. PENTANDRIA.

In saxosis asperis ad Giebichenstein, Kröllwitz,
auf der Peisanitz, ad Freyburg. Iun, Iul, ♂

232. *V. LYCENITIS*, foliis cuneiformi-oblongis supra
denudatis sessilibus, caule angulato paniculato,
Fl. dan. 586. *Engl. bot.* 58.

In rupestribus ad Kröllwitz, Freyburg, im Mittel-
holz frequens, Iun, Iul, ♂

- * 233. *V. PULVERULENTUM*, foliis ovato-oblongis sub-
ferratis utrinque pulverulentis sessilibus, cauli-
nis subamplexicaulibus, caule tereti paniculato,
Engl. bot. 487.

In ruderatis ad Zscherben rarius, Iul, ♂

234. *V. NIGRUM*, foliis oblongo-cordatis petiolatis
undulato-crenatis subpubescentibus, *Fl. dan.*
1088. *Engl. bot.* 59.

In nemorosis montosis, der Heide, Mittelholz,
Iul. Aug, ♀

235. *V. BLATTARIA*, foliis ovato-oblongis glabris du-
plicato-ferratis amplexicaulibus, radicalibus sub-
lyratis, pedunculis solitariis. *Engl. bot.* 393.

In arenosis ruderatis ad Trotha, auf dem Wer-
der. Iul, ♀

82, CHIRONIA.

236. *CH. CENTAURIUM*, caule herbaceo dichotomo
paniculato, foliis ovato-lanceolatis, calycis tu-
bo brevioris laciniis subulatis patentibus. *Curt.*
n. 42. *Engl. bot.* 417. *Sturm I.* 12. *Gentiana Centaurium L.*

In pascuis, pratis abunde, Iul, ♀

237. *CH. PULCHELLA*, caule herbaceo ramossissimo,
foliis ovatis, calycis tubum aequantis laciniis
subulatis. *Smith Engl. bot.* 458. *Gentiana Centaurium B. Leyss.* *Chironia rama*

*affima Ehrh. Ch. Gerard? Schmidt bot.
hem. I. n. 131. Ch. Centaurium β. Willd.*

In der Heide, ad Nietleben, paullo rarius. Iul. ☉

238. CH. INAPERTA, caule herbaceo ramosissimo,
foliis oblongis, calycis laciniis subpatulis, co-
rollae laciniis conniventibus. *Willd. Ch.
Vaillantii Schmidt l. c. n. 132.*

Ad ripas lacus salis et ad stagnum Kölmense,
Iul. Aug. ☉

83. DATURA.

239. D. STRAMONIUM, pericarpis spinosis erectis ova-
tis, foliis ovatis glabris. *Curt. n. 61. Engl.
bot. 1288. Fl. dan. 436.*

In ruderalis, hortorum relectamentis, auf der
Teufelsbrücke ad lacum salum copiose. Iul. ☉

84. HYOSCYAMUS.

240. H. NIGRA, foliis amplexicaulibus sinuatis, flo-
ribus sessilibus. *Engl. bot. 591. Hayne und
Dreves t. 47. Sturm I. 3.*

In pagis, ruderalis, ad vias solo pinguiori vulga-
ris. Maio, Iul. ☉

85. CONVULVULUS.

241. C. ARVENsis, foliis sagittatis utrinque acutis,
pedunculis subunisloris, bracteis minutis a flo-
re remotis. *Curt. n. 20. Fl. dan. 1459.
Engl. bot. 312.*

In arvis, agris, hortis ubique. Per totam aesta-
tem. ☉

242. C. SEPRIUM, foliis sagittatis postice truncatis, pe-
dunculis tetraquetris unisloris, bracteis corda-
tis calycem fulcipientibus. *Curt. n. 6. Fl. dan.
459. Engl. bot. 313. Sturm I. 1.*

In sepibus, dumetis, ad fossas, nemusculis hu-
midis vulgaris. Aestate. 2.

76 CLASSIS V. PENTANDRIA.

86. SOLĀNUM.

243. *S. NUCAMARA*, caule inermi frutescente flexuoso, foliis superioribus hastatis, racemo cymoso, *Curt. n. 1. Fl. dan. 607. Engl. bot. 565. Sturm I. 18.*

In sepibus humidis et umbrosis vulgaris. Iul. 7

244. *S. NIGRUM*, caule inermi herbaceo, foliis ovatis dentato-angulatis, umbellis lateralibus mutuantibus. *Curt. n. 16. Fl. dan. 460. Engl. bot. 566. Sturm I. 1. γ. S. villosum Willd. s. S. virginicum Ej.*

In rudertis, cultis fere ubique. γ. rarius. s. in montosis apricis ad Giebichenstein, Leimbach, Hettstädt, Aestate. ☉

87. PHYSALIS.

245. *PH. ALKEREKENG*, foliis geminis integris acutis, caule herbaceo inferne subramoso. *Schk. t. 45.*

In vineis ad Bennstädt, Köhne, Höhnstädt copiose. Iul. 24

88. VINCA.

246. *V. MINOR*, caulibus procumbentibus, foliis elliptico-lanceolatis margine glabris, floribus pedunculatis, dentibus calycinis lanceolatis. *Curt. n. 29. Engl. bot. 917.*

In dumetia umbrosis, ad Giebichenstein, lipka vom Dorfe, ad Liebenau, Zöberitz. Maio. 24

89. CAMPANULA.

* *Foliis laevioribus angustioribus.*

247. *C. ROTUNDIFOLIA*, foliis radicalibus reniformibus, caulinis linearibus. *Curt. n. 38. Fl. dan. 1086. Engl. bot. 866.*

In pascuis, nemoribus vulgaris. Aestate. 24 *Folia radicalia saepe emortua desunt. Variat flore coeruleo et albo. Varietas caule uniflora (Fl.*

dan. 189.) in alpestribus et rupibus non raro
provenit. Nec est tamen *C. uniflora* L. (Rafn
dan. 2. 83.)

248. *C. PATULA*, foliis strictis, radicalibus lanceola-
to-ovalibus, panicula patula, calyce denticu-
lato. *Fl. dan.* 373. *Engl. bot.* 42. Cf. *Ca-*
pan. ann. 7. p. 20. 21.

In nemoribus, der Heide, dem Mittelholze, dem
Lindberge etc. passim. Iul. 24

249. *C. RAPUNCULUS*, foliis undulatis, radicalibus
lanceolato-ovalibus, panicula coarctata. *Engl.*
bot. 283. *Schk.* t. 39.

Ad sepes, versuras agrorum, in campis herbidis,
Iun. Iul. 24

250. *C. PENSICIFOLIA*, foliis radicalibus obovatis,
cauliculis lanceolato-linearibus subserratis sessili-
bus remotis. *Fl. dan.* 1087.

In nemoribus montosis et dumetis frequens. Iul. 24

** *Foliis scabris latioribus.*

251. *C. BARBATA*, caule simplici subuni folio, foliis
lanceolatis obtusiusculis integerrimis, corolla
barbata, capsula 6-loculari sinubus reflexis ob-
tectis. *Jacqu. obs.* 2. t. 37.

In monte Galgenberg rarissime. Aug. 24 Cf.
Schrank salisb. p. 71.

252. *C. GLOMERATA*, caule simplici angulato, capi-
tulo terminali, foliis ovatis crenatis scabris.
Engl. bot. 90.

In montibus calcareis ad Bennstädt, am Füßen
See, bei Karsdorf. Iul. 24

253. *C. CERVICARIA*, foliis lanceolato-linearibus un-
dulatis hispidis, floribus axillaribus terminali-
busque aggregatis. *Fl. dan.* 787.

In nemoribus montosis ad Seebad, Rothen- und
Mittelholz, bei Branderode etc. Iun. Iul. 24

78 CLASSIS V. PENTANDRIA.

254. *GERANIUM VULGARIS*, caule ramoso, foliis cordato-lanceolatis, floribus secundis sparsis, calycibus reflexis. *Engl. bot.* 1369.

In hortis, cultis, in nemoribus vulgaris. Iul. Aug. 2.

255. *G. MONOWIENSIS*, caule paniculato, foliis ovato-lanceolatis leviter serratis subamplexicaulibus. (*Morif. vol. 2. sect. 5. tab. 4. f. 38. non exacte quadrat.*)

In dumetis et nemoribus hinter Kröllwitz, in der Gersdorfer nützen Feldmark. 2.

256. *C. TRACHELIUM*, caule angulato, foliis cordato-lanceolatis acute serratis, calycibusque hispidis, pedunculis axillaribus paucifloris. *Fl. dan.* 1928. *Engl. bot.* 12.

In nemoribus et dumetis der Heide, bei Liebnau, Döllnitz etc. Iul. Aug. 2.

90. SAMOLUS.

257. *S. VALERANDI*, foliis obtusis, racemo multifloro, pedicellis bracteolatis. *Curt. n.* 45. *Fl. dan.* 198. *Schk. t.* 40.

Ad stagnum Kölmense frequens, an der Salske bei Benckendorf und Salzmünde. Iul. Aug. 2.

91. LONICERA.

258. *L. XYLOSTEUM*, pedunculis bifloris, baccis distinctis, foliis ovatis integerrimis pubescentibus. *Fl. dan.* 808.

In fylvis ad Lodersleben, Schmon passim. Iun. 3.

92. JASIONE.

259. *J. MONTANA*. *Curt. n.* 41. *Fl. dan.* 319. *Schk. t.* 266. *Engl. bot.* 882. *Sturm l.* 9.

In pascuis siccioribus et ericatis frequens. Iul. Iul. Q.

93. PHYTEUMA.

360. PH. ORBICULARE, capitulo subrotundo, foliis crenatis ciliatis, radicalibus cordato-ovatis. *Engl. bot.* 146.

In montosis calcareis, auf dem Vogelsberge bei Bannstädt. Maio. Iun. 24.

361. PH. STRICTUM, spica oblonga elongata, foliis radicalibus cordatis duplicato-ferratis petiolatis; superioribus lineari-lanceolatis ferratis sessilibus. *Fl. dan.* 362. *Schk.* 1. 39.

In nemoribus montosis ad Lodersleben, Schmöm, Ziegelrode, Mückeln, Brehna etc. Iun. 24.

94. RHAMNUS.

362. RH. FRANGULA, inermis, foliis integerrimis glabris venosis, bacca 2—3-sperma. *Fl. dan.* 278. *Engl. bot.* 250. *Schk.* 1. 46.

In nemoribus et dumosis frequens, Maio, Iun. 5.

363. RH. CATHARTICUS, spinis terminalibus, floribus quadrifidis diöicis; foliis ovatis serratis nervosis, bacca 4-sperma. *Fl. dan.* 350.

Ibidem cum priori. 5. *Tironi ignoscendum; si, dum naturalem generis indolem ignorat, ulio loco, vel Cl. XIX. vel Cl. IV. quaerit.*

95. EVONYMUS.

364. E. EUROPAEUS, floribus plerisque 4-fidis, petalis acutis, ramis laevibus. *Engl. bot.* 362. *Fl. dan.* 1087.

In sylvis, nemoribus, dumetis vulgaris. Maio. 5.

96. IMPATIENS.

365. L. NOXI TANGERE, pedunculis multifloris solitariis, foliis ovatis, geniculis caulinis tumentibus. *Fl. dan.* 582. *Engl. bot.* 937. *Schk.* 1. 270. *Sturm* I. 5.

In nemoribus umbrosis humidis, auf der Rabed.

80 CLASSIS V. PENTANDRIA.

infel bei Bölsberg copiose, bei Dieskau, Hohl-
weilig. Im. Aug. 2

9^a. VIOLA.

266. V. *HERTA*: acaulis, foliis cordatis ferratis pe-
tiolisque hispidis, calycibus obtusis. Curt.
n. 10. Fl. dan. 618. Engl. bot. 394. Sturm
I. II.

In nemoribus et dumetis, der Heide, bei See-
ben, Gutenberg. Maio. 2

267. V. *ODORATA*, acaulis, stolonibus repantibus,
foliis cordatis petiolisque glabriusculis, caly-
cibus obtusis. C. & C. n. 9. Fl. dan. 599. Engl.
bot. 619. Sturm I. II.

In pomariis, ad fepes, fossarum aggeres vulgaris.
Mart. Apr. 2. *Seriore flores asexualis fructi-
feros observant iam Curtissius, Stemm-
l. c. et Schkukrius (Händl. 3 p. 180.)*

268. V. *PALUSTRIS*, acaulis, foliis reniformi-corda-
tis crenatis glabris, radice repente. Curt.
n. 50. Engl. bot. 444. Sturm I. II.

In paludibus ad Dölau, Lieskau, Seeben, Gu-
tenberg. Apr. Maio. 2

269. V. *CAVATA*, caule adultiori adscendente caudili-
culato, foliis oblongo-cordatis, calycibus acu-
tis. Curt. n. 18. Engl. bot. 620. Sturm
I. II.

In pascuis apricis, nemoribus salvarumque mar-
ginibus. Apr. 2. *Variet. flore albo.*

270. V. *MONTANA*, caule erecto, foliis cordatis ob-
longis ferratis, stipulis dentatis.

In pascuis, nemoreis in der Lucke, ad Lieskau
etc. Maio. 2. *Hae versine: V. verticillata, fo-
liis ovato-lanceolatis. Schk. t. 269.*

271. V. *MIRABILIS*, caule triquetro, foliis reniformi-
cordatis, floribus caulinis apetalis fructiferis,

MONOGYNIA.

81

radicalibus corollatis abortientibus. *Dill.*
alth. t. 303.

In nemoribus umbrosis Zorgs, Lindberg. Jun. 24

272. *V. tricolor*, caule angulato diffuso, foliis oblongis dentato-crenatis, stipulis lyrato-pinnatifidis.

a. *corollis calyce glabro maioribus.* *Curt.*
n. 24. Engl. bot. 1287. Fl. dan. 623. Sturm
I. 11.

β. *corollis calycem hirsutum aequantibus. V. arvensis* *Roth., Hofm.*

In cultis, hortis et agris frequens. Apr. etc. ☉

98. RIBES.

• *Inermia.*

273. *R. rubrum*, racemis glabris pendulis, bracteis exiguis, floribus planiusculis, petalis obcordatis, foliis quinquelobis duplicato-ferratis. *Fl. dan.*
967. Engl. bot. 1289. Sturm I. 4.

Ad sepes et in sylvis rarius. Apr. Maio. ☿

274. *R. alpinum*, racemis erectis, bracteis flore longioribus, foliis trilobis subtus lucidis. *Fl. dan.*
967. Sueusk bot. 223.

In nemoribus montosis, Zorgs; Lindberg, Mittelholz, Brennau, Badendorfer Holz bei Neeshausen, ad Lodersleben, Schmon, Hackenholz bei Mueheln. Apr. Maio. ☿ *Baccae rubrae insipidae.*

275. *R. nigrum*, racemis pilosis pendulis, pedunculo simplici ad basin, floribus oblongis, foliis subtus glandulosis. *Fl. dan. 556. Engl. bot.*
1291.

Ad sepes et in dumetis am Löberbach bei Bendorf, Zöckeritz. Apr. Maio. ☿ *Folia olentia; baccae nigrae.*

82 CLASSIS V. PENTANDRIA.

** *Aculenta.*

275. *R. GROSSULARIA*, petiolis pilosis, pedunculis unifloris, bracteis binis, baccis hirsutis. *Fl. dan.* 545. *Engl. bot.* 1252. *Sturm I.* 4.

In lapidicina ad Lieskau. Apr. 5

277. *R. UVA CRISPA*, pedunculis unifloris, bracteis connato-tubulosis, baccis glabris. *Schmiedel ic. t. 1.*

In nemoribus, Mittelholz, am Petersberge. Apr. 5

99. HEDERA.

278. *H. HELIX*, foliis ovatis lobatisque. *Fl. dan.* 1027. *Curt. n. 8.* *Engl. bot.* 1267. *Schk. t. 49.*

In nemoribus montosis umbrosis, ad arbores vetustas am Petersberge, bei Schmon. Sept. 7

100. GLAUX.

279. *G. MARITIMA*. *Fl. dan.* 548. *Gärtn. carpel.* p. 37. t. 184. *Engl. bot.* 13.

In pratis humidiusculis, der kleinen Wiese, bei Dieskau, Bruckdorf, bei Kölme, Langenbogen, am salzigen See copiosissimè Jun. 2

101. THESIUUM.

280. *Th. LIXOPHYLLUM*, panicula foliacea, foliis linearibus nervosis. *Engl. bot.* 247. *Schk. t. 51.* *Fl. dan.* 1205. *Th. pratense, intermedium et montanum* Schrad. *Spicil. p. 26. 27. leves varietates sunt. Nec aliter de Th. ebracteato Haynii* (Schrad. *Journ.* 1800: I. p. 30.) indicare possim. *Cf. Rudolphi ib.* 1800. II. 216, 217.

In pratis sylvaticis et nemoribus montosis, am Donnerberge hinter Kröllwitz, in der Heide, dem Rockenholze etc. Maio, Jun. 2

DIGYNIA.

102. CUSCUTA.

281. *C. EUROPAEA*, floribus subsessilibus; corollae fauce nuda. *Fl. dan.* 199. *Engl. bot.* 378. *Sturm* I. 10.

Parasitica in *Polygono Persicaria*, *Euphorbia palustri* im Görs bei Wörmits, in *Genista tinctoria* auf der Benndorfer Wiese am Löberbach, in Solano Dulcamara ad Nietleben. Jul. ☉

282. *C. EPITHYMUM*, floribus sessilibus; staminibus basi squama crenata munitis. *Fl. dan.* 427. *Engl. bot.* 55.

Parasitica in *Thymo Serpyllo* in der Heide, in ipso *Dicrano scopario* semel inveni. Aug. ☉

103. ASCLEPIAS.

283. *A. VINETOXICUM*, foliis cordato-ovatis tenuissimis ciliatis. *Sturm* I. 9. *Schk.* 2. 65.

In montosis apricis, rupibus ad Kröllwitz, Seeben, Gutenberg, der Heide etc. frequens. 24

104. GENTIANA.

284. *G. PNEUMONANTHE*, corolla campanulata 5-fida, floribus pedunculatis, foliis linearibus. *Fl. dan.* 269.

In pratis paludosis turfosis, ad Benndorf copiosissime cum *Tofieldia palustri* et *Schoeno albo*, zwischen Radegast und Zörbig. Aug. 24

285. *G. ACUTIS*, corolla infundibuliformi 5-fida, caulem quadrangulum subaequantē, foliis ovato-oblongis. *Sturm* I. 4.

In montosis ad Leimbach et Ziegelrode rarissime. Apr. 24

286. *G. GERMANICA*, corolla hypocrateriformi 5-fida barbata, laciniis limbi ovatis acutis, calycinis aequalibus, foliis ovato-lanceolatis, intermediis

84 CLASSIS V: PENTANDRIA.

ramorum longioribus. *Willd. Fl. dan.* 328.
G. Amarella Leyss. G. pratensis Frölich.
(Rafn dan. I. 219.)

In montosis siccis zwischen Rocken- und Mittelholz, bei Behnstädt auf dem Vogelsberge; auf den Schmonschen Bergen copiose. Sept. ☉

287. *G. AMARELLA*, corolla hypocrateriformi 5-fida barbata, laciniis limbi lanceolatis acutis, calycinis subaequalibus, foliis lanceolatis, internodiis ramorum brevioribus. *Willd. Schmidt in Röm. Arch. I. t. 5. f. 13. G. campestris Leyss. G. lancifolia Rafn.*

In pratis siccioribus ad Gerbstädt, auf dem Orlasberge hinter Memleben. Sept. ☉ Corollae angustiores, folia angusta lanceolata, rami breviores hanc speciem a priore satis discriminant. Radix utrinque flava.

288. *G. uliginosa* ⁽¹⁾ corolla hypocrateriformi subquadrisida acuta fauce barbata, calycibus subaequalibus, caule ramoso tetragono basi subalato. *Willd.*

In pratis montosis rarius ad Burgscheidungen et Karsdorf. Aug. ☉

Planta biuncialis, corolla coerulescens, caulis basi subalatus. (*Gentianella brevi folio Knauth p. 8., quam Rothius credit esse G. nivalem, ad radices montis sereni inventa, forte huc pertinet. Namque synonymon I. Bauhini hist. III. 326. Gentiana quarta Clusii cum icona sine dubio huc refertur, cum et in pratis prope Basileam semet invenisse Bauhinus testetur*).

289. *G. CAMPESTRIS*, corolla hypocrateriformi quadrisida obtusa fauce barbata, calycinis laciniis duabus maximis. *Fl. dan.* 367. *Engl. bot.* 237.

In pratis ad Lodersleben abundanter. Sept. ☉

290. *G. CAUCIATA*, corollis hypocrateriformibus quadrisidis nudis verticillatis sessilibus, caule com-

presso, foliis ovato-lanceolatis nervosis vaginantibus. *Jacqu. austr. t. 372.*

In montosis apricis ad Schraplau. *Köhl. Jul. 24*

105. ATRIPLEX.

291. *A. ROSA*, caule diffuso, foliis ovatis basi cuneato-truncatis intans dentatis, valvulis seminiferis quadrangulis dentatis. *Schk. t. 350.*

In ruderatis, pagis copiose. Aug. ☉

292. *A. HORTENSIS*, caule erecto, foliis triangularibus, valvulis seminiferis subrotundis integerrimis.

In ruderatis, reiectamentis hortorum. Aug. ☉

293. *A. PATULA*, caule ramosissimo, foliis lanceolatis subhastatis, valvulis seminiferis dorso muricatis. *Schk. t. 347. Engl. bot. 936. A. marinae species Valerando. I. Bauh. II. 974.*

In ruderatis, ad vias frequens. Aug. Sept. ☉

Huc *A. hastata*, *Leyss. et Curt. n. no. quae solummodo differt foliis magis hastatis. Vera enim differt valvulis reticulato-membraceis densibus longe setaceis Smith.*

294. *A. ANGUSTIFOLIA*, caule herbaceo divaricato, foliis lanceolatis integerrimis, infimis subhastatis, valvulis seminiferis hastatis integerrimis laeviusculis. *Smith. Petiv. h. brit. t. 7. f. 5. A. vulgaris angustifolia cum folliculis I. Bauh. hist. II. 973.*

In cultis, ruderatis ad Trebnitz. *Kruse. Aug. Sept. ☉*

295. *A. NITENS*, caule herbaceo, foliis triangularibus sinuato-dentatis, supra nitidis, infra chae-reis, valvulis seminiferis triquetris integerrimis. *Schk. t. 348. Rehbent. neom. 126.*

In hortis, cultis vulgaris. Sept. ☉

286 CLASSIS V. PENTANDRIA.

296. *A. LACINIATA*, caule subdecumbente, foliis deltoidibus dentatis incanis, valvulis seminiferis utrinque et dorso dentatis. *Engl. bot.* 165.

Ad lacum salsum, an der Salzke. Aug. ☉.

* 297. *A. TATARICA*, caule ramoso patulo, foliis triangularibus basi cuneatis dentatis, valvulis seminiferis subdeltoidibus integris. *Schk. t.* 349.

In umbrosis ad Nietleben. ☉

286. CHENOPODIUM.

* *Foliis angulosis.*

* 298. *CH. BONUS HENRICUS*, foliis triangulari-fagittatis integerrimis, spicis compositis aphyllis. *Curt. n.* 51. *Fl. dan.* 579.

In ruderatis, pagis, ad vias, in simetia, e. g. in Nietleben, Giebichenstein. Maio — Iulio. ☉

299. *CH. URSECUM*, foliis triangularibus subhastatis denticularis, racemis confertis strictissimis caulibus approximatis longissimis subaphyllis. *Fl. dan.* 1148. *Ch. latifolium minus ramosum* *Buxb.* p. 69. *sc. bona.*

In ruderatis pinguihus, ad aggeres fossarum, in pagis. Aug. ☉

300. *CH. RUBRUM*, foliis rhomboideo-triangularibus sinuato-dentatis basi productis, racemis erectis compositis foliolosis. *Fl. dan.* 1149. *Curt. n.* 71.

In ruderatis et simetis. Aug. ☉

301. *CH. MURALEO*, foliis ovatis basi productis nitidis acutis dentatis, paniculis ramosis aphyllis. *Curt. n.* 61.

In eisdem locis eodemque tempore cum prioribus. ☉

302. *CH. HYBRIDUM*, foliis cordatis acuminatis angulato-dentatis, paniculis ramosis divaricatis aphyllis. *Curt. n.* 42.

Isdem locis, sed minus frequens. ☉ *Odore foetido Stramonii et foliis cordatis basi non productis a priori differt.*

303. CH. ALBUM, foliis rhomboideo-ovatis erosissimis, postice integris, superioribus oblongis integerrimis, racemis ramosis erectis subaphyllis, seminibus laevibus. *Curt. n. 16. Huc Ch. viride Leyss. et fl. dan. 1150. quod, monente Smithio, differt solummodo colore magis viridi, foliis angustioribus et ramis laxioribus.*

In hortis; fimetis, aggeribus fossarum vulgare. Aug. ☉

304. CH. FICIFOLIUM, foliis hastato-sinuatis erosissimis, postice integris, superioribus oblongis integerrimis, racemis ramosis erectis subaphyllis, seminibus excavato-punctatis. *Smith. Ch. viride Curt. n. 18.*

In hortis et eorum reiectamentis nonnunquam, sed rarius observatur. Aug. ☉

305. CH. GLAUCUM, foliis omnibus oblongis sinuato-repandis subtus glaucis, racemis glomeratis aphyllis, caule diffuso. *Fl. dan. 1151.*

Ad ripas Salae hinter den kön. Salinen, in aggeribus fossarum, bei Kölme, minus frequens. Aug. ☉

*** Foliis integris.*

306. CH. OLIDUM, foliis rhomboideo-ovatis integerrimis, racemis conglomeratis. *Curt. n. 160. Fl. dan. 1152. Ch. Vulvaria L.*

In pagis rarius. Aug. ☉ *Planta pulverulento-canescens, piscium salisdrum semi-putridorum more foetet.*

307. CH. POLYSPERMUM, foliis ovatis integerrimis, paniculis laxis divaricatis aphyllis. *Curt. n. 20. Fl. dan. 1153.*

88 CLASSIS V. PENTANDRIA.

In hortis et agris olerum passim, im Görs bei Wörmnitz. Aug. ☉

308. *CH. MARITIMUM*, foliis subulatis semicylindricis, floribus axillaribus sessilibus glomeratis. *Fl. dan.* 489. *Engl. bot.* 633.

Ad lacum salsum, ad stagnum Kölmense copiose. Aug. ☉

107. HERNIARIA.

309. *H. GLABRA*, glabra herbacea. *Fl. dan.* 529. *Engl. bot.* 206. *Schk.* t. 56.

In apricis glareosis arenosis, auf dem Pfännerholzplatz, hinter Kröllwitz, vor der Heide frequens. Iul. Aug. ☉

108. ULMUS.

310. *U. CAMPESTRIS*, foliis duplicato-serratis basi inaequalibus, floribus subsessilibus conglomeratis pentandris tetrandrisque, samaris glabris. *Fl. dan.* 632. *Schk.* t. 57. a.

Ad pagos vulgaris. Apr. ☿ *Huc et U. suberosa Ehrh. specie certe non distincta.*

311. *U. EFFUSA*, foliis duplicato-serratis basi inaequalibus, floribus effusis pedunculatis octandris, samaris ciliatis. *U. octandra Schk. l.c. U. ciliata Ehrh. U. montana Smith. U. folio latissimo Buxb. p. 340.*

Ad pagos, in Pulverweiden frequens. Apr. ☿

UMBELLATAE.

109. ERYNGIUM.

312. *E. CAMPESTRE*, foliis amplexicaulibus pinnato-laciniatis. *Fl. dan.* 554. *Engl. bot.* 57.

In campis aridis, versuris, ad vias ubique. Iul. ☿

110. HYDROCOTYLE.

313. *H. VULGARIS*, foliis peltatis subrotundis lucidis, umbellis 5-floris. *Curt. n. 63. Fl. dan.* 90.

In paludibus ad Lieskau, Dölau copiose, sed raro floret. Iun. Iul. 24

III. SANICULA.

314. *S. EUROPAEA*, foliis septemfidis, lacinjiis incisoferratis, involucris pinnatifidis, floribus sessilibus. *Fl. dan.* 283. *Engl. bot.* 98.

In nemoribus et sylvis, der Heide, der Brennuau bei Fienstädt, am Petersberge, bei Lodersleben frequens. Maio, Iun. 24

III. BUPLEURUM.

315. *B. ROTUNDIFOLIUM*, involucro universali nullo, foliis perfoliatis ovatis acutis. *Engl. bot.* 99. *Sturm I.* 5.

Inter segetes ad Bennstädt, Kölme, Langenbogen frequens. Iul. ☉

316. *B. LONGIFOLIUM*, involucro universali 3- aut 5-phyllo, partialibus pentaphyllis ovatis, foliis radicalibus petiolatis, caulinis amplexicaulibus ovatis.

In montibus an der Unstrut, besonders auf dem Orlasberge hinter Memleben und Langenberge bei Möncherode. Iun. 24

317. *B. FALCATUM*, involucro universali sub 5-phyllo, partialibus pentaphyllis acutis, foliis radicalibus oblongo-petiolatis, caulinis lanceolato-linearibus, caule flexuoso.

In nemoribus montosis vulgare. Iun. Iul. 24

Folia radicalia ovato-oblonga a *Dodonaeo* (*pempt. V. lib. I. c. 14. p. 633.*) inde temporibus impressuerunt plerisque botanicis, ut *B. rigidum* nostro commutarent. Quamvis *Dodonaeus* bene iconem veri *B. rigidi*, plantae monspeliensis, expresserit. quamvis probe *Bauhinus* (*pin.* 278.) hoc *B.* folio rigido, illud *B.* folia subrotundo s. vulgatissimum nominaverit. *Ruppia* tamen (*jen.* 280, 281.) utrumque

commutavit, recte dubitante *Hallero*, verum differat utraque species. Confudit egregius *Knauthius* (88.) qui *B. folio rigido* in sylvis montis sereni invenisse testatur; commutavit *Buxbaumius* (47.) et ipse *Leyserus*, qui *Knauthii* verba solummodo transcripisse videntur. Quicumque iconem *Dodonaei* adspexerit, apud nos inventum iri eam plantam manspaliensem desperabit. Sic etiam verum esse *B. ranunculoides*, quod nonnulli in vineis nostris *Mansfeldensibus* semet invenisse adseverant, nego.

318. *B. TENUISSIMUM*, umbellis simplicibus, alternis sub 3-floris, involucris 5-phyllis subulatis. *Fl. dan.* 1090. *Engl. bot.* 478.

In pascuis editioribus ad lacum falsum bei Rößlingen, ad ripas der Unstrut, bei Nebra und Freyburg, bei Rosabach und Mark-Rölitz. *Aest.* 64

113. ASTRANTIA.

- *319. *A. MAIOR*, foliis radicalibus 5-lobis, lobis 3-fidis acutis dentatis, involucellis lineari-lanceolatis integerrimis. *Schk.* t. 60.

In montibus an der Unstrut, auf dem Orlasberge hinter Memleben. 24

114. DAUCUS.

320. *D. CAROTA*, fructibus hispidis, petiolis subtus nervosis. *Fl. dan.* 723. *Engl. bot.* 1174.

In pratis et pascuis fere ubique. Jun. Iul. ♂

Rudimentum umbellae centralis carnosum rubrum imposuit Leyfs., ut *D. mauritanicum* hinc quaereret, quem verum iconem expressit *Allioni* ped. t. 6. f. 1.

115. CAUCALIS.

321. *C. DAUCOIDES*, umbellis trifidis nudis, umbellulis tricarpis, involucellis triphyllis, foliis su-

pradecompositis. *Engl. bot.* 197. *C. leptophylla Schk. t. 61. nec Linn.*

In vineis nostris, ipsis agris adiacentibus, solo calcareo satis vulgaris. Aestate. ☉

322. *C. LATIFOLIA*, umbellis trifidis involucretis, umbellulis pentacarpis, foliis pinnatis serratis. *Engl. bot.* 198.

In agris, solo calcareo rarius, inter Gleina et Ebersrode, diesseits Freyburg. Aug. ☉

Umbellulae plerumque rubrae; fructus setis purpureis muricatus.

323. *C. ANTHRISCUS*, umbellis multifidis confertis, involucre polyphylo, foliolis pinnatifidis scabris, lacinia terminali elongata. *Curt. n. 63. Fl. dan. 919. Engl. bot. 987. Tordylium Anthriscus. Leyss.*

In sepibus, dumetis. Iun. ☉

116. CONIUM.

324. *C. MACULATUM*, caule ramosissimo nitido maculato, foliis supradecompositis. *Curt. n. 7.*

In ruderatis, fimetis et hortis satis vulgaris. Aug. ☉

Herba differt ab *Apio Petroselino* foliis opacis, odore murino, foliolis paullo latioribus brevioribus, caule petiolisque rubro maculatis.

117. SELINUM.

325. *S. PALUSTRE*, lactescens, caule striato solitario, foliis subtripinnatis, pinnulis pinnatifidis, lacinulis lineari-lanceolatis cuspidatis, involucre universali polyphylo, foliolis margine membranaceis, petalis involutis, stylis post anthesin divaricatis. *Riv. t. 266. Engl. bot. 229. Fl. dan. 412. Schk. t. 63.*

In paludibus ad Dieskau. Iul. Aug. 24

326. *S. SYLVESTRIS*, lactescens, caulibus numerosis laevibus inferne ramosis, foliis subtripinnatis, pinnulis incisis, lacinulis ovatis obtusiusculis,

involucro universali polyphyllo, foliolis marginem membranaceis, petalis explicatis, stylis post anthesin rectis. *Dodon. penapt. VI. p. 699.*
Morif. sect. 9. t. 17. f. 2,

Im feuchten Busche bei Seeben *Knauth 91.*
 beim Fasanenhause *Rupp. 276., Leyfs. 69, 76.*
 Ipse nondum inveni.

De iconibus citatis certus sum. Minus exploratae sunt icones fl. dan. 257. et 412., quarum illa ad S. palustre, haec ad S. sylvestre vulgo traduntur; sed et in hac petala involuta et styli divaricati sunt, quae notae a Linnaeo et Smithio, herbarii Linn. possessore, adducuntur. Cf. de utraque specie saepius confusa Rafnium (dan. 2. p. 353—355.), Rothium (germ. 2. p. 352, 353.), Schumacherum (saelland. 94.)

327. *S. CARVIFOLIA*, caule sulcato acutangulo, foliis subtripinnatis, pinnulis ovato-lanceolatis pinnatifido-incisis, lacinulis lanceolato-linearibus apice calloso mucronulatis, involucris setaceis, universali deciduo 2—3-phylo, partialibus polyphyllis. *Fl. dan. 667.*

α. *S. sylvaticum*, caule altiori, angulis membranaceis, involucro universali minus deciduo.

In nemoribus montosis, dem Mittel- und Rokenholze. Aug. 24

β. *S. pratense*, caule humiliori, angulis acutis, involucro universali subnullo. *S. lineare Schum. saelland. 95.*

In pratis humidis vulgare. Iul. 24

* 328. *S. PRATENSE*, caule laevi vaginato stricto superne ramoso, vaginis foliorum laxis, infimis pendulis, foliis bipinnatis, foliolis linearibus 2—3-fidis acutiusculis, involucris setaceis, universali oligo-, partialibus polyphyllis. *Icon. nostr. 24.*
Seseli dubium Schk. l. t. 217. Wohlleb. 12.

In pratis paludosis hinter dem Donnerberge bei Kröllwitz, bei Lieskau. Aug. 24

19. *S. CERVARIA*, caule striato ramoso, foliis duplicato-pinnatis, pinnis ovatis trilobis duplicato-serratis, serraturis mucronulatis, imis decussatis. *Lam., Rch. Cervaria Riv. pentap. 258. Athamanta Cervaria L.*

In nemorosis sylvaticis, ad Gutsenberg, in der Heide, im Rocken- und Mittelholz frequens. Jul. 24

20. *S. ONOSMIS*, caule subsfriato dichotomo, foliis triplicato-pinnatis, pinnis remotis divaricatis oblongo-linearibus acutis incis. *Lam., Rch., Hall. Schk. t. 64. Oreoselinum Riv. pent. 254. Athamanta Oreoselinum L.*

In montosis nemorosis frequens, bei Kröllwitz, Letzin, in der Heide etc. Aug. 24

118. ATHAMANTA.

31. *A. LIBANOTIS*, foliis bipinnatis planis, foliolis ovatis incis, imis decussatis. *Engl. bot. 138.*

In montibus calcareis rarissime ad Nebrä et Laucha. Jul. 24 *Canitie caulis et radiorum umbellae ad Imperatoriam sylvestrem accedit.*

119. PEUCEDANUM.

32. *P. OFFICINALE*, foliis quinquies tripartitis, foliolis linearibus longissimis indivisis. *Schk. t. 63.*

In pratis nemorosis ad Wörmnitz, hinter Gutenburg, bei Könnern an der Saale, und bei Friedburg. Jul. 24

33. *P. SILAUS*, foliis decompositis, foliolis pinnatifidis, laciniis oppositis decurrentibus, involucro universali subdiphylo. *Seseli pratense Riv. pent. t. 304. Petiv. h. brit. t. 28. f. 5.*

In pratis fere omnibus vulgatissimum. Jul. 24

120. LASERPITIUM.

334. *L. LATIFOLIUM*, foliis oblique cordatis crenatis, crepis mucronatis, fructuum alis crispis. *Moench. Fl. sect. 9. t. 19. p. 1. Schk. t. 67.*

In nemoribus montosis bei Lieskau, im Rocken- und Mittelholze, in der Brennau, dem Baden- dörfer Holze bei Neehausen. Jul. 24

355. *L. PACHYSTICHUM*, hirtum, foliis bipinnatifidis, pinnis ovatis pinnatifidis, laciniis lanceolatis acutis. *Jacqu. austr. t. 153.*

In nemoribus ad Lieskau, dem Mittelholze, dem Abmiffinen-Busche bei Kitten, dem Hackenholze, Branderoder Holze, bei Brehna, frequens. Aug. 24

121. HERACLEUM.

336. *H. SCHNODZITUM*, foliis pinnatis, foliolis quibus oblongis pinnatifidis dentatis. *Engl. bot. 959. Schk. t. 67.*

In nemoribus et pratis nemorosis frequens. Jul. 24

- β. *H. angustifolium Jacqu. pl. vindob. 217. foliolis superioribus ternatis lanceolatis acutis, floribus albidis.*

In sylvis ad Leimbach et Lodersleben. Aug. 24

H. angustifolium Leyss. huc pertinet. Etenim vera Linnaei planta habet foliola lanceolato-lanceolata elongata grosse serrata.

122. SILIUM.

337. *S. LATIFOLIUM*, foliis pinnatis, foliolis oblongo-lanceolatis aequaliter serratis. *Fl. dan. 246. Engl. bot. 204.*

In fossis, fluviis, lacubus, stagnis vulgatissimum. Jul. 24

338. *S. ANGUSTIFOLIUM*, foliis pinnatis, foliolis inaequaliter lobatis serratis, umbellis pedunculatis.

UMBELLATAE.

93.

tis oppositifoliis, caule erecto. *Fl. dan.* 247.

Engl. bot. 139.

In paludibus et stagnis ad Dieskau, Nietleben.
Reideburg. Iul. 24

339. *S. MODIFLORUM*, foliis pinnatis, foliolis ovatis aequaliter serratis, umbellis sessilibus oppositifoliis, caule procumbente. *Engl. bot.* 639.
Morif. sect. 9. t. 5. f. 3.

In fossis ad Seeben invenit *Kohlus* amicus;
equidem nondum. Iul. 24

340. *S. FALCARIA*, foliis pinnatis rigidis, foliolis linearibus decurrentibus connatis argute serratis, caule ramosissimo. *Morif. sect. 9. t. 8. f. 1.*

In campis, agris, arvis, pratis siccioribus vulgatissimum. Iul. 24

123. OENANTHE.

341. *OE. FISTULOSA*, stolonifera, foliis radicalibus bipinnatis, foliolis planis cuneatis lobatis, caulibus pinnatis filiformibus fistulosis, involucrio universalis subnullo. *Fl. dan.* 846. *Engl. bot.* 363. *Schk. t. 70.*

In fossis et stagnis, auf dem Badeplatz, bei Palsendorf et alibi copiose. Iun. 24

342. *OE. PEUCKERANIFOLIA*, radice tuberosa, foliolis omnibus linearibus, involucrio universalis nullo. *Pollich. I. t. 3.* *Engl. bot.* 348.

In pratis paludosis circa Trebnitz. Kruse. Iul. 24

124. PHELLANDRIUM.

343. *PH. AQUATICUM*, foliorum ramificationibus divaricatis. *Fl. dan.* 1154. *Riv. pent. t. 31.*
Schk. t. 71.

In fossis, fluviis, lacubus et stagnis vulgare.
Iul. 24

96 CLASSIS V. PENTANDRIA.

125. CICUTA.

344. *C. virosa*, umbellis oppositifoliis, stipulis petiolo adnatis obtusis. *Fl. dan.* 208. *Engl. bot.* 479. *Schk.* t. 71.

In der alten Saale bei Trebnitz. Iul. 4

126. AETHUSA.

345. *Az. cynapium*, foliis bipinnatis, foliolis pinnatifidis decurrentibus. *Curt. n.* 6. *Engl. bot.* 1192. *Schk.* t. 72.

In hortia et ruderalis ubique. Aug. ☉

127. IMPERATORIA.

346. *I. sylvestris*, foliis bipinnatis, foliolis ovatis subincis ferratis. *Lam., Desfont., Schk.* t. 68. *Angelica sylvestris* L.

In pratis humidis vulgaris. Iul. Aug. 4

Caulis et umbellae radii rore cano caesio tecti.

347. *I. ostruthium*, foliis ternatis, foliolis ovatis lobatis ferratis, infimis basi inaequaliter cordatis. *Schk.* t. 74.

In nemoribus montosis ad Löbejün, Hornburg, Ebersrode rarius. Iul. 4

128. SCANDIX.

348. *Sc. pecten*, fructibus longissime rostratis scabriusculis, foliis tripinnatis, foliolis multipartitis linearibus. *Curt. n.* 59. *Fl. dan.* 844. *Engl. bot.* 1397.

Inter segetes aestivas ad Nietleben et alibi copiose. Iun. ☉

349. *Sc. anthriscus*, fructibus ovatis hispidis, corollis uniformibus, caule laevi. *Curt. n.* 3. *Engl. bot.* 818. *Caucalis scandicina* *Fl. dan.* 863.

Ad pagos, in sepibus, fossarum aggeribus frequens. Maio. ☉

129. CHAEROPHYLLUM.

350. *CH. SATIVUM*, caule laevi, umbellis laterali-
bus oppositifoliis. *Lam. Engl. bot.* 1268.
Schk. t. 73. Scandix Cerafolium L.

In hortis et aggeribus. Maio. ☉

*Huc pertinere patet & seminum laevitate. Cete-
rum nomen ipsum Ch. sativum Linnaeano antiquius,
quippe quum a C. Bauhino pin. 152. et Tour-
nefortio I. 314. iam adhibitum fuerit.*

351. *CH. TEMULUM*, caule scabro maculato, geni-
culis tumidis. *Curt. n. 61. Fl. dan. 918.*

In ruderatis, dumetis, ad sepes ubique. Iun. ♂

352. *CH. HIRSUTUM*, caule striato hirto, foliolis in-
cisis hirsutis, fructuum rostris maxime diver-
gentibus. *Morif. sect. 9. t. 10. f. 6.*

In nemoribus montosis ad Lodersleben, Schmon.
Iul. 2

353. *CH. SYLVESTRIS*, caule striato laevi, geniculis
tumidiusculis. *Curt. n. 46. Schk. t. 73.*

In pratis, ad sepes vulgare. Maio, Iun. 2

354. *CH. VULBOSUM*, caule laevi maculato genicu-
lis tumido, basi hirto.

In dumetis humidiusculis, ad Seeben, auf der
Peismitz, in der Lucke et alibi frequens. Iun. ♂

130. SESELI.

355. *S. ANNUUM*, caule striato subsimplici colorato
vaginato, vaginis ventricosis, foliolis lineari-
bus margine scabriusculis, involucellis poly-
phyllis margine membranaceis umbellulas ae-
quantibus. *Jacqu. austr. t. 55.*

In montibus nemorosis, Zorge, Lindberg, ad
Lieskau, Mittelholz. Iul. Aug. ♂

356. *S. HIPPOBATHRUM*, caule ramofo laevi, vagi-
nis acuminatis, foliolis lineari-filiformibus

98 CLASSIS V. PENTANDRIA.

subtrifidis, involucellis connato-monophyllis.
Riv. pent. 313. *Crantz austr. fasc.* 3.
tab. 5. *f.* 1. 2.

In montibus calcareis ad Beunstädt, Kölme copiose. Jul. 24

131. PASTINACA.

357. *P. SATIVA*, foliis simpliciter pinnatis subtus pubescentibus. *Engl. bot.* 556. *Fl. dan.* 1206.
Schk. t. 76.

In pratis et pascuis ubique. Jul. Aug. ♂

132. ANETHUM.

358. *A. GRAVEOLENS*, foliis bipinnatis, foliolis setaceis trichotomis. *Schk.* t. 77.

In hortis et agris vulgare. Jul. Aug. ☉ *A. Foeniculum sponte nusquam crescit, nisi in rupibus calcareis Angliae et Madeirae.*

133. CARUM.

359. *C. CARVI*. *Fl. dan.* 1091. *Schk.* t. 77.

In pratis et pascuis fere ubique. Jun. Jul. ♂

134. APIUM.

360. *A. GRAVEOLENS*, caule sulcato, foliis ternatis, foliolis caulinis cuneiformibus incis, umbellis subsessilibus. *Fl. dan.* 790. *Schk.* t. 78.
Engl. bot. 1210.

In paludibus, ad fossas bei Kölme, Dieskau, Brückdorf etc. Aug. ♂

135. PIMPINELLA.

361. *P. SAXIFRAGA*, glabra, foliis pinnatis, foliolis radicalibus subrotundis argute dentatis, summis linearibus. *Fl. dan.* 609. *Engl. bot.* 407.
Schk. t. 78.

In pascuis siccioribus et campis aridis vulgaris. Jul. Aug. 24

UMBELLATAE. TRIGYNIA.

99

362. *P. NIGRA*, pubescens, foliis pinnatis, foliolis radicalibus subcordatis incisive obtusis dentatis, summis linearibus. *Willd.*

In pascuis nemorosis ad Gutenberg, Wörmlitz etc. Jul. 2.

363. *P. MAGNA*, foliis pinnatis, foliolis omnibus ovatis, impari trilobo. *Engl. bot.* 408. *Fl. dan.* 1155. *Umbella rubente dicitur P. orientalis Gouan. ill.* 21. t. 15.

In pratis humidiusculis, ad Schkopa, Kollenbey, Passendorf etc. frequens. Jul. 2.

136. AEGOPODIUM.

364. *Az. PODAGRARIA*. *Fl. dan.* 670. *Engl. bot.* 940. *Schk.* t. 79.

In hortis et cultis vulgarissima. Jun. 2.

TRIGYNIA.

137. VIBURNUM.

365. *V. LANTANA*, foliis cordatis serratis venosis subtus tomentosis. *Engl. bot.* 331. *Kerner 5.* t. 34.

In nemoribus montosis, dem Rocken- und Mittelholze, maxime auf den Schmonschen Bergen. Maio. 5.

366. *V. OPULUS*, foliis lobatis acuminato-dentatis, petiolis glandulosis. *Fl. dan.* 661. *Engl. bot.* 332. *Schk.* t. 81. *Kerner 5.* t. 35.

In sepibus et dumetis humidis, in der Lucke, Peishitz, im Görz bei Wörmlitz, im Beuchlitzer Busche. Maio. 5.

138. SAMBUCUS.

367. *S. EBULUS*, caule herbaceo, stipulis foliaceis, cymis tripartitis. *Curt. n.* 36. *Fl. dan.* 1156. *Engl. bot.* 475. *Schk.* t. 83.

In sepibus ad Reideburg, Kollenbey, Gleßen. Jun. 2.

100 CLASS. V. PENTAND. TETRAG.

368. *S. NIGRA*, caule arboreo, stipulis subnullis, foliis ovatis ferratis, cymis 5-partitis. *Fl. dan.* 545. *Engl. bot.* 476.

In sepibus, ad pagos vulgaris. Iup. h

369. *S. RACEMOSA*, caule arboreo, racemis compositis ovatis. *Jacqu. ic. rar. I. t. 59. Kerner 5. t. 33.*

In sylvis ad Schmon, Lodersleben, Ziegelrode rarius. Maio. h Folia *quinato-pinnata*, foliis *ovato-lanceolatis argute denticulatis*; flores *virides*, baccæ *rubrae*.

TETRAGYNIA.

139. *PARNASSIA*.

370. *P. PALUSTRIS*. *Fl. dan.* 584. *Engl. bot.* 82. *Schk. t. 86. Sturm I. 15.*

In pratis humidis versus Nietleben et alibi vulgaris. Aug. 2

PENTAGYNIA.

140. *STATICE*.

371. *St. ARMERIA*; scapo simplici capitato, foliis linearibus. *Engl. bot.* 226. *Fl. dan.* 1092. *Sturm I. 1. Schk. t. 87.*

In paleis, versuris, collibus herbidis vulgarissima. Aestate. 2

141. *LINUM*.

372. *L. CATHARTICUM*, foliis oppositis obovatis integerrimis; caule superne dichotomo, petalis acutis. *Curt. n. 26. Engl. bot.* 382. *Schk. t. 87.*

In pratis, versuris vulgaris. Aestate. ☉

HEXAGYNIA.

142. *DROSER*.

373. *DR. ROTUNDIFOLIA*, scapo racemoso, capsula

HEXAGYNIA. POLYGYNIA. 101

3-valv., foliis orbiculatis. *Fl. dan.* 1028.
Engl. bot. 867. *Dreves et Hayne t. 2.*

In paludibus turfosis ad Lieskau, Dölau, bei
Benndorf am Lübertbach copiosissime. Iul. 24

374. DR. INTERMEDIA, scapo adscendente racemo-
so, foliis ovalibus, stigmatibus emarginatis.
Engl. bot. 868. *Dreves u. Hayne t. 3.*
Drof. longifolia Schk. t. 87.

Ibidem, sed rarius. Iul. 24

375. DR. LONGIFOLIA, scapo erecto racemoso, foliis
obverse lanceolatis, stigmatibus clavatis. *Fl.*
dan. 1093. *Dreves u. Hayne t. 3.* *Drof.*
anglica Engl. bot. 869.

In palude uliginosa ad breiten Saal im Lodersle-
bischen Holze. Aug. 24

POLYGYNIA.

143. MYOSURUS.

376. M. MINIMUS. *Curt. n. 43.* *Fl. dan.* 406.
Engl. bot. 435. *Schk. t. 88.* *Sturm I. II.*

In agria, cultis, muris limosis frequens. Iun. 20

GLASSIS VI.

HEXANDRIA.

MONOGYNIA.

* *Flores calyculati corollacei.*

144. TRIENTALIS. *Cal.* 6-phyllus infe-
rus. *Cor.* petala 6-partita stellata.

Bacca exsucca unilocularis.

145. BERBERIS. *Cal.* 6-phyllus inferus.

102 CLASSIS VI. HEXANDRIA.

Pet. 6, ad basin glandulis nectâriferis 2.
Bacca 2-sperma.

146. PEPLIS. *Cal.* campanulatus 12-dentatus, dentibus intercalaribus minimis.
Cor. 6-petala fugacissima. *Capf.* 2-locularis supera.

** *Flores spathacei.*

147. LEUCOIUM. *Cor.* supera 6-petala campanulata, petalis apice incrassatis.
Antherae obtusae.

148. GALANTHUS. *Cor.* supera 6-petala, petalis 3 interioribus brevioribus emarginatis. *Stigma* et *Antherae* fubulatae.

149. ALLIUM. *Cor.* infera 6-petala, petalis ovatis. *Umbellae* plerumque congestae.

*** *Flores nudi.*

† *Cor. inferae 6-petalae.*

150. QRNITHOGALUM. *Cor.* persistens patens. *Stam.* basi dilatata.

151. SCILLA. *Cor.* plana. *Stam.* filiformia.

152. PHALANGIUM. *Cor.* plana. *Stam.* glabra. *Sem.* angulata. (*Juss. Tournef. Perf.*)

153. LILIUM. *Cor.* subcampanulata unguibus linea nectarifera canaliculata exaratis. *Capf.* 3-valvis, valvis interiecto filo reticulato connexis.

154. TULIPA. *Cor.* campanulata. *Styl.* o. *Stigm.* 3-lobum. *Sem.* plana.

†† *Cor. infera 1-petala sexfida.*

155. HYACINTHUS. *Cor.* campanulata, poris ad ovarium 3 nectariferis. *Capf.* 3-locularis.

156. CONVALLARIA. *Cor.* campanulata. *Stigm.* 3-gonum. *Bacca* 3-locularis.

157. ASPARAGUS. *Cor.* 6-partita. *Stigm.* 3. *Bacca* 3-locularis.

158. ACORUS. *Cor.* planiuscula, petalis inflexis. *Antherae* didymae. *Spadix* multiflorus.

**** *Flores glumacei.*

159. JUNCUS. *Glum.* 2-phylla. *Cor.* 6-petala. *Stigmata* 3. *Capf.* supera 3-valvis polysperma.

***** *Flores nulli.*

160. CALLA. *Spatha* monophylla ovato-cordata. *Spadix* simplex superne

104 CLASS. VI. HEXAND. TRIGYN.

octonis, medio senis, inferne quaternis staminibus circa quodvis germen tectus. *Antherae* didymae. *Bacca* carnosa 6—8-locularis.

TRIGYNIA.

161. COLCHICUM. *Flos* spathaceus. *Cor.* 6-petaloidea, tubo radicato. *Capf.* inflata 3-locularis.

162. TRIGLOCHIN. *Cal.* 6-phyllus. *Styl.* o. *Capf.* basi dehiscens.

163. TOFIELDIA. *Cal.* 3-lobus. *Pet.* 6. *Capf.* 3 polyspermae.

164. RUMEX. *Cal.* 6-phyllus. *Cor.* o. *Sem.* 1. triquetrum.

POLYGYNIA.

165. ALISMA. *Cal.* 3-phyllus. *Pet.* 3. *Capf.* plures aggregatae monospermae.

Polygonum Persicaria, *Hydropiper*, minus (VII), *Lythrum Hyssopifolia* (VIII), Cl. XII. *Aristolochia* (XVII), *Fumaria* (XI.).

MONOGYNIA.

144. TRIENTALIS.

377. TR. EUROPAEA. *Fl. dan.* 84. *Engl. bot.* 13. *Sterpm* I. 17. *Schkk.* t. 103.

In nemorosis montosis ad Lindberg, (hodie fere evanuit) ad Hornburg et Farnstädt rarius. Maio, Iul. 24. Numerus variat a 5—7.

145. BERBERIS.

378. *B. vulgaris*, floribus racemosis, spinis triplicibus, foliorum obvatorum serraturis aristatis. *Fl. dan.* 904. *Engl. bot.* 49. *Schk.* t. 99. In sepibus et dumetis ad Gutenberg, Seeben, Olfrau, Müheln. Maio, 5

146. PEPLIS.

379. *P. portula*, caule radicante, foliis oppositis obovatis, floribus axillaribus glomeratis. *Michel.* t. 18. f. 1. *Curt. n.* 48. *Fl. dan.* 64. *Engl. bot.* 1211. *Schk.* t. 99. *Sturm I.* 1. In pratis udis ad Nietleben, Dölau et alibi frequens. Iul. Aug. ☉ Petala saepius nulla.

147. LEUCOIUM.

380. *L. vernum*, spatha uniflora, stylo clavato. *Schk.* t. 89. *Sturm I.* 11. In nemoribus umbrosis ad Lodersleben, ad Schkeuditz copiose. Mart. Apr. 24

148. GALANTHUS.

381. *G. nivalis*. *Engl. bot.* 19. *Schk.* t. 89. In pomariis, ad sepes passim, Mart. 24

149. ALLIUM.

- * *Foliis caulinis planis, umbella bulbifera.*
382. *A. arenarium*, vaginis foliorum teretibus, foliis ciliatis, spatha mutica, staminibus tricuspidatis, petalis carina scabriusculis. *Fl. dan.* 290. *Rupp. jen.* 145. t. 2. f. 2. *Engl. bot.* 1358. In nemoribus montosis, der Heide, dem Mittelholze, der Schleberoder Giehle. Iul. 24. Flores rubri, caulis ante anthesin nutans. *A. Scodoprasum dubia species.*

166 CLASSIS VL. HEXANDRIA.

383. *A. CARINATUM*, foliis carinatis, spatha diphylla longissima, umbella globosa, staminibus omnibus subulatis. *Hall. all. 51. t. 2. f. Bauh. in. IP. 56r.*

In nemoribus montosis, dem Rocken- und Mittelholze. Iul. 2. Flores ochroleuci.

*** *Foliis caulinis teretibus, umbella bulbifera.*

384. *A. VINALE*, spatha decidua, umbella congesta, staminibus tricuspidatis. *Dodon. 683.*

In nemoribus montosis, der Heide, dem Mittelholz. Iul. 2. Flores carnei.

385. *A. OLERACEUM*, foliis scabris canaliculatis subtus sulcatis, spatha umbellam laxam superante, staminibus simplicibus. *Hall. all. p. 49. t. 1. Engl. bot. 488. A. virens Lam. encycl. 1. p. 67.*

In vineis, pratis et pomariis et montosis passim. Iul. Aug. 2.

Flores pallide virides, linea purpurascens; adest etiam varietas purpureis floribus, pedicellis laxis longioribus, quae *A. paniculatum* L. esse videtur. Cf. *Haller stirp. n. 1225. Gerard. gallopr. p. 153.*

*** *Floribus radicalibus, scapo nudo.*

386. *A. ANGULOSUM*, scapo subcompresso, foliis linearibus canaliculatis subtus subangulatis, umbella fastigiata, staminibus subulatis. *A. petraeum umbelliferum I. Bauh. II. 564. Barrel. 1022. Gmel. fib. 1. t. 14. f. 2.*

In montosis rupestribus, ad ripas Unstrut. Iul. 2.

Occurrit in pratis, praesertim auf dem Gös bei Wörnitz: *A. pratense, folio gramineo, flore albo, Rudbeck. camp. elys. II. p. 159. quod cum Hallero varietatem huius habeo.*

387. *A. URSINUM*, scapo semicylindrico, foliis lan-

ceolatis petiolatis, umbella fastigiata. *Fl. dan.*
757. *Engl. bot.* 127.

In nemorosis et pratis humidis, auf der Raben-
insel bei Bülberg, ad Liebenau. Maio. 24

150. HYACINTHUS.

388. *H. comosus*, corollis angulato - cylindricis,
summis sterilibus longius pedicellatis. *Jacqu.*
austr. t. 126.

In nemorosis montosis, der Heide, dem Zorge
und Lindberg, Rocken, und Mittelholz copiose.
Iun. 24

389. *H. botryoides*, corollis globosis uniformibus,
foliis canaliculato - cylindricis strictis.

In pomariis graminosis. Maio. 24

151. CONVALLARIA.

390. *C. maialis*, scapo nudo semicylindrico, flori-
bus racemosis campanulatis nutantibus. *Curt.*
n. 51. *Fl. dan.* 86. *Engl. bot.* 128. *Sturm I.* 14.

In sylvis et nemoribus copiose. Maio. 24

391. *C. polygonatum*, caule angulato, foliis alter-
nis amplexicaulibus, floribus axillaribus sub-
solitariis infundibuliformibus. *Fl. dan.* 377.
Engl. bot. 280.

In sylvis et nemoribus ad Seeben, Gutenberg,
Dölau. Iun. 24

392. *C. multiflora*, caule tereti, foliis alternis am-
plexicaulibus, pedunculis axillaribus multiflo-
ris. *Engl. bot.* 179. *Fl. dan.* 152. *Schk.*
t. 97. *Hayne u. Dreves t.* 52.

In sylvis et nemoribus abundanter. Maio. 24

393. *C. bifolia*, foliis cordatis petiolatis, corol-
lis rotatis quadrifidis tetrandris. *Fl. dan.* 291.
Sturm. I. 13.

In nemorosis humidis frequens. Iun. 24

108 CLASSIS VI. HEXANDRIA.

152. ASPARAGUS.

594. *A. OFFICINALIS*, caule herbaceo tereti inermi, foliis fetaceis fasciculatis mollibus, stipulis solitariis, *Fl. dan.* 805 *Engl. bot.* 339. *Schk.* t. 196.
In pratis, nemorosis frequens. Iun. 24

153. ORNITHOGALUM.

595. *O. LUTEUM*, caule angulato infra monophyllo, pedunculis umbellatis simplicibus glabris, petalis obtusiusculis. *Fl. dan.* 378. *Engl. bot.* 21.

In sepibus et dumetis humidis, in der Lucke etc. Apr. 24

596. *O. MINIMUM*, scapo angulato nudo, pedunculis umbellatis ramosis pubescentibus, petalis acutiusculis. *Sturm I.* 12.

In pomariis, cultis, agris ubique. Apr. 24
Vereot; saepius confundi cum priori.

597. *O. UMBELLATUM*, floribus corymbosis, pedunculis longissimis. *Schk.* t. 954.

In collibus ad Trotha, Seeben passim. Maio. 24

154. SCILLA.

598. *SC. AMOENA*, scapo angulato, pedunculis alternis flore brevioribus, bracteis obtusis brevissimis. *Schk.* t. 94.

In pomariis, cultis; ex oriente cum Aesculo et Datura. Maio. 24

155. PHALANGIUM.

599. *PH. RAMOSUM*, scapo ramoso, foliis planis, pistillo recto. *Fl. dan.* 1157. *Schk.* t. 95. *Anthericum L.*

In collibus nemorosis aut apricis etiam, ad Kröllwitz vulgare, auf der Gimritzer Wiese, auf dem Tannenberge bei Gutenberg copiose. Iun. Iul. 24

600. *PH. LILIAGO*, scapo simplicissimo, foliis planis, pistillo declinato. *Fl. dan.* 616. *Anthericum L.*

In collibus apricis ad Kölme, Bennstädt. Iul. 24

156. LILIUM.

401. *L. MARTASON*, foliis verticillatis ovato-lanceolatis, corollis reflexis revolutis. *Jacqu. austr.* t. 351.

In nemoribus montosis umbrosis, Rocken- und Mitteleholze, ad Ostrau, in der Abarissine bei Kitten, in den Schmonischen Bergen, bei Erdebarn, et alibi frequens. Iun. 24.

157. TULIPA.

402. *T. sylvestris*, flora solitario subnutante, foliis lanceolatis, staminibus basi hirsutis. *Fl. dan.* 375. *Engl. bot.* 63. *Schk.* t. 93.

In nemoribus rarius. Maio. 24.

158. ACORUS.

403. *A. CALAMUS*, scapi mucrone longissimo foliaceo. *Smith.* *Engl. bot.* 356. *Fl. dan.* 1158. *Schk.* t. 97.

In fossis prope Passendorf et alibi frequens. Iul. 24.

159. JUNCUS.

* *Panicula laterali.*

404. *J. CONGLOMERATUS*, culmo nudo stricto, panicula conglobata, floribus triandris, capsula subrotunda obtusa. *Hofst III.* t. 82. *Fl. dan.* 1094.

In uliginosis, fossis vulgatissimus. Iun. Iul. 24.

405. *J. GLAUCUS*, culmo nudo glauco apice inflexo tereti, panicula erecta, capsulis oblongis stylo persistente coronatis. *Hofst III.* t. 81. *Fl. dan.* 1195. *Morif. III.* f. 8. t. 10. f. 13. (*sed non f. 25.*) *J. inflexus Leyst.*

In pascuis et pratis humidis vulgaris. Iun. Iul. 24.

406. *J. ERVUS*, culmo nudo stricto, panicula supradecomposita effusa, capsulis subclavatis obtusis. *Hofst III.* t. 83. *Fl. dan.* 1096.

In uliginosis, ad fossas frequens. Iun. Iul. 24.

112 CLASSIS VI. HEXANDRIA.

divaricato, capitulis subquinquefloris sessilibus, floribus subtrian-dris, capsula retusa.

- α. *J. uliginosus* *Roth., Smith. stolonifera*
Wohl. culmo procumbente radicante
Hofe III. t. 28. Fl. dan. 817. Sturm I.
13. Schk. t. 98. b.

In palude ad Lieskau, Jul. 24

- β. *J. supinus, culmo suberecto humili, capitula*
triphylla. Fl. dan. 1099.

In pratis, udis ad Unterschmon. *Wohl.*
Jul. 24

*** *Floribus racemose-spicatis.*

418. *J. CAMPESTRIS*, foliis planis, pilosis, spicis pe-
dunculatis umbellatis, intermedia sessili, pe-
talis mucronatis capsula longioribus. *Curt.*
n. 24.

In pascuis siccis ac nemoribus vulgatissimus.
Apr. 24

160. CALLA.

419. *C. PALUSTRIS*, foliis cordatis, spatha plana
Schk. t. 278. Fl. dan. 422. Sturm I. 5.

In prato paludoso auf der Abendseite von Kö-
nern, unico loco. Jul. 24

TRIGYNIA.

161. COLCHICUM.

420. *C. AUTUMNALE*, foliis planis lanceolatis ob-
tusis erectis. *Engl. bot. 153. Schk. t. 102.*
Sturm I. 3.

In pratis fere omnibus vulgatissimum. Sept. 4

162. TRIGLOCHIN.

421. *TR. PALUSTRE*, capsulis trilocularibus sublin-
gularibus. *Fl. dan. 490. Engl. bot. 366. Schk.*
t. 102. Sturm I. 13.

In pratis humidis vulgaris. Iun. 24.

TRIGYNIA.

113

162. *T. MARITIMUM*; capsulis sexlocularibus ovatis.
Fl. dan. 306. *Engl. bot.* 255:

In locis salis inuadatis; ad Dieskau; Kölme;
Längenbögen; ad lacum salinum: Iun: 24

163. TOFIELDIA:

163. *T. PALUSTRIS*; petalis obovatis obtusis. *Engl.*
bot. 536. *Anthericum calyculatum Fl. dan.* 36.
Narthecium iridifolium Vill. *Helonias bore-*
alis Willd. spec. Heriteria anthericoides
Schränk: Sternberg bot. Zeit. 1. 83.
t. 10.

In palude turfosa nicht weit vom Löberbach bei
der Berindorfer Mühle; rechts der Straße von
Dulitzsch nach Holzweilig: Iul: 24

164. RUMEX:

* *Flores hermaphroditi:*

164. *R. SANGUINEUS*, valvulis integerrimis oblongis,
unica maxime granifera, foliis cordato-lanceo-
latis subundulatis. *Petiv: h. brit. t. 2. f. 5.*

In umbrosis; pascuis; cultis; oleraceis: Iul: 24

Existat varietas exsanguis Kit. aib. (Petiv.
h. brit. t. 2. f. 6.) R. acutus Curt. n. 31:

165. *R. CRISPUS*, valvulis ovatis integris omnibus
graniferis; foliis lanceolatis undulatis acutis:
Curt. n. 18:

In humidis; ad pagos; vias; fossas frequens:
Iul: Aug: 24

Huius varietas est R. Nemolapathum L. suppl.
R. conglomeratus Röth: R. paludosus Ait.; qui
solummodo foliis minus undulatis differt. Occur-
rit ad Passendorf, Seeben, Gutenberg copiose.

166. *R. ACUTUS*, valvulis oblongis dentatis omnibus
graniferis, foliis cordato-oblongis acuminatis;
racemia foliolosis: *Petiv. h. brit. t. 2. f. 3:*

In humidis vulgaris: Iun: Iul: 24

114 CLASSIS VI. HEXANDRIA.

427. *R. obtusifolius*, valvulis dentatis, unica maxime granifera, foliis radicalibus cordatis obtusis, caule sulcato superne scabro. *Curt. n. 29.*

In ruderalis et ad vias, auf der Gimritzer Wiese, auf dem Petersberge et alibi. Iun. Iul. 24

428. *R. maritimus*, valvulis deltoideis dentatis graniferis, dentibus setaceis valvula longioribus, verticillis confertis, foliis linearibus. *Fl. dan. 1208.*

In fossis et paludibus, im Gohrenbach bei Holzweßig. Aug. ☉

R. palustris, *Smith. Curt. n. 28. sola varietas dentibus brevioribus esse videtur.*

429. *R. aquaticus*, valvulis ovatis integris obsolete graniferis, foliis cordato-lanceolatis acutis. *Pet. p. h. brit. t. 2. f. 1.*

In fossis et ad ripas Salae vulgaris. Iun. Iul. 24

R. Hydrolapathum *Ait., Hudf. R. Britannica Willd., Roth., Hofm. non nisi levis est varietas, ubi granulum alias obsoletum paullo prominet.*

** Flores dioici.

430. *R. acetosa*, foliis oblongis sagittatis, valvulis graniferis. *Engl. bot. 127.*

In pomariis, pratis et pascuis vulgaris. Iul. 24

431. *R. acetosella*, foliis lanceolato-hastatis, valvulis grano destitutis. *Curt. n. 52. Fl. dan. 1161.*

In pascuis ficcis, collibus apricis vulgarissimus. Aestate. 24

POLYGYNIA.

165. ALISMA.

432. *A. plantago*, foliis ovatis acutis, nervosis, panicula verticillato-decomposita, capsulis obtusis

irigonia. *Curt. n.* 54. *Fl. dan.* 561. *Engl. bot.* 837. *Schk. t.* 102.

In fossis, aquis fere omnibus et locis inundatis, Jul. 24.

433. *A. NATANS*, foliis submersis linearibus, natantibus ellipticis obtusis venosis, pedunculis solitariis, capsulis striatis. *Roth. germ. II.* 1. 429.

Prope Merseburg im Gotthardsteiche. Aug. 24

434. *A. RANUNCULOIDES*, foliis lineari-lanceolatis, scapo verticillato paucifloro, capsulis pentagonis incurvis globoso-aggregatis. *Fl. dan.* 122. *Engl. bot.* 326.

In palude turfosa ad Lieskau. Aug. 24

GLASSIS VII.

OCTANDRIA.

MONOGYNIA.

* *Flores completi.*

166. *AESCULUS*. *Cal.* 1-phyllus, 4—5-dentatus ventricosus. *Cor.* 4—5-petala irregularis. *Caps.* 3-locularis.

167. *EPILOBIUM*. *Cal.* 4-fidus superus. *Cor.* 4-petala. *Caps.* 4-locularis. *Sem.* papposa.

168. *OENOTHERA*. *Cal.* 4-fidus superus. *Cor.* 4-petala. *Caps.* 4-locularis. *Sem.* nuda.

116 CLAS. VII. OCTANDRIA.

169. ACER. *Cal.* 5-fidus inferus. *Cor.* 5-petala. *Samaræ* duae unilatae.

170. VACCINIUM. *Cal.* 4-dentatus brevissimus superus. *Cor.* 1-petala campanulata. *Antherae* bicornes dorso 2-angulatae. *Bacca* 3—5-locularis.

171. ERICA. *Cal.* 4-phyllus inferus. *Cor.* 1-petala. *Caps.* 4-locularis.

** *Flores incompleti.*

172. DAPHNE. *Cal.* corollinus 4-fidus inferus. *Bacca* 1-sperma.

TRIGYNIA,

173. POLYGONUM. *Cal.* corollinus 5-partitus inferus. *Cor.* 6. *Sem.* nudum.

TETRAGYNIA,

174. ADOXA. *Cal.* superus dentatus. *Cor.* 4—5-fida supera. *Bacca* 1-locularis 4-sperma calyce semivestita.

175. PARIS. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* 4-petala. *Bacca* supera 4-locularis.

176. ELATINE. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* 4-petala. *Capsula* supera 4-locularis.

Ulmus effusa (V), *Monotropa*, *Chrysosplenium*, *Scleranthus*, *Euphorbia* (VIII), *Polygala* (XIV), *Myriophyllum*, *Corylus* (XVIII).

ENNEANDRIA: HEXAGYNIA.

177. BUTOMUS. *Cal.* Involucrum 3-phyllum. *Cor.* 6-petala alternis maioribus. *Capf.* 6 polyspermae.

Mercurialis (XIX):

M O N O G Y N I A.

166. AESCULUS.

435. *Az. HIPPOCASTANUM*, foliis digitatis septenis, corollis pentapetalis patulis. *Schk. t. 104.*

Ad pagos, vias passim. Maio. 3

Ex Oriente cum *Scilla et Datura*. Numerus
seminum 7—9.

167. EPILOBIUM.

436. *E. ANGUSTIFOLIUM*, foliis sparsis lineari-lanceolatis venosis glabris, floribus inaequalibus, staminibus declinatis. *Curt. n. 18. Fl. dan. 189. Schk. t. 106.*

In pratis umbrosis et ad sepes, in der Lucke, bei Wörmnitz, in der Heide. Iul. 24

Varietas foliis latioribus est E. latifolium Lys. non L.

437. *E. HIRSUTUM*, foliis semiamplexicaulibus ovato-lanceolatis denticulatis cauleque ramosissimo villosis, radice stolonifera. *Curt. n. 20. Fl. dan. 326. Engl. bot. 838.*

In fossis et salicetis ad Nietleben, in der Lucke, Dieskau et alibi frequens. Iul. 24

Flores rosei magni.

438. *E. PARVIFLORUM*, foliis sessilibus lanceolatis pu-

118 CLASSIS VII. OCTANDRIA.

bescentibus, caule subsimplici lanato, radice fibrosa. *Engl. bot.* 795. *Ep. villosum* Curt. n. 21. *Leys.* *Ep. pubescens* Willd. *Ep. hirsutum* Huds. *Fl. dan.* 347.

In fossis et rivulis pratorum ad Nietleben, Canena, Reideburg, passim. Iul. 24

Flores purpurei minusculi.

439. *E. roseum*, foliis oppositis alternisque ovato-lanceolatis denticulatis glabris petiolatis, caule teretiusculo glabro, stigmate quadrifido. *Schreb. Retz. E. montanum* *Fl. dan.* 922.

In cultis umbrosis, sepibus et dumetis. Iul. 24

Nec *E. montani*, nec *E. tetragoni* varietas.

440. *E. tetragonum*, foliis lanceolatis denticulatis, caule tetragono, stigmate indiviso. *Curt.* n. 22. *Fl. dan.* 1929.

In fossis ad Seeben an der salzigen See bei Röllingen. Iul. 24

441. *E. palustre*, foliis sessilibus lineari-lanceolatis subdenticulatis, caule tereti, stigmate indiviso. *Engl. bot.* 346.

In paludibus ad Nietleben et alibi. Iul. 24

168. OENOTHERA.

442. *O. biennis*, foliis ovato-lanceolatis denticulatis, caule villoso submuricato, staminibus corolla brevioribus. *Fl. dan.* 446. *Sturn I.* 5.

E Virginia cum *Erigeronte canadensi* ad nos venit, iam indigena, ad vias, sepes, in suburbis. Iul. 25

169. ACER.

443. *A. pseudoplatanus*, foliis quinquelobis inaequaliter ferratis, racemis pendulis. *Engl. bot.* 303. *Kern.* 3. 18.

In sylvis montosis ad Schleberode, Möncherode, Brehna. Maio. 5

444. *A. PLATANOIDES*, foliis quinquelobis utrinque glabris, lobis dentibusque acuminatis; corymbis erectis. *Schk.* t. 351. *Kern.* 3. t. 17.

In sylvis montosis ad Lodersleben, Schmon. Maio. h

445. *A. CAMPESTRE*, foliis quinquelobis subintegris, lobis obtusis maioribus obsolete subsinuatis, corymbis erectis. *Engl. bot.* 304. *Kern.* 3. t. 19.

In sylvis montosis, praesertim ad Schmon, Lodersleben, Hornburg. Maio, Iun. h

170. VACCINIUM.

• *Foliis deciduis.*

446. *V. MYRTILLUS*, pedunculis unifloris, foliis ovatis serratis, caule angulato. *Fl. dan.* 974. *Engl. bot.* 456. *Schk.* t. 107. a.

In montosis sylvaticis, der Heide, dem Zorge, Lindberg et alibi copiose. Apr. Maio. h

Stamina saepe 10.

•• *Foliis sempervirentibus.*

447. *V. VITIS IDAEA*, racemis terminalibus nutantibus, foliis obovatis revolutis denticulatis subtus punctatis. *Fl. dan.* 40. *Engl. bot.* 598.

In montosis sylvaticis ad Lodersleben, Helsta. Iun. 24

448. *V. OXYCOCCOS*, caulibus repentibus filiformibus, foliis ovatis integerrimis revolutis subtus glaucis, pedunculis aggregatis terminalibus unifloris. *Fl. dan.* 80. *Engl. bot.* 319. *Schk.* t. 107. a. *Oxycoccus palustris Pers. syn.*

In paludibus Sphagno repletis rarissime, ad Dölan, ad Benndorf cum *Tofieldia palustri.* Iun. Iul. 24

171. ERICA.

449. *E. VULGARIS*, antheris aristatis inclusis, stylo exserto, corolla quadripartita, foliis quadrifidis

129 CLASSIS VII. OCTANDRIA.

riam imbricatis basi calcaratis. *Curt. n. 56, Fl. dan. 677. Sturm I. 1. Schk. t. 107. a.*

In sterilibus *ericetis*, sylvis abundanter. Aug. 3

Varietas occurrit pone dem Fasanenhaus in peludibus, foliis pubescenti imcanis, quae E. ciliaris Hudf. vulgaris hirsuta Raii syn.

172. DAPHNE.

450. D. MEZERIUM, floribus sessilibus aggregatis caulinis, foliis deciduis lanceolatis. *Fl. dan. 268, Engl. bot. 1381. Schk. t. 107. a. Sturm I. 8.*

In nemorosis montosis, ad Erdeborn, auf den alten Steinkohienhalden, bei Lodersleben und Leimbach im Lindberge etc. Apr. 3

TRIGYNIA.

173. POLYGONUM.

• *Trigyna.*

451. P. BISTORTA, caule simplicissimo erecto monostachyo, foliis ovatis undulatis in petiolum decurrentibus. *Curt. n. 2. Engl. bot. 509. Dreyer u. Hayne t. 39.*

In pratis subhumidis ad Seeben, Gutenberg, Etxdorf et alibi. Iun. 4

452. P. AVICULARE, caule procumbente herbaceo, foliis elliptico-lanceolatis margine scabris, ochreis paucinerviis, floribus axillaribus. *Curt. n. 10. Engl. bot. 1252. Sturm I. 1.*

In cultis, ruderalis, agris, arvis ubique. Aest. 0

Ludit foliis angustioribus, latioribus, rubentibus; flore albo et rubro.

453. P. CONVOLVULUS, caule volubili angulato, foliis cordato-ligulatis, laciniis calycinis obtuse carinatis. *Curt. n. 41. Fl. dan. 744.*

In arvis, hortis et sepibus frequens. Iun. Iul. 0

454. *P. DUMETORUM*, caule volubili striato, foliis cordatis, floribus carinato-alatis. *Fl. dan.* 756.
In nemoribus umbrosis ad Seeben, in der Lucke etc. Iul. ☉.

Planta saepe plusquam orgyalis.

•• *Digyna.*

455. *P. AMPHIBIUM*, floribus pentandris, spica ovata.
a. *P. aquaticum*, foliis oblongis obtusis glaberrimis, staminibus corolla brevioribus. *Curt. n.* 40. *Fl. dan.* 282.

β. *P. terrestre*, foliis oblongo-lanceolatis acutiusculis scabris, staminibus corolla longioribus. *Engl. bot.* 436.

In paludibus vulgare α. aquae innatat, β. ad margines paludum; sed utraque saepe mire ludit. Aetate. 24

456. *P. PERSICARIA*, floribus hexandris, spicis ovato-oblongis erectis, pedunculis laevibus, foliis lanceolatis subnuculatis, ochreis ciliatis. *Curt. n.* 5. *Fl. dan.* 702.

In fossis et palustribus vulgare. Iul. Aug. ☉

Flores rosei; foliis subtus incanis ludit.

457. *P. LAPATHIFOLIUM*, floribus hexandris, spicis brevibus obtusis demum nutantibus, pedunculis scabris, ochreis muticis, seminibus utrinque concavis. *Curt. n.* 12.

Cum priori subinde occurrit. Iul. Aug. ☉

Flores albedo-virescentes vel parum rubicundi.

458. *P. HYDROPIPER*, floribus hexandris, spicis linearibus laxis nutantibus, foliis lanceolatis undulatis immaculatis, ochreis subciliatis, seminibus compressis. *Curt. n.* 11. *Schk. t.* 108.

In fossis et paludibus frequens. Sept. ☉

459. *P. MINUS*, floribus hexandris, submonogynis,

122 CLASS. VII. OCTANDR. TETRAG.

foliis lineari-lanceolatis subaveniis, spicis filiformibus erectiusculis, ochreis ciliatis, caule basi radicante. *Curt. n. 11. Engl. bot. 1048.*
P. angustifolium Roth. P. strictum Allion.

Im Burgholz bei Radewell, bei Kölme an der Salzke, bei Memleben. Iul: Aug. ☉

TETRAGYNIA.

174. ADOXA.

460. A. MOSCHATELLINA. *Curt. n. 23. Schk. t. 109. a. Fl. dan. 94. Engl. bot. 453.*

In nemorosis umbrosis humidis im Zorge, Lindberg, ad Liebenau. Apr. 24

Herba moschum redolens; stamina primarii terminalis floris 8; lateralium secundariorum 10.

175. PARIS.

461. P. QUADRIFOLIA. *Fl. dan. 139. Engl. bot. 7. Schk. t. 109. a. Sturm I. 12.*

In nemorosis umbrosissimis ad Erdeborn, Schmon, Lodersleben, Liebenau. Maio. 24

176. ELATINE.

462. E. HYDROPIPER, foliis oppositis, floribus alternis. *Fl. dan. 156. Schk. t. 109.*

Semel legi ad ripam Salae hinter den kön. Kothen. Aug. ☉

ENNEANDRIA.

177. BUTOMUS.

463. B. UMBELLATUS. *Curt. n. 1. Fl. dan. 604. Schk. t. 111. Sturm I. 18.*

In fluviis nostris, aquis profundioribus vulgaris. Iul. 24

CLASSIS VIII.

DECANDRIA.

MONOGYNIA.

* *Flores completi pentapetali.*

178. MONOTROPA. *Cal.* 4 — 5-phyllus coloratus. *Pet.* 4 — 5 basi appendiculata. *Stigma* discoideum. *Caps.* 4 — 5-locularis 5-valvis.

179. DICTAMNUS. *Cal.* 5-phyllus. *Pet.* 5 inaequalia. *Stam.* declinata glandulosa. *Caps.* 5, 2-valves. *Sem.* arillata.

180. LYTHRUM. *Cal.* 10 — 12-dentatus inferus. *Pet.* 5 — 6 calyci inserta. *Stam.* alterna longiora. *Caps.* 2-locularis polysperma.

181. PYROLA. *Cal.* 5-partitus. *Pet.* 5 aequalia. *Antherae* poris duobus. *Caps.* 5-locularis polysperma supera angulis dehiscens.

** *Flores incompleti.*

182. ASARUM. *Cal.* 3-fidus superus. *Cor.* o. *Antherae* 10 — 12 geminae aristatae. *Stigm.* 5 — 6-fidum. *Caps.* coriacea 6-locularis coronata.

124 CLASS. VIII. DECANDR. DIGYN.

D I G Y N I A.

* *Flores completi 5-petali.*

183. SAXIFRAGA. *Cal.* 5-partitis, *Capsf.* birostris unilocularis polysperma.

184. GYPSOPHILA. *Cal.* 1-phyllus, 5-dentatus 5-gonus. *Petala* ovata subsefilia. *Capsf.* 1-locularis 5-valvis globosa,

185. SAPONARIA. *Cal.* 1-phyllus tubulosus 5-dentatus, basi nudus. *Capsf.* 1-locularis oblonga.

186. DIANTHUS. *Cal.* 1-phyllus tubulosus 5-dentatus, squamis succinctus. *Pet.* unguiculata. *Capsf.* 1-locularis cylindrica.

187. AGRIMONIA. *Cal.* 1-phyllus 5-dentatus echinatus calyculatus. *Pet.* et *Stam.* 10 — 12 calyci inserta. *Sem.* 2 calyce vestita,

** *Flores incompleti.*

188. SCLERANTHUS. *Cal.* 1-phyllus superus 5-dentatus. *Cor.* o. *Sem.* 1 arilatum calyce corticato tectum.

189. CHRYSOSPLENIUM. *Cal.* 4 — 5-fidus coloratus. *Cor.* o. *Stam.* 8 — 10, *Capsf.* feminifera semibivalvis subbirostris polysperma.

TRIGYNIA. PENTAGYNIA. 325

TRIGYNIA.

* *Flores completi 5-petali.*

190. CUCUBALUS. *Cal.* subinflatus 5-dentatus. *Pet.* ad unguēs nuda. *Caps.* 3-locularis polysperma.

191. SILENE. *Cal.* subventricosus 5-dentatus. *Pet.* ad unguēs coronata. *Caps.* sub 3-locularis polysperma.

192. STELLARIA. *Cal.* 5-phyllus patens. *Petalā* bipartita. *Caps.* 1-locularis ore sexdentato.

193. ARENARIA. *Cal.* 5-phyllus patens. *Pet.* integra. *Caps.* 1-locularis.

** *Flores subincompleti.*

194. EUPHORBIA. *Cal.* inferus 1-phyllus ventricosus. *Nectar.* 4—8, crassiuscula, calyci insidentia. *Caps.* 3-coccosa pedicellata.

PENTAGYNIA.

Flores 5-petali.

195. SEDUM. *Cal.* 5-fidus. *Squamae* 5 nectariferae ad basin germinis. *Caps.* 5 superae.

196. OXALIS. *Cal.* 5-phyllus. *Pet.* unguibus connexa. *Stam.* submonadelphā,

206 CLASS VIII. DECANDR. DECAG.

alterna longiora. *Caps.* supera 5-locularis pentagona angulis dehiscens. *Sem.* arillata.

197. AGROSTEMMA. *Cal.* 1-phyllus 5-dentatus pentagonus coriaceus. *Pet.* unguiculata. *Caps.* 1-locularis ore 5-dentato.

198. LYCHNIS. *Cal.* 1-phyllus 5-dentatus tubulosus. *Pet.* ad unguem coronata. *Caps.* 1 — 3 — 5-locularis.

199. GERASTIUM. *Cal.* 5-phyllus. *Pet.* bifida. *Caps.* 1-locularis ore 10-dentato apice dehiscens.

200. SPERGULA. *Cal.* 5-phyllus. *Pet.* integra. *Caps.* 1-locularis 5-valvis.

DECAGYNIA.

201. SEMPERVIVUM. *Cal.* 10 — 12-partitus. *Cór.* 10 — 12 petala. *Stam.* monadelphica. *Caps.* 10 — 12 aut plures.

Vaccinium Myrtillus, *Adoxa Moschellina* (VII), *Geranium Portulaca* (XII),
Cl. XII. fere tota.

MONOGYNIA.

178. MONOTROPA.

464. *M. HYPOPHYTIS*, floribus lateralibus octandris terminali decandro. *Fl. dan.* 232. *Engl. bot.* 69. *Schk.* t. 116. *Sturm I.* 13.

Parasitica ad radices saporum vel pinuum locis umbrosissimis, im Brehmischen Holze, bei Lodersleben und Schmon. Iul. 24

179. DICTAMNUS.

465. *D. ALBUS*. *Schk.* t. 114. *Sturm I.* 6. In sylvis montosis, in der Heide, dem Lindberge, Rocken- und Mittelholze et alibi frequens. Iun. 24

180. LYTHRUM.

466. *L. SALICARIA*, caule subquadrangulo, foliis oppositis cordato-lanceolatis, floribus verticillato-spicatis. *Curt. n.* 31. *Fl. dan.* 671. *Engl. bot.* 1061.

Ad ripas Salae, in fossis frequens. Aestate. 24

467. *L. HYSSOPIFOLIA*, caule teretiusculo, foliis alternis lineari-lanceolatis, floribus axillaribus solitariis oligandris. *Schk.* t. 128. *Engl. bot.* 292. *Rupp.* t. 6. f. 2.

In arvis inundatis, ad Nietleben, Schraplau etc. Aug. ☉

181. PYROLA.

468. *P. ROTUNDIFOLIA*, foliis subrotundo-ellipticis obtusiusculis, staminibus adscendentibus, pistillo declinato. *Fl. dan.* 110. *Engl. bot.* 213. *Sturm I.* 13.

In nemoribus umbrosis humidis, hinter dem Fasanenhause, bei Dölau, Lieskau, in der Abatissina, bei Liebenau. Iun. Iul. 24

469. *P. MINOR*, foliis ovatis serrulatis acutis, stami-

128 CLASSIS VIII. DECANDRIA.

nibus pistilloque rectis: *Fl. dan.* 55. *Engl. bot.* 158. *Sturm* I. 13.

In nemoribus umbrosis ad Dölau; Lodersleben; Hornburg. Iun. Iul. 24

470: *P. SECUNDA*; foliis ovatis ferrulatis; racemo unilaterali, pistillo recto: *Fl. dan.* 402. *Engl. bot.* 517. *Sturm* I. 13:

In nemoribus umbrosis ad Schmon, Brehna, Schleberode: Iun. Iul. 24

471: *P. UMBELLATA*; foliis lanceolatis basi attenuatis apice serratis, pedunculis subumbellatis: *J. Bauh. hist.* III: 536:

In sylva umbrosa ad Lodersleben semel legi: Iul. 24

472: *P. UNIFLORA*, foliis obovatis ferrulatis; pedunculoq. unifloro. *Fl. dan.* 8. *Engl. bot.* 146. *Sehk.* t. 119:

In nemoribus umbrosis ad Schmon et Gatterstädt rarissime: Iul. 24

182: ASARUM.

473: *A. EUROPAEUM*, foliis reniformibus obtusis binis. *Fl. dan.* 653. *Engl. bot.* 1083. *Sturm* I. 2:

In nemoribus montosis ad Erdeborn; Brucke bei Rothenburg; Fienstädt; im Klostchwitzer Holz hinter Wettin: Maio. 24

D I G Y N I A.

183: SAXIFRAGA.

474: *S. TRIDACTYLITES*, foliis radicalibus subintegris, caulibus cuneatis trifido-incisis; caule ramoso; pedunculis unifloris, petalis calycem subaequantibus: *Curt. n.* 22. *Engl. bot.* 501:

In rupestribus ad Kröllwitz et Giebichenstein copiose: Apr; Maio: ☉

Variat caule magis ramoso altiori, foliis radicalibus profunde incis, quae est S. petraea Roth. (nov. act. nat. cur. 7. p. 200.), quam dignissimus observator dein (fl. germ. II. 470.) melius collocavit.

475. *S. GRANULATA*, foliis reniformibus lobatis, caule paniculato, radice granulata, petalis calycem multo excedentibus. *Curt. n. 9. Engl. bot. 500. Sturm I. 6. Schk. t. 119.*

In collibus apricis vulgaris. Maio. 24

184. GYPSOPHILA.

476. *G. MURALIS*, caule dichotomo foliis linearibus planis, calycibus nudis, petalis crenatis. *Schk. t. 120. Sturm I. 1.*

In montosis aridis, rupibus ad Kröllwitz, Trotha, Dölau, Seeben. Aug. ♂

185. SAPONARIA.

477. *S. OFFICINALIS*, calycibus cylindricis, foliis elliptico-lanceolatis. *Curt. n. 17. Fl. dan. 543. Engl. bot. 1060. Sturm I. 6. Schk. t. 121.*

In pratis et dumetis, in der Preussischen Lucke, ad Wörmnitz, Beuchlitz. Iun. Iul. 24

478. *S. VACCARIA*, calycibus pyramidalis quinquangulatis, foliis ovatis acuminatis. *Dodon. 104.*

Inter segetes, praesertim aestivas. Iul. Aug. ☉

186. DIANTHUS.

* *Flores aggregati.*

479. *D. CARTHUSIANORUM*, floribus subaggregatis, squamis calycinis ovatis aristatis tubo brevioribus, foliis linearibus nervosis.

In campis, arvis, versuris, ad vias vulgarissimus. Aestate. 24

480. *D. ARMERIA*, floribus fasciculatis, squamis ca-

136 CLASSIS VIII. DECANDRIA.

lycenis lanceolatis villosis tubum aequantibus.
Fl. dan. 230. Engl. bot. 317. Schk. t. 121.

In nemoribus montosis, sylvis caeduis, in der Abatissine, der Brennau, dem Welfsholz bei Hettstädt. Iul. ☉

481. *D. PROLIFERA*, floribus capitatis, squamis calycinis ovatis obtusis scariosis tubum superantibus petalis emarginatis. *Fl. dan. 221. Engl. bot. 256.*

In collibus siccis apricis ad Bergschenke, Seeben, Gutenberg. Iul. Aug. ☉

*** *Flores solitarii, plures in eodem caule.*

482. *D. DELTOIDES*, squamis calycinis ovato-lanceolatis acutis subbinis, foliis obtusiusculis subpubescentibus, petalis crenatis. *Fl. dan. 577. Engl. bot. 61.*

In pratibus ad Liebenau et Lochau abundanter. Iul. 2.

Huc et *D. arenarius* Leyss., quem praeter Buxb. 60. nemo invenit.

483. *D. SUPERBUS*, floribus paniculatis, squamis calycinis brevissimis acuminatis, petalis multifido-capillaribus. *Fl. dan. 578.*

In nemoribus montosis, dem Mittel- und Roekenholz, ad Lieskau, im Badendorfer Holze bei Neehausen, ad Mueheln. Iul. Aug. 2.

187. AGRIMONIA.

484. *A. EUPATORIA*, foliis caulinis interrupte pinnatis, foliolis oblongo-ovatis grosse serratis, spicis elevatis. *Curt. n. 53. Fl. dan. 588. Engl. bot. 1335. Schk. t. 128.*

In campis herbidis, versuris, ad vias frequens. Aestate. 2.

188. SCLERANTHUS.

485. *SCL. ANNUUS*, calycibus fructus patulis acutis, calicibus patentibus. *Fl. dan. 504. Engl. bot. 351.*

In arvis arenosis vulgaris. Aestate. ☉

DIGYNIA. TRIGYNIA. 131

486. *SCL. PERENNIS*, calycibus fructus clausis obtusis margine membranaceis, caulibus procumbentibus. *Fl. dan.* 503. *Engl. bot.* 352. *Schk.* t. 120.

189. CHRYSOSPLENIUM.

487. *CHR. ALTERNIFOLIUM*, foliis alternis. *Fl. dan.* 366. *Engl. bot.* 54. *Sturm I.* 12. *Schk.* t. 108.

Ad scaturigines umbrosas bei Seeben, Liebenau, am breiten Saal bei Lodersleben. Apr. Mai. 24

488. *CHR. OPPOSITIFOLIUM*, foliis oppositis. *Curt. n.* 23. *Fl. dan.* 365. *Engl. bot.* 490. *Sturm I.* 4.

Ad rivulos im Hohlwege nach dem Gesundbrunnen, wenn man nach Bölberg geht (*Kohl*), ad Lodersleben. Apr. 24

T R I G Y N I A.

190. CUCUBALUS.

489. *C. BEHEN*, floribus paniculatis cernuis, calycibus globosis reticulato-venosis, petalis semibifidis fauce subnudis. *Fl. dan.* 914. *Engl. bot.* 164. *Hayne u. Dreyes t.* 50. *Schk.* t. 121.

In nemorosis siccis, der Heide, dem Mittel- und Rockenholz et alibi copiose. Iun.

490. *C. OTITES*, floribus paniculatis dioicis, calycibus nervosis, petalis linearibus indivisis nudis. *Fl. dan.* 518. *Engl. bot.* 85.

In collibus apricis vulgarissimus. Iul. Aug. 24

191. SILENE.

491. *S. BACCIFERA*, calycibus solitariis fructiferis cernuis inflatis laevibus, capsulis coloratis, ramis divaricatis. *Willd. Cucubalus bacciferus L. Leyse.*

132 CLASSIS VIII. DECANDRIA.

In nemoribus humidis ad Lieskau, Seeben, Holz-
weißig rarius. Iul. Aug. 2.

492. *S. MUTANS*. floribus paniculatis secundis cer-
nuis, petalis bipartitis, laciniis linearibus, fo-
liis lanceolatis pubescentibus. *Fl. dan.* 242.
Engl. bot. 495. *Schk.* t. 122.

In montosis nemorosis, der Heide et alibi fre-
quens. Iun. 2.

495. *S. COXOIDEA*, caule ramoſo viſcoſo, foliis lan-
ceolatis pubescentibus, calycibus fructus globo-
ſo-acuminatis 50-striatis, petalis emarginatis.
Lychnis glabra annua, foliis oblongis mucro-
natis. l. Bauh. hiſt. III. 349. A. orif.
ſect. 5. tab. 55.

Inter ſegetes, ſolo elatiori non raro, ad Schlet-
tau, Merſeburg. Iul. ☉

494. *S. KOCTIFLORA*, caule dichotomo, foliis infimis
obovatis, calycibus 10-angularibus, dentibus
tubum ſubaequantibus, petalis biſidis obtuſe
coronatis. *Engl. bot.* 291. *Sturm I. 5.*

Inter ſegetes ad Rabatz. Zoberitz, in der Heide,
ad Gutenberg. Iul. ☉

496. *S. ARMERIA*, panicula dichotoma ſiſtigiata mul-
tiſſora, foliis ſuperioribus cordatis glabris, pe-
talis emarginatis. *Fl. dan.* 552. *Engl. bot.* 1358.

In nemore dem Mittelholze rarius. Maio, Iun. ☉

192. STELLARIA.

496. *ST. NEMORUM*. foliis inferioribus cordatis pe-
tiolatis, ſuperioribus ovatis ſeſſilibus, panicu-
la dichotoma. *Fl. dan.* 271. *Engl. bot.* 92.

In nemoribus umbroſis ad Seeben, Gutenberg,
Liebenau. Maio, Iun. 2.

497. *ST. MEDIA*, caulis procumbentibus, linea li-
terali pileola alterna, foliis ovatis. *Smith.*
Engl. bot. 557. *Fl. dan.* 458. 525. *Curt.*

n. 12. *Sturm I. 1. Schk. t. 85. Alfine media L.*

In cultis et ruderatis ubique per totum annum. ☉
Staminibus variat 3, 4, 5, 6.

498. *ST. HOLOSTEA*, caulibus erectis quadrangulis, foliis lanceolatis ferrulatis, panicula dichotoma, calycibus enerviis. *Curt. n. 14. Fl. dan. 698. Engl. bot. 511. Schk. t. 122. (minus bene).*

In dumetis et nemorosis frequens. Maio, Iun. 24

499. *ST. GRAMINEA*, foliis lineari-lanceolatis integerrimis, panicula terminali divaricata, calycibus trinervis petala subaequantibus.

In arvis, sepibus et dumetis. Iun. Iul. 24

500. *ST. GLAUCA*, caule tetragono erecto, foliis lineari-lanceolatis integerrimis glaucis, floribus subsolitariis, calyce trinerui petalis profunde bipartitis multo breviori. *Wither., Smith., Gmel. fib. IV. t. 61. f. 2. (petala minus profunde incisa.) St. palustris Willd. St. graminea B. Leyf.*

In fossis ad Holzweißig. Aug. 24

501. *ST. ULIGINOSA*, caule quadrangulo decumbente, foliis elliptico-lanceolatis integerrimis apice callosis, pedunculis subgeminatis paucifloris, petalis calyce brevioribus. *Curt. n. 62. Engl. bot. 1074. Fl. dan. 415. Sturm I. 1. St. Alfine Willd. Dilleniana Leers. graminea Y. Leyf.*

Ad scaturigines hinter der Kröllwitzer Papiermühle, bei Lodersleben, am heiligen Brunnen bei Oberfchmon. Iun. ☉

193. ARENARIA.

502. *A. TRINERVIA*, foliis ovatis acutis petiolatis nervosis, calycibus carina scabris obsolete trinervis. *Curt. n. 46. Fl. dan. 429. Schk. t. 122.*

134 CLASSIS VIII. DECANDRIA.

In sylvis et nemorosis humidis frequens. Iun.
Iul. ☉

503. *A. SERPYLLIFOLIA*, foliis ovatis acutis sessilibus, calycibus hirsutis subquinqüenerviis petala excedentibus. *Curt. n. 45. Fl. dan. 977.*

In arvis et agris frequens. Aestate. ☉

504. *A. RUBRA*, foliis linearibus mucronulatis, stipulis scariolis vaginantibus, seminibus compressis angulatis scabriusculis. *I. Bauh. hist. II. 719.*

In arvis arenosis frequens. Iul. ☉

505. *A. MARINA*, foliis semicylindricis carnosis mucosis, stipulis scariolis vaginantibus, seminibus compressis marginatis glabris. *Fl. dan. 740. A. rubra β. Leyfs.*

In locis salis, an der Salzke, an den Seen bei Erdeborn. Iul. ☉

506. *A. VERNA*, foliis subulatis (lente obtusiusculis nervosis), caulibus paniculatis, petalis calyce acuto trinervio longioribus obovatis. *Engl. bot. 512. A. caespitosa Wohlleb.*

In montosis, ubi saxum (rothe Todte Liegende) subest, ad Hornburg, Sittichenbach, Wolferode, Eisleben, Wimmelburg, Kloster Mansfeld, Hettstädt. Iun. 24

194. EUPHORBIA.

* *Umbella trifida*.

507. *E. PEPLUS*, umbella trifida dichotoma, involu-cellis ovatis, foliis integerrimis obovatis petiolatis. *Curt. n. 6. Fl. dan. 1100.*

In cultis oleraceis. Aug. Sept. ☉

508. *E. EXIGUA*, umbella trifida dichotoma, involu-cellis lanceolatis, foliis linearibus. *Curt. n. 41. Engl. bot. 1550.*

α. *E. ex. acuta, foliis acutis.*

β. — *retusa, foliis obtusiusculis subretusis.*
Carv. ic. t. 34.

α. In vineis nostris copiosissime, β. in pratis. Iul.

Aug. ☉ *Variat etiam umbella 4 — 5-fida.*

**** Umbella quinquefida.**

509. *E. dulcis*, umbella quinquefida bifida, involucellis subovatis denticulatis, foliis lanceolatis obtusis apice denticulatis, nectariis integris, capsulis verrucosis pilosis. *Willd. Esula foliis equa Riv. t. 242.*

In umbrosis ad Dieskau, Liebenau. Iul. 24

Radix *tuberosa*; involucrum *pentaphyllum foliis simile*; nectaria *atropurpurea*. Quam *Buxb. 321. p. Brehnam invenit, huc pertinere non videtur, cum Thymalo suo non acris petala (nectaria) lunata adiudicet, quae in nostra integra sunt.*

510. *E. PLATYPHYLLA*, umbella quinquefida trifida dichotoma, involucris serrulatis carina pilosis, foliis serratis lanceolatis apice dilatatis subtus subvillosis, nectariis integris, capsulis verrucosis nudis. *Jacqu. austr. 376.*

In agris cultis ad Rolsdorf et alibi freq. Aest. ☉

Varietas minor et tenuior occurrit, umbella saepe trifida quadrifida, ad Dieskau. E. stricta Engl. bot. 383.

511. *E. HELIOSCOPIA*, umbella quinquefida trifida dichotoma, involucellis obovatis, foliis cuneiformibus serratis, nectariis integris, capsulis glabris. *Curt. n. 12. Schk. t. 129.*

In agris cultis, inter segetes frequens. Aest. ☉

***** Umbella multifida.**

512. *E. ESULA*, umbella multifida bifida, involucellis subcordatis, nectariis bicornibus, ramis sterilibus, foliis uniformibus linearibus. *Esula Riv. t. 238.*

Ad vias et in versuris copiose, Iul. 24

136 CLASSIS VIII. DECANDRIA.

513. E. GERARDIANA, umbella multifida dichotoma, involucellis subrotundis, nectariis integris, foliis lineari-lanceolatis mucronatis, superioribus latioribus. *Ic. nostr.* 3.

In campis sterilibus, ad vias pone Rolsdorf, Langenbogen, Kölme, Erdeborn copiosissime. Iul. 2

514. E. CYPARISSIAS, umbella multifida dichotoma, involucellis subcordatis, ramis sterilibus, foliis setaceis, caulinis lanceolatis, nectariis lunatis. *Engl. bot.* 840.

In campis sterilibus, ad vias fere ubique. Mai. 2

Exemplaria sterilia solent punctis aureis, more Polypodiorum, conspersa esse, quae Aecidium Euphorbiae sunt. Cf. Schk. t. 129. s. t.

515. E. PALUSTRIS, umbella multifida subtrifida bifida, involucellis ovatis, foliis lanceolatis, ramis sterilibus. *Fl. dan.* 866.

In pratis paludosis, auf dem Görz bei Wörmlitz, im Beuchlitzer Holze, in der Preussischen Lucke. Iun. 2

- † 516. E. AMYGDALOIDES, umbella multifida dichotoma, involucellis perfoliatis orbiculatis, nectariis lunatis, capsulis glabris, foliis obtusis cauleque pilosis. *Engl. bot.* 256. *Ic. nostr.* 4.

In nemoribus umbrosis, zwischen Döllnitz und Liebenau rarissimam invenit *Kohlus*. Iun. 2

PENTAGYNIA.

195. SEDUM.

* *Planifolia.*

517. S. TELEPHIUM, foliis ovatis dentatis, corymbo folioso. *Curt. n.* 35. *Engl. bot.* 1319. *Sturm I.* 6.

In agris, ad sepes, in collibus aridis frequens. Aug. 2

518. S. CEPATA, foliis lanceolatis, caule ramoso,

floribus paniculatis, petalis acutis aristatis. *Tabern. II.* 162. *Morif. sect. 12. t. 7. f. 37.*

Ad lacum falsum prope Rolsdorf, ad ripas der Salzke. Iul. ☉

• • *Teretifolia.*

519. *S. RUPESTRE*; foliis subulatis erectis quinque-fariam confertis basi solutis, floribus subcymosis. *Engl. bot.* 170. *Sturm I.* 12.

In collibus aridis, rupibus, in der Heide, ad Giebichenstein, Kröllwitz. Iul. 24

Stamina saepius 12 — 20; folia nunquam reflexa.

520. *S. ALBUM*, foliis oblongis teretibus obtusis patentibus glabris, panicula ramosissima. *Curt. n. 11. Fl. dan.* 66.

In muris limosis ad Kitten, Schwerz, Ostrau. Iul. 24

521. *S. ACRE*, foliis alternis subovatis carnosissimis gibbis adnato-fessilibus, cyma trifida foliolosa. *Curt. n. 4. Engl. bot.* 839. *Schk. t.* 123.

In muris, tectis, collibus aridis vulgatissimum. Iul. 24

522. *S. SEXANGULARE*, foliis subternis teretiusculis obtusis carnosissimis adnato-fessilibus patentibus, cyma trifida foliolosa. *Curt. n.* 37.

In collibus aridis, auf dem Bischofsberge frequens, bei Gutenberg. Iul. 24

196. *Oxalis.*

523. *O. ACETOSELLA*, scapo unifloro, foliis ternatis obcordatis pilosis, radice squamoso-articulata. *Curt. n. 19. Fl. dan.* 980. *Schk. t.* 123.

In nemoribus umbrosis ad arborum radices, ad Lodersleben, Leimbach, Schmon. Apr. 24

524. *O. STRICTA*, caule erecto ramoso, pedunculo umbellifero petiolis breviori, foliis ternatis obcordatis. *Fl. dan.* 873. *Sturm I.* 1.

138 CLASSIS VIII. DECANDRIA.

O. corniculata Leyfs. *Vera* Linn. *habet caule decumbentem radicantem, apud nos non obvia.*

197. AGROSTEMMA.

525. *A. GITHAGO*, hirsuta, calyce corollam superante, petalis integris nudis. *Curt. n. 35. Fl. dan. 576. Hayne u. Dreyes t. 22. Schk. t. 124. Sturm I. 5.*

Inter segetes vulgaris. Iun. Iul. ☉

198. LYCHNIS.

526. *L. FLOS CUCULI*, petalis quadrifidis, capsula subrotunda uniloculari. *Curt. n. 2. Fl. dan. 590. Engl. bot. 573.*

In pratis humidis vulgaris. Iun. Iul. 24

527. *L. VISCARIA*, petalis indivisis, capsula quatuorloculari. *Fl. dan. 1032.*

In pratis sylvaticis et nemoribus frequens, Iul. 2

528. *L. SYLVESTRIS*, calyce decemcostato enervi, petalis subbifidis, capsulae unilocularis apicibus recurvatis, foliis ovato-lanceolatis cauleque hirsutis. *Schk. t. 124. Curt. n. 14. L. dioica flore rubro L.*

In pratis nemorosis frequens. Iun. 24

Flores *rubelli, inodori, plerumque dioici.*

529. *L. PRATENSIS*, calyce decemcostato, femine nervoso, petalis bifidis, capsulae uniloculari apicibus erectis, foliis lanceolatis cauleque molliter pubescentibus. *Schk. t. 124. Fl. dan. 792. L. dioica, flore albo L.*

In sepibus et arvis rarius. Iun. 24

Flores *albi, noctu suaveolentes, plerumque dioici.*

199. CERASTIUM.

530. *C. VULGATUM*, hirsutum caespitosum, foliis ellipticis obtusis, petalis calyci aequalibus, floribus pedunculo longioribus. *Curt. n. 22.*

In hortis, campis herbidis, versuris, ad vias vulgare. Aest. ☉

31. *G. viscosum*, hirsutum viscidum, foliis lanceolato-oblongis, petalis calyce longioribus apice bifidis. *Curt. n. 14. Fl. dan. 1211.*

In arvis humidis vor und hinter der Heide. Maio, Iun. 24

32. *C. semidecandrum*, hirsutum viscidum, petalis calyce brevioribus emarginatis, pedunculis calyce longioribus, floribus pentandris. *Curt. n. 21. Fl. dan. 1212.*

In arvis apricis, hortis et versuris vulgare. Apr. Maio. ☉

33. *C. larvense*, pubescens, foliis lineari-lanceolatis obtusis, petalis bifidis calyce duplo longioribus. *Curt. n. 62. Schk. t. 124. Sturm I. 8. Fl. dan. 626. Engl. bot. 93.*

Ad vias, in versuris ubique. Aestate. 24

34. *C. aquaticum*, pilosum, foliis cordatis sessilibus, pedunculis lateralibus solitariis, fructiferis reflexis, capsulae oblongae ore quinquedentato, dentibus subnullis. *Curt. n. 3. Engl. bot. 538.*

Ad aquas et fossas bei Seeben, Diemitz. Iul. 24

200. SPERGULA.

35. *Sp. arvensis*, pubescens, foliis verticillatis subvicenis, seminibus asperis. *Curt. n. 52. Fl. dan. 1033. Schk. t. 125.*

In arvis et agris, inter segetes copiose. Iun. Iul. ☉

36. *Sp. pentandra*, glabriuscula, foliis verticillatis subdenis, seminibus margine alatis. *Sturm I. 12.*

In campis aridis arenosis vor und hinter der Heide. Apr. Maio. ☉

MONOGYNIA.

202. PRUNUS.

539. PR. PADUS, racemis pendulis, petalis ferratis, foliis deciduis rugulosis duplicato-ferratis petiolis biglandulosis, fructibus globosis. *Fl. dan. 205. Engl. bot. 385. Kerner 4. t. 31.*

In sepibus, dumetis et nemoribus frequens. Maio.

540. PR. CERASUS, ramulis annotinis umbelliferis, foliis ovato-lanceolatis glabris conduplicatis fructibus globosis.

In nemoribus. Maio. † *Varietas occurrit per milia 2-3-pedalis.*

541. PR. AVIUM, ramulis bimis umbelliferis, foliis ovato-oblongis subtus pubescentibus conduplicatis basi biglandulosis, fructibus globosis. *Kern. 4. t. 30.*

In nemoribus. Apr. Maio. †

542. PR. DOMESTICA, pedunculis subfoliariis, foliis ovalibus crenatis, ramis muticis, fructibus ellipticis.

In sepibus, dumetis. Apr. Maio. †

543. PR. INSITICA, pedunculis geminis, foliis lanceolato-ovatis convolutis subtus villosis, ramis spinescentibus, fructibus subrotundis. *Kern. 4. t. 29.*

In sepibus, dumetis rarius. Apr. Maio. †

544. PR. SPINOSA, pedunculis solitariis, foliis lanceolatis glabris, ramis spinescentibus, fructibus subrotundis. *Schk. t. 132. Fl. dan. 966. Engl. bot. 842. Sturm I. 9.*

In sepibus, dumetis, ad margines sylvarum copiose. Apr. †

203. MESPILUS.

545. M. OXYACANTHA, spinosa, foliis obtusis subtrifidis ferratis glabris, floribus corymbois subdi-

PENTA-, POLYGYNIA. 141

PENTA-, POLYGYNIA.

205. SPIRAEA. *Cal. inferus 5-fidus. Cor. 5-petala. Caps. 2-valves polyspermae.*

POLYGYNIA.

* *Cor. 4-petala. Cal. inferus.*

206. TORMENTILLA. *Cal. 8-fidus. Sem. subrotunda nuda rugosa receptaculo exsiccato adfixa.*

** *Cor. 5-petala. Cal. inferus.*

207. ROSA. *Cal. 5-fidus urceolatus, demum baccatus polyspermus.*

208. RUBUS. *Cal. 5-fidus. Bacca supercomposita acinis monospermis.*

209. FRAGARIA. *Cal. 10-fidus. Sem. nuda receptaculo deciduo baccato adfixa.*

210. POTENTILLA. *Cal. 10-fidus. Sem. nuda mutica, receptaculo exsiccato adfixa.*

211. GEUM. *Cal. 10-fidus. Sem. aristata geniculata. Rec. columnare.*

212. COMARUM. *Cal. 10-fidus. Sem. nuda laevia, receptaculo ovato spongioso villoso persistenti adfixa.*

† *Sempervivum tectorum (VIII).*

144 CLASS. IX. ICOSANDRIA.

bus, fructibus basi umbilicatis. *Schk. t. 134.*
Fl. dan. 1101. Kern. 3. t. 23.

In pagis, nemoribus et sylvis, hodie rarius. Maio.
h *Variat stylis 3—5.*

551. *P. TORMINALIS*, foliis simplicibus subcordatis
inaequaliter septemlobis acuminatis serratis gla-
bris, lobis infimis divaricatis, fructibus subro-
tundis. *Kern. 4. t. 25. Fl. dan. 798. Engl.*
bot. 298. Crataegus torminalis L.

In sylvis ad Schmon, Möncherode, Branderode.
Maio. h *Variat stylis 2—3.*

552. *P. AUCUPARIA*, foliis pinnatis, foliolis aequali-
bus serratis glabriusculis, floribus corymbosi-
subtrigynis, fructibus subrotundis. *Gärtner.*
Smith. Engl. bot. 337. Fl. dan. 1034. Ser-
bus aucuparia L. Kern. 3. t. 21.

In nemoribus, ad vias, compita frequens. Maio. h

PENTA-, POLYGYNIA.

205. SPIRAEA.

553. *SP. ARUNCUS*, foliis supradecompositis, spicis
paniculatis, floribus polygamis. *Barba Capri*
I. Bauh. III. 488.

In sylvis montosis rarius, ad Lodersleben, in der
Schleberoder Giehle. Iul. 24

554. *SP. FILIPENDULA*, foliis interrupte pinnatis, fo-
liolis uniformibus serratis glabris, floribus cy-
mosis polygynis. *Fl. dan. 635. Engl. bot. 284.*
Sturm I. 18.

In pratis, pascuis et nemoribus vulgaris. Iul.
Iul. 24

555. *SP. ULMARIA*, foliis interrupte pinnatis subma-
tomentosis, foliolis inaequalibus lobatis, im-
pari tripartito, floribus cymosis polygynis.
Curt. n. 58. Fl. dan. 547. Engl. bot. 960.
Sturm I. 18.

In pratis humidis ad Liebenau, Döllnitz, Kollenbey. Iun. Iul. 24

POLYGYNIA.

206. TORMENTILLA.

556. *T. ERECTA*, caule erectiusculo ramofo, foliis sessilibus. *Curt. n.* 58. *Fl. dan.* 589. *Engl. bot.* 863. *Schk. t.* 136.

In pascuis sterilibus, campis editioribus, versutis vulgaris. Aestate. 24

207. ROSA.

* *Fructibus subglobosis.*

557. *R. LUTEA*, fructibus pedunculisque glabris, calycibus petiolisque spinulosis, aculeis ramorum rectis. *R. Eglanteria Leyfs.*

In sepibus et dumetis ad Passendorf, Schlettau rarior. Iun. 7

Folia *glandulosa odorata*; flores *lutei cimicini odoris.*

558. *R. CINNAMOMEA*, fructibus pedunculisque glabris, aculeis stipularibus, petiolis subinermibus, foliis oblongis basi attenuatis obtusis. *Fl. dan.* 1214.

In sepibus, dumetis et sylvis ad Schmon, Löbenjun, Brehna. Aestate. 7

559. *R. SPINOSISSIMA*, fructibus glabris, pedunculis subaculeatis, aculeis caulinis numerosissimis inaequalibus rectis setaceis, foliolis subrotundis glabris. *Fl. dan.* 398. *Engl. bot.* 187.

In sepibus; et dumetis ad Erdeborn et Lützen. Maio, Iun. 7

560. *R. VILLOSA*, fructibus pedunculisque hispidis, aculeis caulinis rectiusculis, foliolis ellipticis utrinque tomentosis. *Engl. bot.* 583.

In sylvis et dumetis frequens. Iun. 7

146 CLASS. IX. ICOSANDRIA.

Saepe occurrit varietas humilior, aculeis paulo magis aduncis, fructibus basi parumper pro ductis, quam Smithius speciem distinctam: R tomentosam habet. Cf. Sturm I. 18.

* * *Fructibus ovatis.*

561. *R. RUBIGINOSA*, fructibus pedunculisque hispidis, aculeis caulinis aduncis, foliolis ellipticis subtus glanduloso-rubiginosis. *Fl. dan.* 879. *Engl. bot.* 991. *Sturm I.* 18. *Schk. t.* 134.

In collibus dumosis, auf dem Vogelsberge bei Bannstädt, auf den Schmonschen Bergen. Iun. †

562. *R. CANINA*, fructibus pedunculisque glabris, aculeis caulinis aduncis, foliolis ovatis acuminatis glaberrimis. *Curt. n.* 54. *Fl. dan.* 559. *Engl. bot.* 992. *Sturm I.* 18.

In sepibus et dumetis vulgaris. Iun. †

563. *R. ALBA*, fructibus glabris, pedunculis hispide, aculeis caulibus petiolorumque sparsis aduncis, foliolis subrotundis subtus scabris. *Fl. dan.* 1215.

In dumetis ad Wettin. Iun. Iul. †

208. RUBUS.

564. *R. IDAEUS*, foliis quinato-pinnatis ternatisque subtus tomentosis, petiolis canaliculatis, caule aculeato. *Fl. dan.* 788.

In nemoribus montosis. Maio, Iun. †

565. *R. CAESIUS*, foliis ternatis subtus pilosis, lateralibus bilobis, caule aculeato prostrato. *Fl. dan.* 1213. *Engl. bot.* 826. *Schk. t.* 136.

In nemoribus, sepibus et ad margines agrorum. Iun. †

* 566. *R. CORYLIFOLIUS*, foliis subquinatis subtus pilosis, lateralibus sessilibus, aculeis rectiusculis, caule teretiusculo, calycibus fructus inflexis.

Smith. angl. bot. 827. Suenf. bot. 187. Schmid. ic. t. 2.

In sepibus passim. Iul. 5

667. *R. FRUTICOSUS*, foliis subquinatis subtus incano-tomentosis, foliolis petiolatis, aculeis aduncis, caule angulato, calyce reflexo. *Fl. dan. 1163.*

In sepibus et dumetis minus vulgaris. Iul. 5

668. *R. SAXATILIS*, foliis ternatis glabriusculis, flagellis reptantibus herbaceis, panicula pauciflora. *Fl. dan. 134. Kern. 6. t. 42.*

In nemoribus montosis ad Schmon, Lodersleben rarius. Maio, Iun. 24.

209. FRAGARIA.

669. *F. VESCA*, calyce fructus reflexo, villis petiolorum patentissimis pedunculorum erectis, foliis utrinque pubescentibus. *Sturm I. 2. (Schk. t. 135.)*

In pascuis nemorosis, sylvaticis montosis vulgaris. Maio. 24

210. POTENTILLA.

* *Foliis pinnatis.*

670. *P. ANSERINA*, foliis interrupte pinnatis serratis, subtus sericeis, caule repente, pedunculis unifloris. *Curt. n. 34. Fl. dan. 544. Engl. bot. 861. Sturm I. 4.*

In pascuis, ad vias, aggeres fossarum ubique. Aestate. 24

671. *P. RUPESTRIS*, foliis lyrato-pinnatis septenatis quinatis ternatisque, foliolis ovatis serratis pilosis, caule erecto. *Morif. sect. 2. t. 20. f. 1.*

In rupibus umbrosis, der Heide, ad Dölan, dem Mittelholze. Iun. 24

672. *P. SUPINA*, foliis pinnatis, foliolis oblongis profunde dentatis, caule decumbente dichoto-

148 CLASS. IX. ICOSANDRIA.

mo, pedunculis axillaribus solitariis. *Pfützen. almag. t. 106. f. 7.*

In inundatis ad ripas Salae rarius, bei Corbetta Pfützenthal. Jun. Jul. ☉

**** Foliis digitatis.**

573. *P. ARGENTEA*, foliis quinatis cuneiformibus incisifolius subtus tomentosis, caule erecto. *Fl. dan. 865. Engl. bot. 89. Sturm I. 17.*

In ruderalis, ad vias vulgaris. Aestate. 24

574. *P. OPACA*, foliis septenatis quinatisque cuneiformibus inciso-ferratis hirsutis, petalis rotatis calycis longitudine, caulibus decumbentibus filiformibus hirsutis. *Jacqu. ic. rar. I. t. 17. Sturm I. 17.*

In collibus nemorosis, der Heide, Mittelholz et alibi passim. Jun. 24

575. *P. VERRA*, foliis quinatis ternatisque obovatis dentatis pubescentibus, petalis obcordatis calyce maioribus, caulibus declinatis. *Sturm I. 17. Engl. bot. 37.*

In pascuis editioribus et collibus aridis ubique. Apr. Maio. 24

576. *P. ALBA*, foliis quinatis subtus sericeis apice conniventi-ferratis, caule filiformi procumbente, receptaculis hirsutissimis. *Engl. bot. 1384. Sturm I. 4.*

In montosis, auf dem Tannenberge bei Gutenberg, in der Heide copiose. Jun. 24

577. *P. REPTANS*, foliis quinatis obovatis serratis, caule repente, pedunculis unifloris. *Curt. n. 5. Fl. dan. 1164. Engl. bot. 862. Schk. t. 136.*

In versuris, campis herbidis, ad vias vulgaris. Aestate. 24

211. COMARUM.

578. *C. FRAGARIOIDES*, caule decumbente, foliis ter-

natis. *Roth. fl. germ. II. p. 577. Eragria sterilis L. Curt. n. 29.*

In collibus sterilibus sylvaticis, im Lufpholze bei Schochwitz. Maio. 24

† 579. C. PALUSTRE, caule erecto, foliis pinnatis. *Fl. dan. 636. Engl. bot. 172. Schk. t. 138.*

In pratis uliginosis ad Zöckeritz bei Bitterfeld, im Mittelholze bei Schkeuditz; sed ipse nondum inveni. Iun. 5

212. GEUM.

580. G. URBANUM, foliis ternatis, stipulis rotundatis incisis, floribus erectis, aristis uncinatis nudis. *Curt. n. 19. Fl. dan. 672. Engl. bot. 1400. Schk. t. 137. Sturm I. 5.*

In sepibus, dumetis, nemoribus vulgare. Iun. 24

581. G. RIVALE, foliis radicalibus lyratis, stipulis ovatis acutis incisis, floribus nutantibus, aristis plumosis tortis. *Fl. dan. 722. Engl. bot. 106. Sturm I. 8.*

In nemoribus humidis ad Lieskau, Liebenau rarius. Iun. Iul. 24

CLASSIS X.

POLYANDRIA.

(Stamina plusquam 12, receptaculo infidentia.)

MONOGYNIA.

* *Tetrapetali.*

213. PAPAVER. *Cal. 2-phyllus. Caps. unilocularis, sub stigmate radiato poris dehiscens.*

150 CLASS. X. POLYANDRIA.

214. CHELIDONIUM. *Cal.* 2-phyllu
Siliqua unilocularis. *Sem.* cristata.

215. GLAUCIUM. *Cal.* 2-phyllus. *Siliqua* 2-locularis. *Sem.* punctata.

216. ACTAEA. *Cal.* 4-phyllus. *Bacca* 1-locularis. *Sem.* plana.

** *Pentapetali.*

217. HELIANTHEMUM. *Cal.* 5-phyllus, foliolis duobus minoribus. *Capf.* 3-locularis 3-valvis, feminibus dissepimento adfixis. (*Link in Schrad. Journ. I.* 109.)

218. TILIA. *Cal.* 5-partitus deciduus. *Nux* coriacea 1 — 2-sperma.

*** *Polypetali.*

219. NYMPHAEA. *Cal.* petalis male. *Bacca* multiflocularis corticosa.

TRIGYNIA.

220. RESEDA. *Cal.* 4—6-partitus. *Petal.* multifida. *Nectar.* rotundata petal connexa. *Capf.* 1-locularis apice hians

221. ACONITUM. *Cal.* corollinus 4-phyllus, foliolo superiori concavo galeato. *Petal.* 2 superiora ungue longissimo incurvo canaliculato *nectariis* ca

TRIGYNIA. PENTAG. POLYG. 151

caratis terminato, inferiora linearia.
Capsf. 3—5 erectae.

222. DELPHINIUM. *Cal.* corollinus sub-
monophyllus 5-partitus, lacinia supe-
riore calcarata. *Pet.* (in nostra specie)
1 bifidum nectario calcarato termina-
tum. *Capsf.* (in nostra) unica.

PENTAGYNIA.

223. AQUILEGIA. *Cal.* corollinus 5-
phyllus. *Pet.* 5 corniculata, nectariis
carnosis terminata. *Germina* paleis cinc-
ta. *Capsf.* erectae.

224. NIGELLA. *Cal.* o. *Cor.* 5-petala.
Nectar. 8 bilabiata unguiculata sub 3-
fida. *Capsf.* 5 connexae.

POLYGYNIA.

225. THALICTRUM. *Cal.* o. *Pet.* 4—5.
Sem. nuda.

226. CLEMATIS. *Cal.* o. *Pet.* 4—6.
Sem. caudata.

227. ANEMONE. *Cal.* o. *Pet.* 5—9.
Sem. plurima stylum retinentia.

228. CALTHA. *Cal.* o. *Pet.* 5. *Glandu-
lae* nectariferae inter germina. *Capsf.*
plures polyspermae.

152 CLASS. X. POLYANDRIA.

229. TROLLIUS. *Cal.* o. *Pet.* 10—14
Nectar. complanata.

230. RANUNCULUS. *Cal.* 5-phyllus
Pet. 5, unguibus nectariferis. *Sem.*
plurima nuda.

231. ADONIS. *Cal.* 5-phyllus. *Pet.* 5—
10. *Nect.* o. *Sem.* plurima nuda.

† *Lavatera*, *Malva*, *Althaea* (XII)
Sagittaria, *Cera-ophyllum*, *Poterium*, *P.*
nus (XVIII), *Populus*, *Mercurialis*, *H.*
drocharis (XIX).

MONOGYNIA.

213. PAPAVER.

* *Capsulis hispidis.*

582. P. HYBRIDUM, capsulis subglobosis torosis, cau-
le setis appressis foliolo multifloro. *Engl. bot.* 43.

Inter segetes rarius. Iul. ☉

583. P. ARGEMONE, capsulis clavatis, caule setis
erectis folioso multifloro. *Curt. n.* 53. *Fl.*
dan. 867. *Engl. bot.* 643.

Inter segetes ad Schochwitz, Volkmaritz, Deder-
städt. Iul. ☉

** *Capsulis glabris.*

584. P. RHÖAS, capsulis subglobosis, caule setis pe-
tentibus multifloro, foliis pinnatifidis incis-
Curt. n. 36. *Engl. bot.* 645. *Sturm* I. 17.

Inter segetes vulgare. Iun. Iul. ☉

585. P. DUBIUM, capsulis oblongis, caule setis ap-

pressis, foliis bipinnatifidis. *Curt. n. 50. Fl. dan. 902. Engl. bot. 644. Schk. t. 140.*

In segetes minus vulgare. Iun. Iul. ☉

214. CHELIDONIUM.

586. CH. MAIUS. *Fl. dan. 542. Schk. t. 140.*

In ruderalis et hortis ubique. Aestate. 24

215. GLAUCIUM.

587. GL. LUTEUM, caule glabro, foliis caulinis repandis, siliqua tuberculato-scabriuscula. *Curt. n. t. 115. Smith. Engl. bot. 8. Fl. dan. 585. Chelidonium Glaucium L. Wohleb.*

In collibus prope Wallbeck. Aug. ☉

216. ACTAEA.

588. A. SPICATA, racemo ovato. *Fl. dan. 498. Engl. bot. 918.*

In nemoribus montosis, im Lupholze bei Schochwitz, bei Lodersleben. Maio, Iun. 24

217. HELIANTHEMUM.

† 589. H. FUMANA, suffruticosum exstipulatum, foliis confertis sparsisque linearibus margine scabris, pedunculis unifloris. *Jacqu. austr. t. 257. Cistus ericoides Cav. ic. 2. t. 172.*

In collibus aridis prope Kölme invenit 1798 amicissimus Sybel, medicus iam Brandeb., antea eum Knauth. 63. Ipse frustra quaesivi. Iun. 7

690. H. VINEALE, suffruticosum procumbens exstipulatum, foliis petiolatis oblongis obtusis subtus incano-tomentosis, floribus racemosis. *Icon. nostr. 5. Cistus vinealis Willd. C. marifolius Wohl. C. serpyllifolius Roth. nov. act. nat. cur. VII. 201. C. alpestris Crantz stirp. austr. t. 6. f. 1. C. oelandicus Roth. fl. germ. V. 585.*

In collibus calcareis prope Kölme an der Nordwestseite. Iun. 7

591. *H. VULGARE*, suffruticosum procumbens, stipulis lanceolatis, foliis oblongis revolutis subpilis. *Curt. n. 49. Fl. dan. 101. Engl. bot. 1321. Cistus Helianthemum L.*

In pascuis et collibus siccis vulgare. Iun. Iul. 2.

218. TILIA.

592. *T. MICROPHYLLA*, foliis cordato-subrotundis acuminatis argute ferratis, nuce subglobosa vix costata fragili. *Ventenat in ann. of bot. 2. p. 209. T. parvifolia Hofm. Schk. t. 141. T. europaea var. γ. Fl. dan. 553.*

In sylvis montosis ad Lodersleben, Schmon. Iul. 8

593. *T. PLATYPHYLLA*, foliis cordato-subrotundis acuminatis inaequaliter ferratis, nuce turbinate costata lignosa. *T. grandifolia Schk. t. 141. T. europaea var. α. L.*

In sylvis, ad pagos. Iun. praecocius priore flor. 5

219. NYMPHAEA.

594. *N. LUTEA*, foliis cordatis integerrimis, calyce 5-phylo, stigmate integerrimo, seminibus nudis. *Fl. dan. 603. Engl. bot. 159.*

In stagnis prope Passendorf, in der Elster hinter Radewell et alibi copiose. Iun. 24

595. *N. ALBA*, foliis cordatis integerrimis, calyce tetraphyllo, staminibus germini insertis, stigmate lobato, seminibus arillatis. *Schk. t. 142. Fl. dan. 602. Engl. bot. 160.*

In stagnis, auf dem Wege nach Schkopau, rechts von der Steinlache. Iun. Iul. 24

TRIGYNIA.

220. RESEDA.

596. *R. LUTEOLEA*, foliis lanceolatis integris planis, calyce quadrifido. *Engl. bot. 320. Schk. t. 129.*

pressis, foliis bipinnatifidis. *Curt. n. 50. Fl. dan. 902. Engl. bot. 644. Schk. t. 140.*

In segetes minus vulgare. Iun. Iul. ☉

214. CHELIDONIUM.

586. CH. MAIUS. *Fl. dan. 542. Schk. t. 140.*

In ruderatis et hortis ubique. Aestate. 2

215. GLAUCIUM.

587. GL. LUTEUM, caule glabro, foliis caulinis repandis, filiqua tuberculato-scabriuscula. *Curt. n.*

t. 115. Smith. Engl. bot. 8. Fl. dan. 585. Chelidonium Glaucium L. Wohlleb.

In collibus prope Wallbeck. Aug. ☉

216. ACTAEA.

588. A. SPICATA, racemo ovato. *Fl. dan. 498. Engl. bot. 918.*

In nemoribus montosis, im Lupholze bei Schochwitz, bei Lodersleben. Maio, Iun. 2

217. HELIANTHEMUM.

† 589. H. FUMANA, suffruticosum exstipulatum, foliis confertis sparsisque linearibus margine scabris, pedunculis unifloris. *Jacqu. austr. t. 252. Cistus ericoides Cav. ic. 2. t. 172.*

In collibus aridis prope Kölme invenit 1798 amicissimus Sybel, medicus iam Brandeb., antecum Knauth. 63. Ipse frustra quaelivi. Iun. 3

590. H. VINEALE, suffruticosum procumbens exstipulatum, foliis petiolatis oblongis obtusis subtus incano-tomentosis, floribus racemosis. *Icon. nostr. 5. Cistus vinealis Willd. C. marifolius Wohlleb. C. serpyllifolius Roth. nov. act. nat. cur. VII. 201. C. alpestris Crantz stirp. austr. t. 6. f. 1. C. oelandicus Roth. fl. germ. V. 585.*

In collibus calcareis prope Kölme an der Nordwestseite. Iun. 3

156 CLASS. X. POLYANDRIA.

quantibus, foliis ternatis, foliolis tripartitis
subrotundis crenatis. *Fl. dan.* 695. *Engl.*
bot. 297.

In nemoribus, dem Rockenholze, bei Holzselle.
Maio. 4

224. NIGELLA.

602. *N. DAMASCENA*, glabra, floribus involucre foli-
oso cinctis. *I. Bauh.* III. 207.

In agris editioribus ad Wettin. Iun. Iul. ☉

603. *N. SATIVA*, pilosa, floribus nudis, capsulis mu-
ricatis, foliis decompositis, laciniis lineari-lan-
ceolatis obtusiusculis. *I. Bauh. hist.* III. 208.

Inter segetes pallim. Iun. Iul. ☉

604. *N. ARVENSIS*, glabra, floribus nudis, capsulis
turbinateis, foliis decompositis, laciniis lineari-
setaceis. *Schk.* 2. 149.

In arvis et inter segetes abunde. Iul. ☉

P O L Y G Y N I A.

225. THALICTRUM.

605. *Th. MIXTUM*, foliis tripinnatis, foliolis trifidis
glaucis, floribus paniculatis cernuis. *Fl. dan.*
752. *Engl. bot.* 11. *Schk.* 2. 151.

In pratis et colibus herbidis, bei Lettin, Rei-
deburg pallim. 2

† 606. *Th. ANGUSTIFOLIUM*, caule filicato, foliis sub-
bipinnatis, foliolis linearibus integerrimis, sti-
pulis scariosis, panicula ramosa, floribus sub-
natis.

In campo humido pone Döllnitz invenit amic.
Kochius, neque alibi crescit. Vere distincta
species.

607. *Th. FLAVUM*, foliis bipinnatis, foliolis trifidis,
caule erecto, panicula ramulosa corymbata,
floribus erectis. *Fl. dan.* 939. *Engl. bot.* 367.

In pratis ad Döllnitz, Bennstädt, Passendorf
passim. Iul. 24

Huc et nigricans Murr., Jacqu., Hofm.

108. *TH. AQUILEGIFOLIUM*, foliis bipinnatis, foliolis
obtusè trilobis, stipulis ovatis, caule tereti, pa-
nicula subcoarctata, floribus erectis. *I. Bauh.*
hist. III. 487.

In pratis auf der grossen Wiese. Iul. Aug. 24

226. CLEMATIS.

109. *CL. VITALBA*, foliis pinnatis, foliolis cordatis,
petiolis scandentibus. *Curt. n. 41. Engl.*
bot. 612. Schk. t. 151.

In sepibus, praesertim solo calcareo, sed hodie
rarior. Iul. 3

227. ANEMONE.

110. *A. HEPATICA*, flore subcalyculato, nectariis ger-
mina cingentibus, foliis trilobis integerrimis.
Fl. dan. 610. Sturm I. 7.

In nemoribus montosis im Mittelholze, bei Erde-
born etc. Apr. 24

111. *A. PULSATILLA*, scapo involucrato unisero, pe-
talis rectis, nectariis pedicellatis, foliis bipin-
natis incis, seminibus caudatis. *Fl. dan. 153.*
Engl. bot. 51. Sturm I. 7.

In collibus apricis bei Kröllwitz, nach der Hei-
de zu. Apr. 24

112. *A. PRATENSIS*, scapo involucrato unisero villo-
sissimo, petalis apice reflexis, nectariis pedi-
cellatis, foliis bipinnatis incis, seminibus cau-
datis. *Fl. dan. 611. Schk. t. 150.*

In sylvaticis nemorosis, der Heide, bei Guten-
berg. Apr. 24

*A praecedente differt et floris colore nigrican-
te, cum Pulsatilla coeruleo-violacea sit, et flori-*

258 CLASS. X. POLYANDRIA.

*bus semper pendulis, cum Pulf. post anthesin flores
mutantes gerat, et maiore villositate partium.*

613. A. NEMOROSA, scapo involucrato unisfuro, in
volucro triphylo petiolato foliaceo, foliis tri-
fido-dentatis, nectariis nullis, corolla hexape-
tala, seminibus ecaudatis. *Curt. n. 13. Fl.
dan. 649. Engl. bot. 355. Sturm I. 14.*

In nemorosis, dumetis, pascuis editioribus vul-
garis. Apr. 4

614. A. RANUNCULOIDES, scapo involucrato subbisfo-
ro, involucro triphylo petiolato foliaceo, fo-
liis subtrifidis apice dentatis, nectariis nullis
corolla pentapetala, seminibus ecaudatis. *Fl.
dan. 140. Sturm I. 7.*

In nemorosis dumetis vulgaris. Apr. 4

615. A. SYLVESTRIS, scapo involucrato bisfuro, in
volucro triphylo petiolato foliaceo, foliis
subquinquepartitis laciniatis, nectariis nullis
corolla pentapetala obtusa extus villosa, se-
minibus ecaudatis lanatis, stylo persistenti
I. Bauh. hist. III. 411.

In sylvaticis montosis, im Mittelholze und der
Heide. Maio. 4

228. CALTHA.

616. C. PALUSTRIS. *Curt. n. 8. Fl. dan. 660
Engl. bot. 506. Sturm I. 8. Schk. t. 154.*

In pratibus humentibus vulgaris. Maio, Iun. 4

229. TROLLIUS.

617. TR. EUROPAEUS, corollis conniventibus, necta-
riis longitudine staminum. *Fl. dan. 133. Engl.
bot. 28. Schk. t. 153. Sturm I. 5.*

In pratibus subhumidis, ad Seeben et Gutenberg
copiose. Iun. 4

230. RANUNCULUS.

* *Foliis simplicibus.*

578. R. FLAMMULA, foliis ovato-lanceolatis obtusiusculis petiolatis, caule declinato. *Curt. n. 66. Fl. dan. 575. Engl. bot. 387.*

In pascuis udis et fossis frequens. Iul. 24?

Varietas occurrit foliis serratis: R. flammeus *unor Petiv. h. brit. t. 39. f. 6. pone Liebenau.*

19. R. LINGUA, foliis lanceolatis acuminatis, caule erecto multifloro. *Fl. dan. 755. Engl. bot. 100.*

In fossis et paludibus. Iul. Aug. 24

520. R. REPTANS, foliis linearibus, caule repente articulato radicante, pedunculis unifloris. *Fl. dan. 108. Cf. Liljeblad svensk flor. p. 226.*

In locis vadosis, bei Barths Weinberg. Iun. 24

11. R. FICARIA, foliis cordatis angulatis petiolatis, caule unifloro, calyce sub 3-phyllo, petalis numerosis. *Curt. n. 13. Fl. dan. 499. Engl. bot. 584. Sturm I. 11.*

In hortis, dumetis umbrosis vulgarissimus. Apr. 24

* *Foliis dissectis et divisis.*

22. R. AURICOMUS, foliis radicalibus reniformibus tripartitis crenatis, caulinis digitatis linearibus subintegerrimis, caule multifloro, calyce colorato erecto. *Curt. n. 16. Fl. dan. 665. Engl. bot. 624.*

In hortis et pascuis humidis vulgaris. Maio. 24

13. R. SCELERATUS, foliis inferioribus palmatis summis digitatis, lobis foliolisque omnibus obtusis, fructibus oblongis. *Curt. n. 17. Fl. dan. 571.*

In paludibus, fossis, locis inundatis vadosis. Iul. ☉

160 CLASS. X. POLYANDRIA.

624. *R. BULBOSUS*, foliis ternatis trifidis, caule erecto multifloro, pedunculis sulcatis, calyce retroflexo, radice bulbosa. *Curt. n. 7. Fl. dan. 551. Engl. bot. 515.*

In pratis, pascuis, hortis ubique. Maio. 24

- *625. *R. HIRSUTUS*, foliis ternatis, superioribus trifidis linearibus, caule erecto multifloro hirsuto, calycibus acuminatis demum retroflexis, radice fibrosa. *Curt. n. 15. R. philenotis Ehrh. Beitr. 2. p. 145.*

In locis udis rarior, prope Brucke bei Rothenburg. Aestate. ☉ *Huc et R. intermedius, agrarius Poiret encycl. 6. p. 117. et R. pumilus Thuill. parisi. 277.*

626. *R. REPENS*, calycibus patulis hirsutis, pedunculis sulcatis, sarmentis repentibus. *Curt. n. 39. Fl. dan. 795. Engl. bot. 516.*

In cultis et agris ubique. Aest. 24

627. *R. ACIS*, calycibus patulis, pedunculis teretibus, foliis tripartito-multifidis summis linearibus, radice tuberosa. *Curt. n. 4. Engl. bot. 652.*

In pratis et pascuis vulgaris. Iun. Iul. 24

628. *R. POLYANTHEMOS*, calycibus patulis hirsutis, pedunculis sulcatis, foliis semiseptemlobis, laciniis tridentatis acutis, radice fibrosa.

In campis herbidis, auf dem Bischofsberge. Iun. Iul. 24

629. *R. LANUGINOSUS*, calycibus patulis, pedunculis teretibus, caule petiolisque hirsutis, foliis trifidis lobatis crenatis hololericis. *Fl. dan. 397.*

In sylvis montosis ad Ziegelrode et Lodersleben, ad Ebersrode, im Ramfinschen Holze zwischen Zörbig und Bitterfeld. Iul. 24

630. *R. ARVENSIS*, foliis trifido-decompositis, laci-

niis linearibus, feminibus aculeatis. *Curt.* n. 69. *Fl. dan.* 219. *Engl. bot.* 135.

Inter segetes copiose. Aest. ☉

631. *R. AQUATILIS*, foliis submersis capillaceis, emer-
sis subpeltatis. *Engl. bot.* 101. *R. heterophyl-*
lus Wigg., Leyss.

In aquis segnibus, fossis. Aest. 24

Quandoque folia omnia sunt capillacea, laci-
niis divergentibus. *R. aquatilis Wigg., et Leyss.*
Schk. t. 152.

632. *R. FLUVIATILIS*, foliis omnibus dichotomo-ca-
pillaceis, caule dichotomo. *Fl. dan.* 376.

In fluviis, rivulis passim. Aest. 24

231. ADONIS.

633. *A. AESTIVALIS*, petalis sublanceolatis planiuscu-
lis, fructu cylindrico.

Inter segetes ad Mùcheln, Freyburg rarior. Iun.

☉ *Color florum miniato-fulvus.*

634. *A. AUTUMNALIS*, petalis obovatis emarginatis
concavis, fructu ovato. *Curt. n.* 23. *Engl.*
bot. 308.

Inter segetes vulgaris. Aug. ☉

Color florum saturate coccineus aut phoeniceus.
In utraque petala 5-8.

635. *A. VERNALIS*, petalis lanceolatis ad apicem
denticulatis duodenis sexdenis, fructu ovato.
Schk. t. 152.

In collibus apricis, auf dem Vogelsberge bei
Bennstädt, bei Erdeborn, Seeburg, im Rocken-
und Mittelholze. Apr. Maio. 24

Color florum sulfureus.

CLASSIS XI.

DIDYNAMIA.

GYMNOSPERMIA.

* *Calyces sub 5-fidi.*

232. AJUGA. *Cor.* labium superius minimum 2-dentatum.

233. TEUCRIUM. *Cor.* lab. sup. o; eius loco fissura stamina recipiens.

234. HYSSOPUS. *Cor.* lab. inf. 3-lobum, lobo medio emarginato. *Stamina* recta distantia. *Styl.* furcatus stigmatibus obtusiusculis.

235. NEPETA. *Cor.* lab. inf. 3-lobum, lobo medio concavo crenulato, lateralibus subreflexis. *Stam.* approximata.

236. VERBENA. *Cal.* dens unicus truncatus. *Cor.* infundibuliformis, tubo incurvo, limbo subaequali. *Sem.* arilata.

237. MENTHA. *Cor.* subaequalis 4-fida, lacinia latiore emarginata. *Stam.* recta distantia.

238. SIDERITIS. *Cor.* labium superius 2-fidum, inferius 3-partitum. *Stam.*

brevissima. *Stigma* brevius vaginans alterum.

239. GLECHOMA. *Antherae* per paria in crucem conniventes.

240. LAMIUM. *Cal.* dentibus fetaceis. *Cor.* lab. sup. integrum fornicatum, lab. inf. 2-lobum, faux utrinque dentata.

241. GALEOPSIS. *Cal.* dentibus aristatis. *Cor.* lab. sup. subcrenatum fornicatum, lab. inf. supra 2-dentatum. *Antherae* valvula ciliata. *Schk.*

242. BETONICA. *Cal.* dentibus aristatis. *Cor.* labium superius adscendens planiusculum, inferius 3-fidum, tubus cylindricus.

243. STACHYS. *Cor.* lab. sup. fornicatum, inf. lateribus reflexum, lacinula media maiore emarginata. *Stam.* deflorata versus latera reflexa.

244. BALLOTA. *Cal.* hypocrateriformis 10-striatus. *Cor.* lab. superius crenatum concavum.

245. MARRUBIUM. *Cal.* hypocrateriformis rigidus 10-striatus. *Cal.* lab. sup. bifidum lineare rectum.

164 CLASS. XI. DIDYNAMIA.

246. LEONURUS. *Cal.* dentibus aristati pentagonus. *Cor.* labium superius integrum villosum, inferius 3-partitum lacinia media integra.

247. ORIGANUM. *Strobilus* erectus tetragonus calyces colligens. *Cor.* lab. sup. planum erectum, inf. 3-partitum laciniis aequalibus.

** *Calyces 2-labiati.*

248. CLINOPODIUM. *Involucrum* multifetum verticillo subiectum. *Cor.* lab. sup. planum rectum obcordatum.

249. THYMUS. *Calycis* faux villis clausa. *Cor.* lab. sup. planum emarginatum.

250. MELITTIS. *Cal.* tubo corollae amplior. *Cor.* lab. sup. planum, inf. crenatum. *Anth.* cruciatae.

251. SCUTELLARIA. *Cal.* ore subintegro, post anthesin clauso operculato.

252. PRUNELLA. *Filamenta* bifurca, altero apice antherifero. *Stigma* 2-fidum.

ANGIOSPERMIA.

* *Calyces bifidi.*

253. OROBANCHE. *Cal.* 2-phyllus, fo-

liolis 2-partitis. *Cor.* ringens, laciniis subaequalibus. *Glandula* sub basi germinis. *Capsf.* 1-ocularis 2-valvis.

** *Calyces 4-dentati.*

254. LATHRAEA. *Glandula* ad basin germinis. *Capsf.* 1-ocularis, receptaculo fungoso.

255. RHINANTHUS. *Cal.* ventricosus. *Cor.* galea compressa. *Capsf.* 2-ocularis obtusa.

256. MELAMPYRUM. *Cal.* tubulosus. *Cor.* labium superius margine replicato. *Capsf.* 2-ocularis obliqua hinc dehiscent. *Sem.* 2 gibba.

257. EUPHRASIA. *Cal.* cylindricus. *Antherae* spinosae. *Capsf.* 2-ocularis.

*** *Calyces 5-dentati.*

258. LIMOSELLA. *Cor.* campanulata subaequalis. *Capsf.* semi-2-ocularis.

259. SCROFULARIA. *Cor.* resupinata; lab. sup. (inf.) lobulo appendiculato interno. *Capsf.* 2-ocularis.

260. DIGITALIS. *Cor.* campanulata basi ventricosa. *Capsf.* 2-ocularis.

261. LINARIA. *Cor.* personata basi cal-

166 CLASS. XI. DIDYNAMIA.

carata. *Capf.* 2-ocularis apice foraminulis dehiscens. *Jussf.*

262. ANTIRRHINUM. *Cor.* perforata basi gibba. *Capf.* 2-ocularis apice foraminulis dehiscens. *Jussf.*

263. PEDICULARIS. *Cor.* perforata galea compressa. *Capf.* 2-ocularis. *Sem.* arillata mucronata.

GYMNOSPERMIA.

232. AJUGA.

636. A. PYRAMIDALIS, tetragono-pyramidalis villosa, foliis radicalibus maximis. *Engl. bot.* 1270. *Sv. bot.* 225.

Ad margines fylvarum, des Roeken- und Mittelholzes rarior. *Lul. Aug.* 24 *Colore cyaneo floret.*

637. A. GENEVENSIS, foliis caulinis radicalia excedentibus. *Consolida media genevensis. L. Bauh. hist.* III. 432.

In nemoribus nostris vulgaris. *Maio. Jun.* 24 *Colore carneo, interdum et albo floret.*

638. A. REPTANS, stolonibus reptantibus, glabra. *Curt. n.* 14. *Fl. dan.* 925. *Engl. bot.* 489.

In nemorosis humidis, in der Aue, ad Seebeu. *Maio. Jun.* 24 *Colore coerulesco, fauce albida floret.*

639. A. CHAMAEPITYS, caule diffuso, foliis trifidis linearibus integerrimis, floribus axillaribus sessilibus. *Engl. bot.* 77. *Teucrium L.*

In vineis nostris vulgaris. *Aest.* ☉

233. TEUCRIUM.

640. *T. BORRYS*, foliis multifidis, verticillis dimidiatis. *Jua moschata Riv. t. 14.*

In arvis apricis ad Schraplau, Burgscheidungen;
in ipsis rupibus horti botanici. Iul. 24

641. *T. SCORODONIA*, foliis cordatis serratis petiolatis, racemis lateralibus secundis, caule erecto. *Curt. n. 50. Fl. dan. 485.*

In dumetis ad Gutenberg rarius. Iul. 24

642. *T. SCORDIUM*, foliis oblongis sessilibus dentato-serratis, floribus axillaribus geminis pedunculatis, caule diffuso, *Fl. dan. 593. Engl. bot. 828.*

In paludosis ad Benckendorf, Newkirchen et Planena, in der Preussischen Lucke, iam rarior.
Iul. 24

643. *T. CHAMAEDRYA*, foliis subovatis petiolatis inciso-crenatis, floribus axillaribus pedunculatis ternis, caule tereti piloso, *Engl. bot. 680. Riv. t. 10.*

In vineis ad Kölme et Bennstädt frequens. Iul. 24

644. *T. MONTANUM*, foliis lanceolatis integerrimis subtus tomentosis, corymbis terminalibus. *Riv. t. 15. (jat mediocris).*

In vineis ad Kölme, Bennstädt et Lieskau. Iul. Aug. 24

234. HYSSOPUS.

645. *H. OFFICINALIS*, floribus verticillatis racemosis secundis, foliis lineari-lanceolatis subfalcatis. *Riv. t. 68.*

In ruderalis, ad pagos. Iul. 24

235. NEPETA.

646. *N. CATARIA*, incano-tomentosa, floribus spicatis, verticillis subpedicellatis, foliis petiolatis

168 CLASS. XI, DIDYNAMIA.

cordatis dentato-ferratis. *Fl. dan.* 580, *Engl. bot.* 137.

In ruderatis, ad pagos, Iul, 24

236, VERBENA,

647, V. OFFICINALIS, spicis filiformibus paniculatis, foliis multifido-laciniatis, *Curt. n. 5, Fl. dan.* 628. *Hayne u. Drev.* t. 45,

In ruderatis, ad pagos, Iul, 24

237, MENTHA,

* *Spicatae.*

648, M. SYLVESTRIS, spicis villosis subcontinuis, foliis dentato-ferratis ovato-ellipticis supra incanis subtus villosis, bracteis subulatis, calyce undique hirsuto. *Sole t.* 1, 2. *Fl. dan.* 484,

In ruderatis humidiusculis, Aug. Sept, 24 *Hus et M. nemorosa Willd. et gratissima Roth.*

649, M. ROTUNDIFOLIA, spicis subhirsutis interruptis, foliis elliptico-subrotundis rugosis dentatis, supra pubescentibus, subtus villosis, bracteis lanceolatis, calyce undique hirsuto. *Sole t.* 3, *Riv. t.* 51. f. 2. *I. Bauh. hist.* III. 219,

Ad fossas et in paludosis circa Reideburg, Bischofsdorf, Iul, 24

650, M. VIRIDIS, spicis interruptis, foliis sessilibus lanceolatis acutis ferratis nudis, bracteis setaceis ciliatis, pedicellis calycibusque glabriusculis, dentibus calycinis ciliatis. *Sole t.* 5,

In fossis et paludibus, Aug. 24

** *Capitatae.*

651, M. AQUATICA, floribus capitatis verticillatis, foliis petiolatis ovatis ferratis, calyce undique hirsuto, pedicellis retrorsum hispidis. *M. hirsuta Smith. linn. transact.* 5. p. 193. *Engl. bot.* 447. *Sole t.* 10, 11, *Riv.* t. 49, I,

Bauh. hist. III. 222, *M. sativa* Engl. bot. 448.
Fl. dan. 638, sub falso nomine *Origanum vul-*
garis.

In aquosis vulgaris. Aug. 24

*** *Verticillatae*,

652. *M. SATIVA*, foliis ovatis petiolatis inciso-ferratis supra lucidis subtus pubescentibus, caule erecto flexuoso, pedicellis calycibusque glaberrimis, dentibus hirsutis, *M. rubra* Smith: l. c. 205, Engl. bot. 1413. *Sole t.* 24,

In fossis et ad fluviorum margines, Aug. 24

Huc fere *M. verticillata* Wuhl,

653. *M. GENTILIS*, foliis ovatis petiolatis ferratis utrinque subhirsutis, caule ramosissimo patulo, calycibus basi pedicellisque glabris, *Smith*: l. c. 208. *Sole t.* 18, 19, 20,

In aquosis rarius. Aug. 24

654. *M. GRACILIS*, foliis lanceolatis subsessilibus, caule ramosissimo erecto, calycibus basi pedicellisque glabris, *Sole t.* 15, 16, 17, Engl. bot. 449,

In pratis humidis, ad Gutenberg, Nietleben, Aug. 24

655. *M. ARVENSIS*, foliis ovatis, caule ramosissimo, calycibus campanulatis undique hirsutis, pilis patentibus. *Sole t.* 12, 13, 14, *Fl. dan.* 512, *M. gentilis* Schk. t. 158;

In agris subhumentibus post messem fere ubique, Aug. Sept. 24

656. *M. PULEGIUM*, foliis ovatis, caulo prostrato, pedicellis calycibusque tomentosis, dentibus ciliatis, *Sole t.* 23, Engl. bot. 1026,

In pascuis irriguis, aquis vadosis, prope Schkopau, Kollenbey, Brandorf, Canena, Reideburg, Aug. 24

176 CLASS. XI. DIDYNAMIA.

238. SIDERITIS.

- † 657. *S. MONTANA*, herbacea ebracteata, calycibus corolla maioribus spinosis, labio superiori trifido. *Sturm I. 4.*

In nemorosis montosis rarissima, bei Hornburg Ebersrode. Iul. ☉

239. GLECHOMA.

658. *GL. HEDERACEA*, foliis reniformibus crenatis *Curt. n. 24. Fl. dan. 789. Sturm I. 8 Schk. t. 159.*

In hortis, cultis, pratis, ad sepes ubique. Apr. Maio. 24

240. LAMIUM.

659. *L. ALBUM*, foliis cordatis acuminatis serratis petiolatis; petiolis dilatatis, verticillis 20-floris labio superiori obtuso integerrimo. *Curt. n. 20 Sturm I. 8.*

In cultis ubique. Aestate. 24

660. *L. MACULATUM*, foliis cordatis acuminatis serratis petiolatis, iunioribus maculatis, petioli aequalibus, verticillis 10-floris, labio superiori obsole denticulato acuto. *Hayne u. Dreves t. 8.*

In nemorosis ad Lettin rarius. Aestate. 24 *Colm floris purpureus.*

661. *L. PURPUREUM*, foliis cordatis obtusis crenatis petiolatis, superioribus confertis. *Curt. n. 8 Fl. dan. 523.*

In cultis, hortis, ad sepes ubique. Vere. ☉

662. *L. AMPLEXICAULE*, foliis subrotundis obtusis crenatis, floralibus sessilibus amplexicaulibus. *Curt. n. 19. Fl. dan. 752. Schk. t. 159.*

In cultis, agris, pomariis frequens. Vere. ☉

241. GALEOPSIS.

663. *G. LADANUM*, internodiis caulinis aequalibus, foliis lanceolatis subserratis hirtis, corollae galea emarginata. *Engl. bot.* 884. *Schk. t.* 160.

In arvis, maxime post messem abundanter. Aug. ☉

664. *G. GRANDIFLORA*, internodiis caulinis aequalibus, foliis ovato-lanceolatis serratis cauleque villosis, dentibus calycinis breviusculis mucronatis, corollae galea crenato-incisa. *Riv. t.* 24. *f.* 2. *G. Ladanum var. β. Leyss. G. villosa Smith. fl. brit.*

In agris sabulosis rarius. Aug. ☉

665. *G. TETRAHIT*, internodiis superne incrassatis, foliis ovatis acutis serratis cauleque hispidis, corolla calyce duplo longiore, galea rectiuscula. *Engl. bot.* 207.

In arvis, ad sepes frequens. Iul. Aug. ☉

666. *G. CANNABINA*, internodiis superne incrassatis, foliis lato-ovatis serratis cauleque hirtis, corolla calyce triplo longiore, galea ventricosa. *Fl. dan.* 929. *G. versicolor Engl. bot.* 667. *Curt. n.* 70.

In nemorosis, dumetis, sepibus, ad Lettin, Holzweißig, Schenkenberg bei Delitzsch. Aug. ☉

242. BETONICA.

667. *B. OFFICINALIS*, spica interrupta, lacinia hab. inf. emarginata, calycibus glabriusculis. *Curt. n.* 26. *Fl. dan.* 726. *Engl. bot.* 1142. *Schk. t.* 160.

In nemoribus, der Heide, dem Rocken- und Mittelholze frequens. Iul. 24

243. STACHYS.

668. *ST. SYLVATICA*, verticillis sexfloris, foliis cor-

datis petiolatis. *Curt. n. 31. Fl. dan. 1103. Engl. bot. 416.*

In nemoribus umbrosis, der Lucke, ad Seeben, Lettin, Lieskau. 24

669. ST. PALUSTRIS, verticillis sexfloris, foliis linearilanceolatis amplexicaulibus. *Curt. n. 35. Fl. dan. 1103. Sturm I. 18.*

Ad ripas Salae et in rivulis copiose. Iul. 24

670. ST. ANNUA, verticillis sexfloris, foliis ovato-lanceolatis trinerviis laevibus petiolatis, caule erecto. *Riv. t. 70.*

In agris glareosis ad Hohenthurm, Lieskau. Iul. 24
Cor. lab. sup. albidum, inf. flavum.

671. ST. RECTA, verticillis subspicatis, foliis cordato-ellipticis crenatis scabris, caulibus adscendentibus. *Riv. t. 71. Schk. t. 171.*

In collibus, versuris, ad margines sylvarum frequens. Iul. 24 *Flores lutei, labio inf. punctis rubris.*

672. ST. GERMANICA, verticillis multifloris, foliis crenatis cauleque lanatis. *Fl. dan. 684. Engl. bot. 829.*

In ruderalis, sepibus, ad pagos, ad Gutenberg, Crumpa, Branderode. Iul. 24

244. BALLOTA.

673. B. NIGRA, foliis cordatis indivisis ferratis, calycibus acuminatis, bracteis plumosis. *Engl. bot. 46. Fl. dan. 673. Schk. t. 161.*

In ruderalis, sepibus vulgaris. Aestate. 24

245. MARRUBIUM.

674. M. PEREGRINUM, caule stricto ramoso, foliis oblongis obtusis tomentosis rugoso-venosis dentatis. *lc nostra 6. Morif. sect. 11. t. 9. f. 81.*

In ruderalis, ad vias prope Erdeborn. Iul. 24

675. *M. CRETICUM*, caule ramosissimo, ramis subhorizontalibus, foliis lanceolatis utrinque attenuatis fericeo-incanis venosis medio serratis, calycibus omnibus quinquedentatis. *Ic. nostra* 6. *M. album angustifolium minus*. *Rupp.* 232.

In coemeterio Erdebornensi. Iul. Aug. 24.

676. *M. VULGARIS*, calycibus omnibus decedentatis, dentibus uncinatis. *Fl. dan.* 1036. *Engl. bot.* 410.

In ruderatis, ad vias vulgare. Iul. 24.

246. LEONURUS.

677. *L. CARDIACA*, foliis cuneiformi-ovatis trilobis integrisve dentatis, corollis calyce pungente maioribus, lacinia media lab. inf. acuta. *Willd. spec. pl. Fl. dan.* 727. *Engl. bot.* 286. *Sturm* I. 9.

In ruderatis passim. Iul. 24.

678. *L. MARRUBIASTRAUM*, foliis oblongis dentatis, corollis calycem pungentem aequantibus, lacinia media lab. inf. subrotunda. *Willd. spec. pl. Schk.* t. 162.

In collibus apricis ad Schlettau, Erdeborn, Helfta. Iul. 24.

679. *L. GALEOBDOLOM*, foliis subcordatis ovatis dentatis, corollis calyce subpungenti maioribus, lacinia media lab. inf. acuta. *Willd. spec. pl. Galeopsis Galeobdolon L. Leyfs. Galeobdolon luteum Hudf., Smith. Curt.* n. 42. *Hayne u. Dreves* t. 20. *Schk.* t. 157. *Engl. bot.* 787.

In nemoribus umbrosis ad Lettin, Lieskau, Koltenbey. Maio. 24.

247. ORIGANUM.

680. *O. VULGARE*, spicis subrotundis paniculatis conglomeratis glabris, bracteis ovatis calyce lon-

174 CLASS. XI. DIDYNAMIA.

gioribus. *Curt. n. 57. Engl. bot. 1143. Sw. bot. 188. Sturm I. 3.*

In nemorosis montosis frequens. Iul. Aug. 24

248. CLINOPODIUM.

681. CL. VULGARE, verticillis hispidis, bracteis fetaceis, pedicellis ramosis, foliis obtusis crenatis. *Fl. dan. 930. Schk. t. 163. Engl. bot. 1401.*

In ruderalis, dumetis, nemorosis vulgare. Iun. Iul. 24

249. THYMUS.

682. TH. SERPYLLUM, floribus capitatis, caulibus decumbentibus, foliis ovatis obtusis basi ciliatis. *Curt. n. 13. Fl. dan. 1165. Sturm I. 5.*

In collibus apricis, nemoribus abundat. Aestate. 24

Variat foliorum pube et florum colore.

683. TH. ACINOS, verticillis sexfloris, pedunculis simplicibus, caule adscendente ramoso, foliis acutis serratis, calyce basi gibboso. *Curt. n. 11. Engl. bot. 411.*

In rupibus et vineis vulgaris. Aestate. ♂

250. MELITTIS.

684. M. MELISSOPHYLLUM, calyce trilobo, foliis oppositis ovatis dentatis. *Engl. bot. 577. Schk. t. 166.*

In nemoribus umbrosis, im Mittelholze, in der Abauflinie bei Kitten. Iun. 24

251. SCUTELLARIA.

685. SC. GALERICULATA, foliis cordato-lanceolatis crenatis, floribus axillaribus. *Curt. n. 26. Fl. dan. 637. Engl. bot. 523.*

ANGIOSPERMIA. 175

In pratis humidis umbrosis, ad fossas, rivulos prope Passendorf, Seeben etc. Iul. 24

686. *Sc. HASTIFOLIA*, foliis integris, inferioribus hastatis, superioribus sagittatis. *Riv. t. 77.*

Similibus locis rarior. 24

252. PRUNELLA.

687. *Pr. VULGARIS*, calycis labio superiori truncato triaristato, corollis calyce duplo maioribus. *Curt. n. 38. Fl. dan. 910. Engl. bot. 961. Sturm I. 5.*

In pratis, pascuis vulgaris. Aestate. 24

688. *Pr. GRANDIFLORA*, calycis labio superiori trifido, corollis calyce quadruplo maioribus. *Schk. t. 168.*

In collibus herbidis passim. Aestate. 24 *Huc et P. laciniata Leyfs.*

ANGIOSPERMIA.

253. OROBANCHE.

* *Bracteis solitariis.*

689. *O. MAIOR*, caule simplici, calycis foliolis semibifidis, corolla inflata, labii inferioris laciniis acutis aequalibus, staminibus glabris, stylo pubescente. *Curt. n. 39. Engl. bot. 421.*

Parasitica ad Spartium scoparium et Genistam pilosam, in der Heide rarius. Iun. Iul. 24 *Color fuscus.*

* 690. *O. ELATIOR*, caule simplici, calycis foliolis antice basi connatis, corolla tubulosa, labii inferioris laciniis acutis aequalibus, limbo simbriato-crispo, staminibus pubescentibus, stylo glabro. *Engl. bot. 568.*

Ad radices Centaureae Scabiofae im Mittelholze, im Erdebornschen Holze passim. Iul. 24 *Color magis flavescens.*

* 691. *O. CARYOPHYLLACEA*, caule simplici, calycis

176 CLASS. XI. DIDYNAMIA.

foliis bipartitis, corolla tubulosa, labii inferioris lacinia obtusa, limbo fimbriato-crispo, staminibus intus hirsutis, stylo glabriusculo. *Smith. Linn. transact.* 4. p. 169.

In pascuis auf der Peisnitz. Jul. 24

** *Bracteis ternis.*

- *692. *O. COERULEA*, caule simplici, corollae tubulosa lab. sup. bifido inciso, staminibus glabris, stylo pubescente. *Engl. bot.* 423. *O. laevis* Lam. *Schk. t.* 176.

In pascuis editioribus, am süßen See, zwischen Wormsleben und der rothen Hütte, auch in den Weinbergen zwischen Seeburg und Rolsdorf. Jul. 24 (*Huc sine dubio* *Orchis abortiva* *Leyss.*)

693. *O. RAMOSA*, caule ramoso, corollae tubulosae lab. sup. bilobo obtuso, staminibus basi ciliatis, stylo glabriusculo. *Engl. bot.* 184.

Ad Cannabis radices. Aug. ☉

254. LATHRAEA.

694. *L. SQUAMARIA*, caule simplicissimo, floribus pendulis. *Fl. dan.* 136. *Engl. bot.* 50. *Schk. t.* 170.

In nemoribus umbrosis, ad radices Coryli. Am Rande des Erdebornschen Holzes, in dem Petersberger Holze und bei Branderode. Maio. 24

255. RHINANTHUS.

695. *RH. CRISTA GALLI*, galea emarginata bidentata, lab. inf. lacinia media brevissima. *Curt n.* 55. *Fl. dan.* 981. *Engl. bot.* 657. *Schk. t.* 169.

In pascuis, pratis ubique. Aestate. ☉

Variat calyce hirsuto aut villosa; Rh. Alec- rolophus *Wohl.*

256. MELAMPYRUM.

696. *M. CRISTATUM*, spicis quadrangularibus, bracteis

ANGIOSPERMIA.

177

teis coloratis cordatis imbricatis compactis denticulatis. *Engl. bot.* 41. *Fl. dan.* 1104.

In sylvis, nemoribus, in der Heide passim. Iul. ☉

97. *M. arvense*, spicis conicis laxis, bracteis coloratis lanceolatis pinnato-dentatis. *Fl. dan.* 911. *Engl. bot.* 53.

Inter segetes frequentissime. Iun. Iul. ☉

98. *M. nemorosum*, floribus secundis lateralibus, bracteis dentatis cordato-lanceolatis, summis sterilibus coloratis, calycibus lanatis. *Fl. dan.* 305.

In nemoribus frequens, der Heide, im Mittelholze. Iun. Iul. ☉

99. *M. pratense*, floribus secundis lateralibus remotis, foliis lanceolatis, floralibus hastatis, corollis clausis. *Engl. bot.* 113. *Schk. t.* 170.

In nemorosis et dumetis frequens. Iul. ☉

100. *M. sylvaticum*, floribus secundis lateralibus remotis, foliis omnibus lanceolatis, corollis hiantibus. *Fl. dan.* 145. *Engl. bot.* 804. *Sturm I.* 9.

In nemorosis ad Erdeborn, Hornburg, et alibi rarius. Iul. ☉

257. EUPHRASIA.

101. *E. officinalis*, foliis ovatis lineatis dentatis laciniis lab. inf. emarginatis. *Curt. n.* 57. *Engl. bot.* 1416. *Fl. dan.* 1037. *Sturm I.* 3. *Schk. t.* 169.

In pratis et pascuis, versuris, campis herbidis ubique. Aestate. ☉

102. *E. odontites*, foliis lineari-lanceolatis serratis, laciniis lab. inf. integris. *Curt. n.* 11. *Fl. dan.* 625. *Schk. t.* 169. *Bartsia Odontites Engl. bot.* 1415.

In pratis, pascuis et agris ipsius. Iul. Aug. ☉

178 CLASS. XI. DIDYNAMIA.

703. *E. LUTEA*, foliis linearibus ferratis, superioribus integerrimis, laciniis lateralibus lab. inf. denticulatis. *Willd. spec. pl. Riv. t. gr.*
Ad margines vinearum et in collibus aridis, ad Kröllwitz bei der Fähre, bei Kölme copiose, ad Quillschina copiosissime. Aug. ☉

258. LIMOSELLA.

704. *L. AQUATICA*. *Schk. t. 176. Fl. dan. 69, Engl. bot. 357.*

In inundatis bei Bruckdorf, Passendorf am Damme bei der Marxbrücke, hinter Osmünde. Iul. Aug. ☉

Planta acaulis vix uncialis, folia spathulata in petiolum longum decurrentia integerrima, pedunculi radicales uniflori petiolis multo breviores: corolla purpurascens.

259. SCROFULARIA.

705. *SCR. NODOSA*, foliis cordatis ferratis glabris subtrinerviis, caule acutangulo. *Fl. dan. 1167.*

In sepibus et dumetis frequens. Aestate. 24

706. *SC. AQUATICA*, foliis cordatis ferratis decurrentibus, caule alato. *Engl. bot. 854. Fl. dan. 507. Curt. n. 49. (minus bona):*

Ad fossas prope Dieskau, Bruckdorf, Seeben et alibi. Aestate. 24

260. DIGITALIS.

707. *D. AMBIGUA*, calycinis foliolis lanceolatis, gaulea emarginata, foliis subtus pubescentibus. *Schk. t. 174. Sturm I. 11.*

In nemoribus montosis, der Heide, dem Rocken- und Mittelholze. Iun. Iul. 24

261. LINARIA.

708. *L. ELATINE*, foliis hastatis integerrimis alternis, caule procumbente. *Curt. n. 7. Fl. dan. 426. Antirrhinum L.*

In arvis ad Nietleben, Gutenberg, Großskugel rarius. Aestate. ☉

709. *L. SPURIA*, foliis ovato-subrotundis alternis, caule procumbente. *Curt. n. 35. Fl. dan. 913. Antirrhinum L.*

In agris humentibus et aggeribus fossarum, am Waifenhäuser Weinberge. Iul. Aug. ☉ *Utraque flavo colore floret.*

710. *L. ARVENSIS*, foliis linearibus, inferioribus quaternis, calycibus piloso-viscosis, floribus racemosis, calcar recurvo, caule erecto. *Willd. spec. pl. Antirrhinum L.*

In arvis et agris ad Giebichenstein, Dölau. Iul. ☉ *Variat flore caeruleo et luteo.*

711. *L. MINOR*, foliis plerisque alternis lanceolatis obtusis pubescentibus, caule ramosissimo patulo, calycibus calcar longioribus. *Curt. n. 50. Fl. dan. 502. Antirrhinum L.*

In arvis sabulosis, glareosis, vor der Heide. Iul. ☉

712. *L. VULGARIS*, foliis lanceolato-linearibus confertis glabris, caule erecto spicato, calycibus glabris calcar brevioribus. *Curt. n. 5. Fl. dan. 982. Engl. bot. 658. Sturm I. 18. Antirrhinum Linaria L.*

In sepibus, versuris, campis herbidis vulgaris. Aestate. 24

262. ANTIRRHINUM.

713. *A. MAIUS*, floribus spicatis, calycibus obtusis. *Engl. bot. 129.*

In muris pomœriorum. Aestate. 24

714. *A. ORONTIUM*, floribus subspicatis, calycibus digitatis corolla longioribus. *Curt. n. 39.*

In arvis arenosis, bei der Heide et alibi passim. Iul. ☉

180 CLASS. XII. TETRADYNAMIA.

263. PEDICULARIS.

715. *P. PALUSTRIS*, caule ramoso, calyce bilabiato fimbriato crispe calloso-punctato, galea utrinque densata. *Schk. t. 171. Engl. bot. 399.*

In pratis paludosis ad Seeben, Gutenberg, Cemenen. Jun. 24

716. *P. SYLVATICA*, caule subsimplici, calyce inaequaliter 5-dentato glabro, galea utrinque nuda. *Schk. t. 171. Fl. dan. 225. Engl. bot. 400. Sturm I. 13.*

In pratis nemorosis ad Dölau, in der Lucke et alibi. Jun. 24

CLASSIS XII.

TETRADYNAMIA.

SILICULOSAE.

264. *MYAGRUM*. *Silicula* subglobosa dura non dehiscens bilocularis submonosperma stylo coronata.

265. *ISÄTIS*. *Silicula* lanceolata unilocularis monosperma decidua bivalvis, valvis navicularibus.

266. *CORONOPUS*. *Silicula* subglobosa tuberculata bilocularis evalvis dispersa.

267. *ALYSSUM*. *Silicula* ovata marginata bilocularis bivalvis, loculis poly-

spermis, valvis turgidis dissepimento parallelis, stylo coronata.

268. DRABA. *Silicula* ovalis bivalvis polysperma, valvis planis dissepimento parallelis. *Stylus* vix ullus.

269. COCHLEARIA. *Silicula* subintegra turgida polysperma bivalvis, valvis gibbis obtusis.

270. LEPIDIUM. *Silicula* emarginata elliptica polysperma bivalvis, valvis carinatis dissepimento contrariis.

271. THLASPI. *Silicula* emarginata obcordata polysperma, valvis navicularibus marginato-carinatis.

272. IBERIS. *Silicula* emarginata obcordata polysperma. *Petala* duo exteriora maiora.

273. BISCUTELLA. *Silicula* plana rotundata supra infraque biloba stylo coronata. *Calyx* basi gibbus.

SILIQUOSAE.

(Glandulae 2, 4 nectariferae ad germen.)

* *Calyx* clausus.

274. RAPHANUS. *Siliqua* teres torosa subarticulata.

182 CLASS. XII. TETRADYNAMIA.

275. ERYSIMUM. *Siliqua* exacte tetrast-
dra.

276. CHEIRANTHUS. *Siliqua* subangu-
lata apice bidentata. Sem. plana. Cal-
basi gibbus.

277. ARABIS. *Siliqua* teres torulosa,
Glandulae nectariferae 4 squamaefor-
mes reflexae.

278. TURRITIS. *Siliqua* longissima stric-
ta, stigmata bicolli coronata, dissep-
mento valvis parallelo. Cor. erecta.

279. BRASSICA. *Siliqua* compressa ro-
strata. Sem. globosa.

** *Calyx* hians.

280. CARDAMINE. *Siliqua* elastice dis-
siliens, valvis revolutis. Cal. subhians.

281. SISYMBRIUM. *Siliqua* dehiscens
valvis rectiusculis. Cal. patulus.

282. SINAPIS. *Siliqua* teretiuscula ro-
strata. Cal. horizontaliter patens.

SILICULOSAE.

264. MYAGRUM.

317. M. PRANNE, siliculis biarticulatis, foliis in-
ferioribus runcinatis sinuatis denticulatis, sum-
mis linearibus.

In vineis, campis aridis et ad vias prope Kölme, Rolsdorf, Erdeborn, Helfta, Bibra. Iun. Iul. 24

718. *M. PANICULATUM*, siliculis globosis reticulato-rugosis, foliis sagittatis amplexicaulibus subdentatis. *Fl. dan.* 204. *Schk.* t. 178.

Inter segetes passim. Iul. ☉

265. ISĀTIS.

719. *I. TINCTORIA*, foliis radicalibus lanceolatis ornatis, caulinis sagittatis. *Engl. bot.* 97. *Schk.* t. 188.

In collibus aridis et versuris im Freyburg'schen passim. Iun. ☉

266. CORONOPUS.

720. *C. RUELLII*. *Gärtn.* t. 142. *Cochlearia Coronopus* L. *Fl. dan.* 202. *Schk.* t. 181.

In ruderatis et agris passim. Aestate. ☉

Caulis prostratus ramosus. Folia alterna pinatifida, laciniis subdentatis. Corymbi oppositifolii pauciflori. Flores exigui albi.

267. ALYSSUM.

721. *A. SATIVUM*, caule herbaceo, foliis lanceolatis sagittatis, filamentis edentulis. *Myagrum sativum* L. *Fl. dan.* 1038. *Engl. bot.* 1254. *Sturm* I. 4.

Inter segetes frequens. Iun. Iul. ☉

22. *A. INCANUM*, caule herbaceo, foliis lanceolatis incanis integerrimis, floribus corymbosis, petalis bifidis calyce duplo longioribus, filamentis brevioribus basi appendiculatis. *Schk.* t. 181.

In rupibus et collibus aridis frequens. Aest. 24

13. *A. CALYCINUM*, caule herbaceo, foliis spathulatis stellato-pubescentibus, floribus corymbosis, petalis integris calycem subaequantibus,

184 CLASS. XII. TETRADYNAMIA.

filamentis brevioribus basi appendiculatis. *Thlaspi minus quibusdam*. I. Bauh. hist. II. 928.

In campis aridis, montosis, vineis frequens. Aestate. ☉

Calyces *non in hac sola specie. non in hac diu persistentes*; petala *pallide flava*.

724. A. MONTANUM, caulibus herbaceis diffusis, foliis elliptico-lanceolatis stellato-pubescentibus, floribus racemosis, petalis subintegris calycem excedentibus, staminibus longioribus apice fuscatis, brevioribus basi appendiculatis. *Thlaspi montanum luteum* I. Bauh. hist. II. 929.

In collibus aridis ad Giebichenstein, Kröllwitz, Wettin passim. Majo. 4.

725. A. CAMPESTRE, caule herbaceo, foliis oblongis stellato-pubescentibus, floribus racemosis, petalis subintegris calycem paullo excedentibus, staminibus brevioribus utrinque seta stipata, longioribus obovatis. Schk. t. 181.

In collibus aridis apricis ad Giebichenstein, Delau et alibi passim. Iun. 4.

168. DRABA.

726. DR. VERNA, foliis oblongis acutiusculis subserratis, scapo nudo, petalis bifidis. Curt. n. 2. Schk. t. 179. Fl. dan. 983. Engl. bot. 586. Sturm I. 4.

In agris, arvis, collibus ubique. Primo vere. ☉

727. DR. MURALIS, caule ramoso, foliis cordatis dentatis hirtis, petalis integris, siliculis ellipticis obtusis planis. Engl. bot. 912.

In rupestribus am Reichardtischen Garten in Giebichenstein rarius. Maio. ☉

169. COCHLEARIA.

728. C. ARMORACIA, foliis radicalibus oblongis cre-

natis, caulinis lanceolatis subincisis. Schk.
t. 181.

In aquosis, ad fossas im Ostrauer Garten, in
Reideburg passim. Iun. Iul. 24.

270. LEPIDIUM.

729. L. RUDEDALE, foliis inferioribus pinnatifidis
dentatis, superioribus linearibus integerrimis,
floribus apetalis diandris. Fl. dan. 184.

In muris limosis ubique. Vere. ☉

271. THLAPSI.

730. THL. ARVENSE, siliculis orbiculatis compressis
laevibus, foliis oblongis dentatis glabris. Curt.
n. 62. Fl. dan. 793.

In hortis, cultis, agris vulgare. Maio, Iun. ☉

731. THL. CAMPESTRIS, siliculis subrotundis glandu-
loso-punctatis, foliis sagittatis subdentatis in-
canis. Curt. n. 51. Fl. dan. 1221. Engl.
bot. 1385.

In campis editioribus et montosis ad Seeben, Gu-
tenberg et Bennstädt. Maio, Iun. ☉

Huc Cochlearia Draba Leyfs. pertinere videtur.

732. THL. PERFOLIATUM, siliculis obcordatis stylo
brevissimo coronatis, foliis caulinis sagittato-
cordatis amplexicaulibus glabris glaucis, caule
ramoso. Bursa pastoria foliis perfoliatae. L.
Bauh. hist. II, 938.

In agris editioribus, solo calcareo, ad Hettstädt,
Querfurt infrequens. Maio. ☉

733. THL. ALPESTRIS, siliculis obovatis gibbis retu-
sis stylo elongato coronatis, foliis caulinis sa-
gittatis integris glabris glaucis, caule simpliciter,
Engl. bot. 81.

In pascuis montosis, solo, cui saxum (das Tod-

386 CLASS. XII. TETRADYNAMIA.

te Liegende) subest, ad Hornburg, Sittichenbach (ad Schmon *Leyf's.*). Iun. 24.

Th. montanum Leyf. dubium; quod im-Baden-dorfer Holze bei Neehausen crescit, ad Thl. pers. foliatum potius pertinet. Alihi non inventum.

734. *THL. BURSA*, filiculis deltoideo-obcordatis, foliis radicalibus lyrato-pinnatifidis. hirsuta, *Curt. n. 9.*

In hortis, cultis, agris ubique; per totum fere annum. ☉

272. IBĒRIS.

735. *I. AMARA* herbacea, foliis lanceolatis acutis, subdentatis, corymbis spicatis. *Engl. bot. 32.*
Inter segetes ad Lützen, Mühlen rarior. Iul. ☉

736. *I. NUDICAULIS*, herbacea, foliis radicalibus lyrato-pinnatifidis, caule centrali nudo simpliciter, lateralibus foliosis, filamentis basi appendiculatis, *Curt. n. 66. Engl. bot. 327. Schk. t. 179. Sturm I. II.*

In agris arenosis, campis editioribus frequens, Maio, Iun. ☉

273. BISCUTELLA.

737. *B. LAEVIGATA*, filiculis cauleque nudo glabris, foliis lanceolatis serratis hirsutiusculis. *Jacqu. austr. t. 339.*

In rupibus ad Kröllwitz, auf dem Schweitzerling bei Wettin, ad versuras agrorum prope Rennstadt et Salzmünde. Iun. Iul. 24

SILIQUOSAE.

274. RAPHANUS.

738. *R. RAPHANISTRUM*, siliquis laevibus rostratis demum unilocularibus, foliis lyratis scabris, *Curt. n. 45. Fl. dan. 678. Engl. bot. 866. Schk. t. 188.*

Inter segetes. Aest. ☉

Siliqua initio bi-, dein unilocularis. Color corollae flavidus, nonnunquam albus aut purpureus.

275. ERYSIMUM.

759. E. OFFICINALE, siliquis appressis, foliis lyrato-runcinatis. *Curt. n. 55. Fl. dan. 560. Sturm I, 5.*

In ruderalis, ad vias ubique. Aest. ☉

740. E. BARBAREA, foliis inferioribus lyratis, superioribus obovatis dentatis. *Engl. bot. 443.*

Ad ripas Salae, in fossis passim. Maio. 24

741. E. ALLIARIA, foliis cordatis dentatis. *Curt. n. 24. Fl. dan. 934.*

In hortis, sepibus, dumetis vulgariss. Aest. ☉

742. E. CHEIRANTHOIDES, foliis lanceolatis obsolete denticulatis, siliquis patulis stylo obtusiusculo terminatis. *Fl. dan. 731, 923. Engl. bot. 942. Schk. t. 183.*

In sepibus, dumetis auf der Peisnitz, in der Lucke, bei Kollenbey copiose. Iul. ☉

743. E. REPANDUM, foliis lanceolatis repando-dentatis, racemis oppositifoliis, siliquis subsessilibus horizontalibus. *Jacqu. austr. t. 22.*

In nemore montoso, dem Badendorfer Holze bei Nechaußen. Iul. ☉

276. CHEIRANTHUS.

744. CH. ERYSIMOIDES, foliis lanceolatis dentatis nudis, caule recto simplicissimo, siliquis tetragonis. *Fl. dan. 229.*

In montosis aridis ad Rothenburg, Wettin, Trebnitz et Alsleben. Iul. ☉

Quomodo differat ab Erysimo hieracifolio, non liquet.

188 CLASS. XII. TETRADYNAMIA.

745. *CH. CHEIRI*, foliis lanceolatis acutis glabris, ramis angulatis, caule fruticoso.

In muris urbis. Maio. 24

277. ARABIS.

746. *A. THALIANA*, foliis lanceolato-oblongis subdentatis pilosis, radicalibus petiolatis, caule stricto ramoso, siliquis adscendentibus. *Curt. n. 13. Fl. dan. 1106. Engl. bot. 901. Schk. t. 185. Sturm I. 11.*

In agris prope Dieskau et Bruckdorf frequens in rupibus ad Kröllwitz et Giebichenstein. Aestate. ☉

278. TURRITIS.

747. *T. GLABRA*, foliis radicalibus dentatis scabris, caulinis integerrimis amplexicaulibus glaberrimis. *Curt. n. 41. Fl. dan. 809.*

In rupibus bei der Papiermühle frequens, in der Heide, dem Mittel- und Rockenholze. Iun. ☉

748. *T. HIRSA*, foliis omnibus cauleque hirsutis. *Jacqu. ic. I. t. 126. Fl. dan. 1040. Engl. bot. 587. Schk. t. 185.*

In nemoribus montosis, dem Lindberge, Zorge etc. passim. Aestate. 24

279. BRASSICA.

749. *BR. ORIENTALIS*, foliis elliptico-cordatis amplexicaulibus glabris, radicalibus obovatis integris, siliquis tetragonis. *Perfoliata siliquesa I. Bauh. hist. II. 855. Br. Turrita Leyss.*

In vineis ad Kölme, agris ad Bennstädt. Aest. ☉

750. *BR. NAPUS*, radice caulescente fusiformi, foliis laevibus, radicalibus lyratis dentatis, caulinis cordato-lanceolatis amplexicaulibus calyce persistentiusculo. *I. Bauh. hist. II. 843.*

Inter segetes. Maio. ☿

280. CARDAMINE.

51. *C. IMPATIENS*, foliis pinnatis, foliolis lanceolatis incisfis, stipulis ciliatis, caule simplici. *Engl. bot.* 80.

In nemoribus humidis ad Liebenau. Iun. ☉
Flores quandoque apetal.

52. *C. HIRSUTA*, foliis pinnatis exstipulatis, foliolis elliptico-subrotundis incisfis petiolatis, caule ramoso. *Fl. dan.* 735. *Engl. bot.* 492. *Curt.* n. 47. *Schk.* t. 187.

In nemoribus humidis ad Liebenau, in der Lucke. Iun. ☉ *Variat floribus tetrandris: caule magis glabro, foliis angustioribus, ubi C. parviflora nonnullis dicitur. Vera autem differt foliis sessilibus, siliquis latioribus. Smith.*

53. *C. PRATENsis*, foliis pinnatis, foliolis radicalibus sublyrato-rotundatis dentatis, caulinis lanceolatis. *Curt.* n. 30. *Fl. dan.* 1039. *Sturm* I. 8.

In pratibus pascuis vulgaris. Maio. 24

54. *C. ANTHRACIN*, foliis pinnatis, foliolis inferioribus superioribus elliptico-oblongis repandis dentatis, caule basi radicante. *Curt.* n. 30. *Engl. bot.* 1000.

In nemoribus humidis auf der Rabeninsel bei Bülberg, auf dem Tafelwerder bei Lettin. Maio. 24

281. SISYMBRIUM.

- * *Siliquis declinatis brevibus.*

55. *S. NASTURTII*, foliis pinnatis, foliolis cordato-subrotundis dentato-repandis glabris, caule basi radicante. *Curt.* n. 61. *Fl. dan.* 690. *Engl. bot.* 855.

Ad scaturigines, rivulos puriores prope Schlettau, Bülberg, Seeben, copiosissime zwischen Raupisch und Benndorf auf dem Wege von Bitterfeld nach Delitzsch. Aestate. 24

190 CLASS. XII. TETRADYNAMIA.

756. *S. sylvestris*, foliis pinnatis, foliolis elliptico-lanceolatis inciso serratis. *Curt. n. 26.*

In palustribus et ad ripas fluviorum, bei Passendorf, Liebenau. Aestate. ☉

757. *S. terrestris*, foliis pinnatifidis inaequaliter dentatis, petalis calyce brevioribus. *Curt. n. 49. Fl. dan. 931. S. amphibium a. et S. palustre Leyss.*

Ad fossarum margines, in inundatis. Aest. ☉

758. *S. amphibium*, foliis oblongis pinnatifidis serratisve, petalis calyce longioribus. *Fl. dan. 984. S. amphibium c. Leyss.*

Ad ripas fluviorum, fossarum margines copiose. Aestate. ☉

** *Siliquis erectis longioribus.*

759. *S. sophia*, foliis decompositis, laciniis sublinearibus glaucis pilosis, petalis calyce brevioribus. *Fl. dan. 528. Engl. bot. 963.*

In ruderatis, pagis, muris limosis vulgarissimum. Aestate. ☉

760. *S. Löselii*, foliis runcinatis acutis hirtis, caule retrorsum hispido. *Jacqu. austr. 324.*

In arce desolata Giebichenstein, auf dem Peterberge, ad Seeburg. Iun. ☉

761. *S. laro*, foliis runcinatis dentatis nudis, summis sagittato-lanceolatis. *Curt. n. 55.*

In cultis prope Eisleben, Wimmelburg. Iun. ☉

282. SINĀPIS.

762. *S. arvensis*, siliquis multangulis toroso-tubulis rostro ancipiti longioribus, foliis ovatis sublyratis. *Curt. n. 54. Fl. dan. 753. Schk. t. 186.*

Inter segetes copiose. Iun. ☉ *A Raphano Raphanistro calyce patentissimo et siliquarum angulis dignoscenda.*

SILICOSAE. 197

763. *S. ALBA*, siliquis hispidis torosis rostro ancipiti brevioribus, foliis pinnatifidis. *Curt. n. 54. Sturm t. 8.*

In agris, inter segetes. Iun. ☉

764. *S. NIGRA*, siliquis glabris tetragonis racemo appressis, foliis ramulorum deflexis, summis linearibus integerrimis glabris. *Engl. bot. 969.*

In agris ad Freyburg, Laucha, Karsdorf. Iun. ☉

CLASSIS XIII.

MONADELPHIA.

PENTANDRIA.

283. *ERODIUM*. Cor. 5-petala regularis. *Nectar. Glandulae* 5 ad basin staminum: *nectarilymata* 5 squamaeformia. *Sem.* 5 arillata aristata, aristis spirali-bus introrsum barbatis.

DECANDRIA.

284. *GERANIUM*. Cor. 5-petala regula-ris. *Nectar. Glandulae* 5 ad basin sta-minum: *nectarilymata*, barba ad ba-sin petalorum. *Sem.* 5 arillata aristata, aristis nudis recurvis.

285. *PORTULACA*. Cal. 2-phyllus. Cor. 1-petala 5-fida. *Pist.* 5. *Capf.* circun-scissa. *Sem.* pedicellata.

290 CLASS. XII. MONADELPHIA.

POLYANDRIA.

Capl. verticillatae 1-spermae.

286. LAVATERA. *Cal.* duplex, exterior monophyllus trifidus.

287. MALVA. *Cal.* duplex, ext. triphyllus.

288. ALTHAEA. *Cal.* duplex, ext. 7-9-fidus.

† *Lythymachia*, *Linum* (V), *Dianthus*, *Oxalis*, *Agrostemma* (VIII), *Spartium*, *Geranium*, *Anthyllis*, *Ononis* (XIV), *Berula*, *Carpinus*, *Xanthium*, *Typha*, *Pinus*, *Bryonia* (XVIII).

PENTANDRIA.

283. ERODIUM.

765. E. CICUTARIUM, pedunculis multifloris, foliis pinnatis, pinnis pinnatifidis incis, corollis calyce maioribus, caule hirsuto prostrato. *Curt.* n. 9. *Schk.* t. 190. b. *Geranium chrysophyllum* Roth.

In agris, hortis, ad vias ubique. Aestate. ☉

• 766. E. PIMPINELLISOLIUM, pedunculis multifloris, foliis pinnatis, pinnis ovatis sessilibus incindentatis, corollis calycem subaequantibus, foliis glabris, caule decumbente piloso. *Willd.* spec. pl. G. cicutarium Fl. dan. 986. *Cavan.* diff. 4. t. 93. f. 1. Roth. fl. germ.

Iisdem cum priori locis, sed paullo praecocius.

DECAENDRIA.

284. GERANIUM.

* *Pedunculis 2-floris.*

767. *G. PHAEUM*, pedunculis paniculatis erectis, calyce subaristato, arillis carinatis basi hispidis apice corrugatis, foliis inferioribus subquinquelobis petiolatis, superioribus trifidis sessilibus. *Fl. dan.* 987. *Engl. bot.* 322.

In pomœriis zwischen dem Galg- und Steinthor. Jun. 24 *Flores atro-sanguinei, luridi.*

768. *G. SYLVATICUM*, pedunculis erectis calycibusque pilosis, foliis subseptemlobis inciso-ferratis nudiusculis, staminibus subulatis. *Engl. bot.* 121.

In nemoribus montosis frequens. Jun. Jul. 24 *Flores purpurei, subinde albi.*

769. *G. PALUSTRE*, pedunculis declinatis caule calycibusque villosissimis, foliis quinquelobis inciso-dentatis fericeo-villosis, staminibus basi dilatatis. *Fl. dan.* 596.

In paludosis umbrosis ad Seeben, copiosissime ad Roitsch et Holzweissig. Jul. 24 *Flores sanguinei.*

770. *G. PRATENSE*, pedunculis erectis, caule calycibusque tomentoso-incanis, foliis subpeltatis multipartitis inciso-ferratis villosis, staminibus deltoideis. *Curt. n.* 43. *Engl. bot.* 404.

In pratis omnibus. Aest. 24 *Flores coerulei.*

771. *G. ROBERTIANUM*, pedunculis paniculatis erectis, foliis ternatis quinatisque trifido-pinnatifidis, petalis calycem decagonum excedentibus, arillis reticulato-rugulosis. *Curt. n.* 10. *Fl. dan.* 694.

In rupibus, nemorosis, ruderalis frequens. Aest. ☉ *Flores purpurascens.*

772. *G. LUCIDUM*, foliis quinquelobis incisissimis rotun-

194 CLASS. XIII. MONADELPHIA.

dati lucidis, calycibus pentagonis transverse corrugatis glabris, arillis striatis. *Fl. dan.* 218. *Engl. bot.* 75.

In rupibus umbrosis im Amtsgarten et alibi ad Giebichenstein et Kröllwitz. Maio. ☉
Flores rubri.

773. *G. MOLLE*, pedunculis solitariis oppositifoliis subdeclinatis, foliis rotundato-reniformibus lobatis crenatis villosis, petalis subbifidis longitudine calycis mutici, arillis glabris corrugatis. *Curt. n.* 24. *Fl. dan.* 679.

In cultis, ruderatis, sepibus, ad vias. Aest. ☉
Flores purpurei.

774. *G. COLUMBINUM*, pedunculis flaccidis foliis triplo longioribus, foliis quinquepartitis, laciniis incisis lanceolatis, petalis emarginatis calyces aristatos excedentibus, arillis glabris. *Fl. dan.* 1222.

In umbrosis, ad sepes rarius. Iun. ☉
Flores rosei.

775. *G. DISSECTUM*, pedunculis folio brevioribus, foliis 5-partitis, lobis trifidis linearibus, petalis emarginatis calycem aristatum aequantibus, arillis villosis. *Curt. n.* 65. *Fl. dan.* 936.

In agris, arvis passim. Aest. ☉ *Flores purpurei.*

776. *G. ROTUNDIFOLIUM*, foliis omnibus mollissime villosis, radicalibus reniformibus 7-lobis, caulinis subrotundis basi truncatis 5-lobis trifidis, petalis integris longitudine calycis aristati, arillis hirsutis. *Engl. bot.* 157. *Cavan. diss.* 4. t. 93. f. 2.

In cultis, agris, arvis, versuris copiose. Aest. ☉
Flores subrosei.

777. *G. FUSTILLUM*, pedunculis oppositifoliis, foliis sub-7-lobis trifidis, floribus subpentandris, petalis emarginatis calycem muticum aequantibus,

DECANDRIA.

195

arillis pubescentibus. *Curt. n. 64. Engl. bot. 385. G. malvaefolium Lam.*

In cultis, agris, arvis frequens. Aest. ☉

Flores coeruleascentes.

**** Pedunculis unifloris.**

778. *G. SANGUINEUM*, foliis quinquepartitis trifidis rotundatis, arillis laevibus apice setosis. *Fl. dan. 1107. Engl. bot. 272.*

In nemorosis humidis, der Heide, bei Gutenberg copiose. Iul. Iul. 24

285. PORTULACA.

779. *P. OLERACEA*, foliis cuneiformibus, floribus sessilibus. *Schk. t. 130.*

In rupibus ad Kröllwitz, bei der Hölty's Bank. Iul. ☉

POLYANDRIA.

286. LAVATERA.

780. *L. THURINGIACA*, herbacea tomentosa, foliis inferioribus angulatis superioribus trilobis, lobo intermedio longiori obtuso, pedunculis axillaribus solitariis. *Jacq. austr. t. 311.*

In nemoribus et dumetis, der Heide, Rocken- und Mittelholze, Gersdorfer wüsten Feldmark hinter Kröllwitz. Iul. Aug. 24

287. MALVA.

781. *M. ROTUNDIFOLIA*, caule prostrato, foliis cordato-orbiculatis 5-lobis, pedunculis fructiferis declinatis. *Curt. n. 27. Engl. bot. 1092. Fl. dan. 721. Schk. t. 192.*

~ In ruderalis, ad vias ubique. Aestate. ☉

782. *M. SYLVESTRIS*, caule erecto, foliis septemlobatis acutis, petiolis pedunculisque pilosis. *Curt. n. 15. Fl. dan. 1223. Engl. bot. 671.*

Ad sepes, vias frequens. Aestate. 24

196 CLASS. XIV: DIADELPHIA.

783. *M. ALCEA*, caule erecto fasciculato.-pilofo, foliis scabriusculis inferioribus angulatis superioribus 5-partitis, calycis ext. tomentosi foliolis oblongis obtusis. *Cavan. diss. 2. t. 17. f. 2.*

Ad margines nemorum montosorum, Lindberg, Mittelholz, Hackenholz. Jul. Aug. 24

784. *M. MOSCHATA*, caule erectiusculo pilofo, foliis radicalibus reniformibus incisis, caulinis 5-partitis pinnato-multifidis, calycis ext. pilosi foliolis lineari-lanceolatis. *Curt. n. 42. Fl. dan. 905.*

In dumetis, auf dem Trothaischen Werder rarius. Jul. Aug. 24 *Folia odore ambrosiaco.*

288. ALTHAEA.

785. *A. OFFICINALIS*, foliis simplicibus tomentosis sub-5-lobis. *Fl. dan. 530. Engl. bot. 147. Schk. t. 192.*

In palustribus, humidis, ad Nierleben, Dieskau, Schkopa. Jul. Aug. 24

CLASSIS XIV.

DIADELPHIA.

HEXANDRIA.

289. *FUMARIA*. *Cal. diphyllus. Cor. ringens tetrapetala basi nectarotheca gibbosa. Filamenta membranacea antheris tribus, superiora postice calcarata nectarifera.*

OCTANDRIA.

290. *POLYGALA*. *Cal. 5-phyllus, folio-*

lis duobus alaeformibus maximis coloratis. *Legumen* obcordatum 2-loculare.

D E C A N D R I A.

* *Stamina monadelpha.*

291. GENISTA. *Cal.* 2-labiatus $\frac{2}{3}$. *Carina* declinata, vexillum reflexum. *Legumen* uniloculare oblongum pilosum turgidum subpolyspermum. (Cf. *Lam. encycl.* 2. p. 616. 624. *Juss. gen. plant.* p. 353. *Schk.* 2. p. 326 — 328.)

292. ANTHYLLIS. *Cal.* ventricosus 5-dentatus persistens. *Legumen* turgidum calyce tectum oligospermum.

293. ONONIS. *Cal.* campanulatus 5-fidus deciduus. *Vexillum* striatum. *Legumen* turgidum oligospermum.

** *Stigma pubescens (nec priorum notæ).*

294. COLUTEA. *Legumen* inflatum supra basin dehiscens.

295. OROBUS. *Cal.* basi ventricosus, dentibus superioribus brevioribus profundioribus. *Stylus* compresso-linearis. (*Habitus tacite consulendus*: petiolus aristatus rectus. *Poiret encycl.* 4. p. 624.)

296. PISUM. *Stylus* supra carinatus. (*Habitus*: stipulae maximae. *Poiret encycl.* 5. p. 455.)

198 CLASS. XIV. DIADELPHIA.

297. LATHYRUS. *Stylus supra planus utrinque villosus.*

298. VICIA. *Stylus sub stigmate barbatus.*

299. ERVUM. *Stigma capitatum undique pubescens (nec priorum notae).*

*** *Legumen biloculare (nec priorum notae).*

300. ASTRAGALUS. *Carina obtusa. Leg. futura inf. introflexa.*

301. OXYTROPIS. *Carina superne mucronata. Leg. futura sup. introflexa. (Decand. Astrag.)*

**** *Legumen submonospermum non dehiscens (nec priorum notae).*

302. TRIFOLIUM. *Legumen calycem aequans oligospermum non dehiscens deciduum. Flores racemosi vel capitati.*

***** *Legumen subarticulatum.*

303. HEDYSARUM. *Lomentum articulis 1-spermis compressis. Carina obtusissima. (In unica nostrate specie lomentum unicum habet articulum.)*

304. CORONILLA. *Lomentum teres rectum. Cal. dentes superiores connati.*

305. ORNITHOPUS. *Lomentum* tere-
tiusculum arcuatum.

306. HIPPOCREPIS. *Lomentum* plano-
membranaceum, altera futura pluries
excisa, curvum.

307. MEDICAGO. *Legumen* spirale com-
presso-membranaceum. *Carina* pistil-
lum elastice reflectens.

***** *Legumen* 1-loculare polysper-
mum (nec priorum notae).

308. LOTUS. *Legumen* farctum. *Alae*
furfum longitudinaliter conniventes.

HEXANDRIA.

289. FUMARIA.

786. *F. BULBOSA*, caule simplici, racemo terminali,
bracteis oblongis integris flore brevioribus, cal-
care corollae incurvo, foliis biternatis ovatis
acutiusculis, radice bulbosa cava. *Fl. dan.*
605. *Sturm* I. 11.

In dumetis et nemoribus umbrosis, auf der Ra-
beninsel, dem Tafelwerder bei Lettin, bei See-
ben, im Zorgs. Apr. 24

787. *F. FABACEA*, caule simplici, racemo terminali,
bracteis subrotundis integris longitudine flo-
rum, calcare corollae recto, foliis biternatis
obtusiusculis, radice tuberosa. *Retz.* scan-
din. *F. intermedia* Schk. t. 194.

In nemoribus montosis in der Heide, ad Lies-
kau, Apr. 24

200. CLASS. XIV. DIADELPHIA.

788. *F. HALLERI*, caule simplici, racemo terminali, bracteis digitatis longitudine florum, calcare corollae subrecurvo, foliis biternatis spathulatis, radice tuberosa. *Fl. dan.* 1224.

In nemoribus umbrosis, in der Heide copiose. Apr. paullo praecocius praecedentibus. 24

789. *F. OFFICINALIS*, caule ramosissimo, foliis bipinnatis, foliolorum laciniis dilatatis, spicis laxis, fructibus globosis monospermis. *Curt. n.* 19. *Fl. dan.* 940. *Engl. bot.* 589. *Sturm I.* 2.

In cultis, hortis ubique. Aestate. ☉

OCTANDRIA.

290. POLYGALA.

790. *P. AMARA*, floribus cristatis racemosis, caulibus erectiusculis, foliis subspathulatis, radicalibus obovatis. *Fl. dan.* 1169.

In pascuis, nemorosis, montosis, der Heide, ad Mûcheln rarius. Iun. 24 Habitus: *Folia amara; caespites densi.*

791. *P. VULGARIS*, floribus cristatis racemosis, caulibus procumbentibus, foliis omnibus lineari-lanceolatis acutiusculis. *Fl. dan.* 516. *Engl. bot.* 76.

In pascuis, nemorosis, montosis vulgaris. Aest. 24
Variat flore albo, coeruleo, carneo.

DECANDRIA.

291. GENISTA.

• *Inermes.*

792. *G. SCOPARIA*, pubescens, foliis ternatis simplicibusque oblongis, floribus axillaribus, ramis angulatis. *Spartium scoparium L. Fl. dan.*

313. *Curt n.* 60. *Haynè u. Drev. t.* 48. *Schk. t.* 195. *Engl. bot.* 1339.

In sylvaticis, der Heide et alibi passim. Iun. 24

193. *G. SAGITTALIS*, pilosa, ramis ancipitibus alatis articulatatis, foliis simplicibus ovali-oblongis, floribus racemoso-spicatis. *I. Bauh. hist. I.* 393.

In sylvaticis ad Niemegek et Zöckeritz bei Bitterfeld, und in der Dessauer Heide. Iun. 24

194. *G. PILOSA*, villosa, foliis simplicibus lanceolatis obtusis complicatis, pedunculis axillaribus brevissimis; caule tuberculato striato procumbente. *Fl. dan.* 1225. *Schk. t.* 195. *Engl. bot.* 208.

In sylvaticis nemorosis, der Heide, ad montem serenum passim. Iun. Iul. 5

195. *G. TINCTORIA*, glabriuscula, foliis simplicibus lanceolatis cuspidatis margine subtusque pubescentibus, ramis teretibus striatis erectis. *Fl. dan.* 526. *Engl. bot.* 44.

In sylvaticis montosis copiose. Iun. Iul. 5

** *Spinosa.*

196. *G. GERMANICA*, pilosa, spinis verrucoso-compositis, ramis floriferis inermibus aphyllis, foliis ovato-lanceolatis petiolatis. *I. Bauh. hist. I.* 399. *Sturm I.* 12.

In sylvaticis montosis passim. Iun. Iul. 5

292. ANTHYLLIS.

197. *A. VULNERARIA*, herbacea, foliis pinnatis inaequalibus, capitulo gemino. *Fl. dan.* 988. *Engl. bot.* 104. *Schk. t.* 196.

In campis apricis sabulosis hinter der Heide et alibi copiose. Iun. Iul. 24

293. ONONIS.

198. *O. SPINOSA*, floribus subgeminatis axillaribus, foliis inferioribus ternatis lanceolatis serratis ramisque spinosis villosis. *Willd. spec. pl. Fl. dan.* 783.

Ad vias, in versuris vulgatissima. Aest. 24

204 CLASS. XIV. DIADELPHIA.

810. *L. PALUSTRIS*, cirrhis polyphyllis, foliolis ensiformi-lanceolatis acuminatis, stipulis ovato-lanceolatis, internodiis membranaceis. *Fl. dan.* 399. *Engl. bot.* 169.

In dumetis humidis, bei Gutenberg, Liebenau, in der Lucke. Aug. 24 *Flores coeruleo-violaceae*.

298. VICIA.

* *Pedunculis elongatis.*

811. *V. PISIFORMIS*, pedunculis multifloris, foliolis ovatis mucronulatis, infimis sessilibus stipulis ovato-lanceolatis semisagittatas dentatas occultantibus. *Cracca flore ochroleuco. Riv.* t. 177.

In nemoribus montosis, auf den Schmonfchen Bergen, ad Erdeborn, bei Hornburg. Iul. 24.

Planta orgyalis, folia maxima, flores ochroleuci.

812. *V. DUMETORUM*, pedunculis multifloris; foliolis ovatis mucronulatis reflexis, stipulis lanceolatis serratis. *Cracca silvatica Riv.* t. 176. *Ic. nostra* 7.

In nemoribus montosis, Zorge, bei Erdeborn, Lodersleben, im Weltsholze bei Hettstädt. Iul. 24.

Flores purpurascences, foliola infima nec sessilia nec stipulas occultantia, ceterum praecedentibus similis.

813. *V. SYLVATICA*, pedunculis multifloris folia excedentibus, foliolis ellipticis, stipulis lunatis serratis. *Fl. dan.* 277. *Engl. bot.* 79.

In nemoribus montosis ad Erdeborn et Lodersleben. Iul. 24 *Flores purpurascences; folia multo minora quam praecedentium.*

814. *V. CASSUBICA*, pedunculis multifloris folio brevioribus, foliolis oblongis lineatis pubescentibus, stipulis semisagittatis lanceolatis integerrimis. *Vic. n. 5. Gerard gallopr.* t. 19. *V. multo minora quam praecedentium.*

296. PISUM.

P. ARVENSE, petiolis tetraphyllis, stipulis crenatis, pedunculis unifloris, *Sturm l. 4.*

Inter segetes aestivas rarius. Aest. ☉

297. LATHYRUS.

* *Pedunculis unifloris.*

5. L. MONANTHOS, pedunculis aristatis, cirrhis polyphyllis, foliolis linearibus mucronatis truncatis. *Willd. sp. pl. Ervum monanthos Leyfs.*

In pratis sylvaticis. Iun. ☉

* *Pedunculis multifloris.*

6. L. TUBEROSUS, cirrhis diphyllis, foliolis oblongis mucronulatis, stipulis lineari-acuminatis, internodiis nudis. *Chamaebalanus leguminosa. l. Bauh. hist. II. 328.*

Inter segetes copiose. Aest. 24 *Flores roseo-coccinei.*

7. L. PRATENSIS, cirrhis diphyllis, foliolis stipulisque lanceolatis acuminatis, internodiis nudis. *Curt. n. 29. Fl. dan. 527. Engl. bot. 670.*

In pratis, sepibus copiose. Aest. 24 *Flores lutei.*

8. L. SYLVESTRIS, cirrhis diphyllis, foliolis ensiformibus acuminatis, stipulis linearibus, internodiis membranaceis. *Curt. n. 64. Fl. dan. 325. Engl. bot. 805.*

In sylvis prope Ebersrode rarius. Iul. 24 *Flores rubentes.*

9. L. LATIFOLIUS, cirrhis diphyllis, foliolis ovali-oblongis mucronulatis, stipulis ovali-lanceolatis subdentatis, internodiis membranaceis. *Engl. bot. 1108.*

In nemoribus subhumidis, ad Döllnitz, Liebenau, im Trothaischen Werder, Iul. 24 *Flores rosei.*

206 CLASS. XIV. DIADELPHIA.

guminibus glabris 4-spermis, foliolis oblongis truncatis. *Willd. sp. pl. Curt. n. 7. Fl. dan. 95. Engl. bot. 1223.*

In agris, arvis, cultis frequens. Aest. ☉

821. *E. hirsutum*, pedunculis multifloris, leguminibus hirsutis 2-spermis, foliolis linearibus obtusis. *Schk. t. 202. Curt. n. 18. Fl. dan. 639. Engl. bot. 970.*

In agris, arvis, cultis frequentissimum. Aest. ☉

300. ASTRAGALUS.

822. *A. Cicera*, caulescens procumbens, foliolis pubescentibus oblongis obtusis, racemis pedunculatis erectis folio longioribus, stipulis lanceolato-linearibus, leguminibus subgloboso-inflatis mucronatis villosis. *Glauz Riv. t. 233.*

In pratis, vineis ad Bennstädt, Erdeborn, Gröbzig. Iul. 24

823. *A. glycyphyllos*, caulescens adscendens, foliolis glabriusculis ovato-ellipticis obtusiusculis, stipulis ovatis subdenticulatis, racemis pedunculatis folio brevioribus, leguminibus subtriquetris arcuatis. *Fl. dan. 1108. Engl. bot. 203.*

In nemoribus ad Dölau, Fienstädt, Rockenholz, ad Brehna passim. Iul. 24

824. *A. hypoglottis*, caulescens procumbens, foliolis oblongis obtusis pubescentibus, spicis ovatis pedunculatis folio longioribus, leguminibus erectis ovatis canaliculatis pilosis apice aduncis. *Willd. Smith. engl. bot. 274. A. arenarius Leyss. Pall. astrag. t. 34. Fl. dan. 614. A. danicus Roth.*

Ad vias, in versuris bei den Weinbergen, hinter Bennstädt, ad Dölau frequens. Iul. 24

825. *A. arenarius*, caulescens prostratus, foliolis linearibus complicatis sericeis, stipulis membr-

viflora Poll., Leyfs. *V. Gerardi* Murr.,
Jacqu.

In nemoribus umbrosis, der Dölauer Heide, dem
Glefienschen und Ramfner Holze copiofe. Iul.
24 *Cirrhä obfoleti.*

315. *V. CRACCA*, pedunculis multifloris folio lon-
gioribus, floribus imbricatis, foliolis lanceola-
tis pubefcentibus, ftipulis femilagittatis. *Engl.*
bot. 1168. *Fl. dan.* 804.

Inter fegetes, in pratis, verfuris, fepibus copio-
fe. Aeft. ☉ *Flores violacei. Variat foliis*
glabriusculis (V. tenuifolia Roth.)

** *Floribus axillaribus fubfeffilibus.*

316. *V. SATIVA*, leguminibus fessilibus subgeminis,
foliolis oblongo-ovatis truncatis mucronatis, ftip-
ulis dentatis maculatis. *Fl. dan.* 522. *Engl.*
bot. 334.

Inter fegetes passim. Aestate. ☉

317. *V. ANGUSTIFOLIA*, leguminibus fessilibus subge-
minis, foliolis imis retusis, superioribus linea-
ribus, ftipulis dentatis, feminibus globosis.
Roth. Schk. t. 201. *V. sativa* β. *L.*

- Inter fegetes, in campis arenosis. Aest. ☉

318. *V. LATHYROIDES*, leguminibus fessilibus solita-
riis, foliolis inferioribus obcordatis, ftipulis in-
tegris, feminibus tuberculatis. *Fl. dan.* 58.
Engl. bot. 30.

In arvis requietis, collibus sylvaticis. Apr.
Maio. ☉

319. *V. SERPUM*, leguminibus pedicellatis subquater-
nis erectis glabris, foliolis ovatis obtusis, ex-
terioribus minoribus. *Fl. dan.* 699.

In pratis, fepibus, nemoribus frequens. Maio. 24

299. *ERVUM.*

320. *E. TETRASPERMUM*, pedunculis subbifloris, le-

208 CLASS. XIV. DIADELPHIA.

tulis dentatis. *Fl. dan.* 934. *Engl. bot.* 1340.
Sturm I. 15.

In pratis, arvis humidis, sepibus copiose. Iul.
♂ *Variat flore aureo et albo.*

- * 830. TR. DENTATUM, leguminibus dispermis rugosis
subrotundis mucronatis, caule erecto teretius-
culo, foliolis lanceolatis acutis argute denticu-
latis, stipulis pinnatifido-dentatis. *Kitab-*
hung. I. t. 42. *Sturm I.* 15.

In pratis ad Passendorf *Christ. Frid. Schrader*
primus, in der Lucke ego. Iul. 24

*** *Floribus capitatis leguminibus tectis.*

- † 831. TR. STRICTUM, capitulis globosis, calycibus
striatis corollam æquantibus, dentibus in-
æqualibus, foliolis lineatis denticulatis, infe-
rioribus obovatis, superioribus lanceolatis, sti-
pulis rhombeis subulatis venosis. *Roth. fl.*
germ. Schreb. in Sturm I. 15.

In collibus apricis ad Kröllwitz. *Roth*, qui ipse
benevole exemplar hic lectum mecum commu-
nicavit.

832. TR. HYBRIDUM, capitulis umbellaribus, caly-
cis dentibus subæqualibus, leguminibus ob-
longis 4-spermis, foliolis ovato-oblongis ferru-
latis, caule ascendente. *Sturm I.* 15.

In pratis subhumidis passum. Iul. 24

833. TR. REPENS, capitulis umbellaribus, calycibus
dentibus inæqualibus, leguminibus oblongis
4-spermis, foliolis emarginato-obcordatis fer-
rulatis, caule repente. *Curt. n.* 33. *Fl.*
dan. 990. *Sturm I.* 15.

In pratis, campis, versuris ubique. Aest. 24

*** *Calycibus villosis; corolla monopetala.*

834. TR. RUBENS, spicis cylindraceo-oblongis, caly-
cis dente infimo longiori, stipulis ensiformi-

bua; folioli lanceolatis ferrulatis, caule erecto.
I. Bauh. hist. II. 375 Sturm I. 15.

In montosis sylvaticis; dem Mittelholze, bei Hornburg, im Langenberg bei Möncherode. Jul. 24

835. TR. PRATENSE, capitulis ovatis subgeminis involucreatis; calycis dente infimo longiori, stipulis aristatis; folioli ovalibus emarginatis integris pictis; caule ascendente. Fl. dan. 989: Sturm I. 15:

In pratis, versuriq, campis ubique. Aest 24

Cultura capitula nuda evadunt; folia magis lanceolata, caulis erectus. (Spanischer Klee.)

836. TR. MEDIUM; spicis laxis subglobosis solitariis, calycis dente infimo longiori; stipulis subulatis, foliolis oblongo-lanceolatis ciliatis; caule ramoso flexuoso. Engl. bot. 190. Sturm I. 15.
Tr. flexuosum Winkl: Tr. alpestre Poll.

In nemorosis montosis; dem Rocken- und Mittelholze. Jul. 24

837. TR. ALPESTRIS, spicis densis subglobosis geminis involucreatis; calycis dente infimo longiori, stipulis vaginantibus setaceis, foliolis lanceolatis lineatis ferrulatis; caule simplici stricto. Sturm I. 15:

In nemorosis montosis; Lindberg, Zorge, Heide; Rocken- und Mittelholz. Jul. 24

838. TR. ANVERSA, spicis villosissimis subcylindraceis, dentibus calycinis aequalibus corolla longioribus; foliolis spathulato-linearibus. Curt. n. 65: Fl. dan. 724: Engl. bot. 945: Sturm I. 16:

In arvis, campis sterilibus abundanter. Aest. ☉

839. TR. SCABRUM, capitulis oblongis axillaribus involucreatis, calycinis dentibus lanceolatis inaequalibus demum recurvis; foliolis obovatis subemarginatis ferrulatis stipulisque rhombo-

216 CLASS. XIV. DIADELPHIA.

subulatis villosis. *Curt.* n. 70. *Engl. bot.* 903. *Sturm* I. 16.

In aridis prope vineam ad Giebachenstein. *Lun.* 24. *Flores albid;* *Calyces rubro striati.*

* 840. *TR. STRIATUM*, capitulis ovatis axillaribus terminalibusque involucratis, calycinis dentibus subulatis inaequalibus rectis, foliolis obovatis subintegerrimis pubescentibus, stipulis ovatis subulatis. *Kitaib. hung. t.* 25. *Fl. dan.* 1171. *Sturm* I. 16.

In campis editioribus hinter Kröllwitz am Schwalbenloche, hinter Liebenau. *Lun.* ☉

**** *Calycibus inflatis ventricos.*

841. *TR. FRAGIFERUM*, capitulis subrotundis longe pedunculatis, calycibus fructiferis membranae reticulato-venosis pubescentibus, caule repente, foliolis obovatis obtusis. *Curt.* n. 16. *Fl. dan.* 1042. *Engl. bot.* 1050. *Sturm* I. 16.

In pratis humidis frequens. *Aug.* 24

***** *Vexillis corollae inflexis.*

842. *TR. MONTANUM*, capitulis subrotundis pedunculatis terminalibus, vexillis subulatis marcescentibus, calycibus nudis, foliolis lanceolatis serrulatis, caule erecto. *Fl. dan.* 1172. *Sturm* I. 15.

In nemoribus montosis, collibus aridis abundanter. *Aest.* 24

843. *TR. AGRARIUM*, spicis ovalibus imbricatis, vexillis deflexis persistentibus, calycinis dentibus inaequalibus glabris, foliolis lanceolatis serrulatis, stipulis lanceolatis erectis glabris, caule erecto. *Fl. dan.* 558. *Sturm* I. 16.

In pratis siccis frequens. *Aest.* ☉ *Flores lutei.*

844. *TR. SPADICEUM*, spicis cylindricis imbricatis, vexillis deflexis persistentibus, calycinis dentibus inaequalibus subpilosis, foliolis infimis obcor-

ovatis, supremis ellipticis ferrulatis, petiolo apice incrassato marginato, stipulis lanceolatis erectis cauleque erecto pubescentibus. *Sturm I. 16.*
In montosis siccis rarius. Aest. ☉ *Flores demum ferruginei.*

* 345. *TR. CAMPESTRIS*, spicis ovatis imbricatis, vexillis deflexis persistentibus, pedunculis folia obovata obtusa aequantibus, stipulis oblique reflexis ciliatis, caule decumbente. *Schreb. Sturm I. 16. Tr. procumbens Fl. dan. 796. Engl. bot. 945. Tr. agnarium Curt. n. 27.*
In agris post messem copiosa ☉

* 346. *TR. PROCUMBENS*, spicis ovatis imbricatis, vexillis deflexis persistentibus, pedunculis folia obovata emarginata excedentibus, calycibus pubescentibus, stipulis ovatis subreflexis glabris, caule prostrato. *Schreb. Sturm I. 16. Curt. n. 52. Tr. minus Smith engl. bot. n. 1256.*

In pratis, campis herbidis. Iun. ☉

* 347. *TR. FILIFORMIS*, spicis capitatis hemisphaericis paucifloris, vexillis deflexis persistentibus, pedunculis folia obcordata denticulata subaequantibus, calycibus glabris; caule procumbente. *Sturm I. 16. Engl. bot. 1257.*

In locis argillosis rarius. Iun. Iul. ☉

303. HEDYSARUM.

* 348. *H. ONOBRACHIS*, caule erecto, foliis pinnatis cuneatis glabris, alis calycem aequantibus, lomentis glabris monospermis aculeato-dentatis. *Willd. sp. pl. Engl. bot. 96.*

In collibus calcareis ad Bennstädt et per totam Mansfeldiam. Maio, Iun. 24

304. CORONILLA.

* 349. *C. VARIA*, herbacea, foliis plurimis lanceolatis glabris. *Riv. t. 219.*

212 CLASS. KIV. DIADELPHIA.

In sepibus, dumetis, nemoribus copiole. Aest. 2.

850. *C. CORONATA*, suffruticosa, foliis novenis ellipticis, internis cauli approximatis, stipulis oppositifoliis lanceolatis. *Colutea scorpioides* I. Bauh. hist. I. 382. *C. montana* Riv. t. 218.

In collibus apricis circa Freyburg, Lauten, Schmon et Vitsenburg. Iul. 5.

305. ORNITHOPUS.

851. *O. PERPUSILLUS*, foliis pinnatis, floribus capitatis bractea suffultis. Curt. n. 64. Engl. bot. 369. Schk. t. 206.

In campis glareosis editioribus. Aest. 6. Variis foliis maioribus, radice tuberculosa.

306. HIPPOCREPIS.

852. *H. COMOSA*, leguminibus pedunculatis confertis arcuatis margine exteriori repandis. Engl. bot. 31. Schk. t. 206.

In collibus apricis ad Bennstädt, Kölme, Erdeborn, Schmon. Maio. 24.

307. MEDICAGO.

853. *M. SATIVA*, pedunculis racemosis, leguminibus laevibus cochleatis, stipulis integerrimis, foliis oblongis dentatis, caule erecto. Moris. sect. II. t. 16. f. 2. Schk. t. 212. a.

In pratis et montosis apricis. Aest. 24.

854. *M. FALCATA*, pedunculis racemosis, leguminibus falcatis pubescentibus, foliolis oblongis apice dentatis, caule decumbente. Fl. dan. 233. Engl. bot. 1016. Schk. t. 212. a.

In versuris, ad vias vulgarissima. Aest. 24.

855. *M. LUPULINA*, spiciis ovatis, leguminibus reniformibus corrugatis monospermis, caule procumbente. Curt. n. 20. Fl. dan. 992. Engl. bot. 971. Schk. t. 212. a.

DECANDRIA.

213

In pratis siccioribus, agris ubique. Aest. ☉

346. *M. MINIMA*, pedunculis multifloris, leguminibus cochleatis pilosis, aculeis subulatis rectis uncinatis, foliis obovatis dentatis. *Fl. dan.* 211. *Schk.* t. 212, a.

In agris glareosis passim. Aest. ☉

308. LOTUS.

347. *L. SILIQUOSUS*, leguminibus solitariis quadrangulo-alatis, caule decumbente, foliis subtus pubescentibus. *Lotus tetragonolobus Riv.* t. 204.

In pratis et versuris ad Nietleben, Seeben copiose. Iun. 24. *Variat locis salsis glabritie partium: L. maritimus L.*

348. *L. CORNICULATUS*, capitulis depressis multifloris, caule decumbente, leguminibus teretibus patulis. *Curt. n.* 18. *Fl. dan.* 991.

α. *L. uliginosus*, caule tereti fistuloso, calycibus recurvis barbatis. *Schk.* t. 211.

β. *L. arvensis*, caule subangulato solido, calycibus erectis pilosis. *Schk.* t. 211.

In pratis et versuris α. humentibus, β. siccioribus. Aestate. 24

CLASSIS XV.

POLYADELPHIA.

309. *HYPERICUM*. *Cal.* 5-partitus. *Pet.* 5. *Stamina* multa in 3 vel 5 phalanges distributa. *Caps.* polysperma.

214 CLASS. XV. POLYADELPHIA.

Trigyna.

859. *H. QUADRANGULARE*, caule quadrangulo herbasceo, foliis pellucido-punctatis, foliolis calycinis lanceolatis. *Curt. n.* 38. *Fl. dan.* 630. *Engl. bot.* 370.

In pratis humidis prope Seeben, Gutenberg, Dieskau, Bruckdorf. Jul. 24

860. *H. PERFORATUM*, caule ancipiti, foliis obtusis pellucido-punctatis, foliolis calycinis lanceolatis. *Curt. n.* 2. *Fl. dan.* 1043. *Engl. bot.* 295. *Sturm I.* 18.

In sepibus, dumetis, campis herbidis copiose. Jul. 24

861. *H. HUMIFUSUM*, floribus subcymosis, caule ancipiti prostrato, foliis ellipticis glabris marginatopunctatis. *Curt. n.* 28. *Fl. dan.* 141. *Engl. bot.* 1226.

In pascuis montosis, am Zorgs, Lindberg, bei Dölau, Lieskau etc. Jul. 24

862. *H. MONTANUM*, calycibus ferrato-glandulosis, caule erecto tereti glabro, foliis ovatis glabris margine atropunctatis. *Fl. dan.* 173. *Engl. bot.* 371.

In sylvaticis montosis, Zorgs, Lindberg, Heide, Rocken- und Mittelholz. Jul. 24

863. *H. HIRsutum*, calycibus ferrato-glandulosis, caule erecto tereti villoso, foliis oblongis pellucido-punctatis subtus pubescentibus. *Curt. n.* 31. *Fl. dan.* 862. *Engl. bot.* 1156.

In nemoribus, der Peisnitz, bei Seeben, im Zorgs etc. Iun. Jul. 24

864. *H. KOHLIANUM*, calycibus ferrato-glandulosis lanceolaris, foliis oblongis obtusiusculis pellucido-punctatis glabris, caule tereti fruticoso-ramoso. *Ic. nostra* 9.

In vineis ad Bennstädt rarius. Jul. 3

Huc forte *H. pulchrum* Tragi I. *Bauh. hist.* III. 383. *Knauth* 161., *Hyp. minus erectum* C. *Bauh. pin.* Buxb. 163., quae vulgo ad *H. pulchrum* L. traducuntur. Differt autem *H. pulchrum* L. (*Curt. n. 2. Fl. dan.* 75.) a nostris: 1. caule simplici herbaceo, 2. fol. cordatis amplexicaulibus, summis subconnatis, subtus aurantiacis. Nec aliae species quadrant. I. *Bauhini* icon congruit quidem cum nostra, nec tamen descriptio; de *Bux.* spinis planta certus sum eandem esse.

CLASSIS XVI.

SYNGENESIA,

AEQUALIS.

* *Semiflosculosi.*

310. LAPSANA. *Rec. nudum. Papp. o.*
Cal. subcalyculatus, squamis interioribus canaliculatis.

311. PRENANTHES. *Rec. nudum. Papp.*
simplex substipitatus. Cal. calyculatus.
Flosculi simplici serie.

312. HIERACEUM. *Rec. nudum. Papp.*
simplex sessilis. Cal. imbricatus ovatus.

313. SONCHUS. *Rec. nudum. Papp. simplex sessilis.*
Cal. subimbricatus ventricosus.

314. CREPIS. *Rec. nudiusculum. Papp.*

216 CLASS. XVI. SYNGENÉSIA.

simplex substipitatus. *Cal.* calyculatus, squamis exterioribus deciduis, demum torulosus.

315. CHONDRIÏLLA. *Rec.* nudum. *Papp.* simplex stipitatus, *Cal.* calyculatus cylindricus. *Sem.* muricata,

316. LACTUCA. *Rec.* nudum. *Papp.* simplex stipitatus, *Cal.* imbricatus cylindricus,

317. LEONTODON. *Rec.* nudum. *Papp.* simplex stipitatus, *Cal.* duplex, squamis laxiusculis,

318. APARGIA. *Rec.* nudum. *Papp.* plumosus sessilis. *Cal.* imbricatus.

319. TRAGOPOGON. *Rec.* nudum. *Papp.* plumosus stipitatus, *Cal.* simplex polyphyllus.

320. SCORZONERA. *Rec.* nudum. *Papp.* plumosus stipitatus, *Cal.* imbricatus, squamis margine scariosis,

321. PICRIS. *Rec.* nudum. *Papp.* plumosus. *Cal.* calyculatus. *Sem.* transversim fulcata.

322. THRINCIA. *Rec.* nudiusculum. *Papp.* duplex, marginalis paleaceus,

centralis plumosus stipitatus, *Cal.* simplex, 8-phyllus angulatus.

323. HYPOCHOERIS. *Rec.* paleaceum. *Papp.* plumosus stipitatus, *Cal.* imbricatus.

324. CICHORIUM. *Rec.* subpaleaceum. *Papp.* paleaceus. *Cal.* calyculatus.

* * Capitati,

325. ONOPORDON. *Rec.* favosum subpaleaceum, *Papp.* simplex scaber sessilis. *Cal.* imbricatus ventricosus, squamis patentibus spinosis,

326. CARDUUS, *Rec.* villoso-fetaceum. *Papp.* simplex. *Cal.* imbricatus ventricosus, squamis spinosis,

327. CNICUS. *Rec.* villoso-fetaceum. *Papp.* plumosus. *Cal.* imbricatus ventricosus, squamis spinosis.

328. ARCTIUM. *Rec.* paleaceum. *Papp.* fetaceo-paleaceus. *Cal.* imbricatus subglobosus, squamis hamulosis.

329. CARLINA. *Rec.* paleaceum. *Papp.* paleaceo-plumosus. *Cal.* imbricatus, squamis exterioribus spinosis, interioribus scariosis coloratis.

418 CLASS. XVI. SYNGENESIA.

330. SERRATULA. *Rec.* paleaceo-villosum. *Papp.* subsetosus scaber. *Cal.* imbricatus subcylindricus inermis.

*** *Discoidei.*

331. CHRYSOCOMA. *Rec.* subpaleaceum. *Papp.* simplex sessilis scaber. *Cal.* imbricatus hemisphaericus. *Stylus* flosculos subaequans.

332. EUPATORIUM. *Rec.* nudum. *Papp.* simplex sessilis. *Cal.* imbricatus oblongus. *Stylus* flosculos excedens.

333. BIDENS. *Rec.* paleaceum. *Papp.* aristatus. *Cal.* simplex calyculatus.

SUPERFLUA.

* *Corollulae radii obsoletae.*

334. ARTEMISIA. *Rec.* nudiusculum. *Papp.* o. *Cal.* imbricatus, squamis rotundatis conniventibus. *Flosculi* radii subulati.

335. GNAPHALIUM. *Rec.* nudum. *Papp.* simplex scaber. *Cal.* imbricatus scariosus, squamis concavis.

336. TANACETUM. *Rec.* nudum. *Papp.* marginatus. *Cal.* imbricatus hemisphaericus. *Cor.* radii subnullae, 3-fidae.

337. CONYZA. *Rec.* nudum. *Papp.* simplex scaber. *Cal.* imbricatus. *Cor.* radii 3-fidae.

** *Corollulae radii ligulatae.*

338. BELLIS. *Rec.* nudum conicum. *Papp.* o. *Cal.* hemisphaericus squamis aequalibus.

339. MATRICARIA. *Rec.* nudum conicum. *Papp.* o. *Cal.* imbricatus squamis margine scariosis.

340. CHRYSANTHEMUM. *Rec.* nudum planiusculum. *Papp.* o. *Cal.* imbricatus, squamis margine scariosis.

341. PYRETHRUM. *Rec.* nudum planiusculum. *Papp.* marginatus. *Cal.* imbricatus, squamis margine scariosis.

342. ARNICA. *Rec.* subvillosum. *Papp.* pilosus scaber. *Stamina* radii castrata.

343. INULA. *Rec.* nudiusculum. *Papp.* pilosus scaber. *Antherae* basi setolae. *Cor.* radii lineares.

344. ERIGERON. *Rec.* nudum. *Papp.* pilosus. *Cor.* radii capillares.

345. SOLIDAGO. *Rec.* nudum. *Papp.*

220 CLASS. XVI. SYNGENESIA.

simplex. *Cal.* imbricatus, squamis conniventibus. *Cor.* radii subsenae remotae.

346. CINERARIA. *Rec.* nudum. *Papp.* simplex. *Cal.* simplex polyphyllus.

347. SENECEO. *Rec.* nudum. *Papp.* simplex. *Cal.* subsimplex calyculatus, squamis apice sphacelatis.

348. ASTER. *Rec.* subpilosum. *Papp.* simplex. *Cal.* imbricatus, squamis infimis patentibus. *Cor.* radii plures.

349. TUSSILAGO. *Rec.* nudum. *Papp.* simplex. *Cal.* squamis membranaceis.

350. ANTHEMIS. *Rec.* paleaceum. *Papp.* submarginatus. *Cal.* imbricatus, squamis margine subscariosis. *Cor.* radii plures.

351. ACHILLEA. *Rec.* paleaceum. *Papp.* o. *Cal.* imbricatus oblongus. *Cor.* radii subquinae.

FRUSTRANEA.

352. CENTAUREA. *Rec.* setosum. *Papp.* subsetosus. *Cal.* imbricatus ventricosus. *Cor.* radii tubulosae.

NECESSARIA.

553. CALENDULA. *Rec. nudum. Papp.*
o. *Sem. marginata inaequalia.*

† *Phytosoma, Solanum, Viola, Jasione, Impatiens (V).*

AEQUALIS.

SEMIFLOSCULOSI.

310. LAPSANA.

55. *L. pusilla*, acaulis, scapo diviso, pedunculis clavatis fistulosis, foliis obovato-oblongis denticulatis. *Willd. sp. pl. Hyoseris minima L. Fl. dan. 201. Engl. bot. 96. Schk. t. 214.*

In arvis arenosis, hinter Kröllwitz, bei Lieskau. Aug. ☉

56. *L. communis*, caulescens ramosa, foliis radicalibus lyratis, caulinis ovatis petiolatis angulato-dentatis. *Curt. n. 10. Fl. dan. 500. Engl. bot. 844.*

In cultis, hortis, ad sepes vulgatissima. Aest. ☉

311. PRENANTHES.

57. *P. muralis*, foliis lyrato-pinnatifidis, lobo terminali quinquangulato, floribus paniculatis. *Curt. n. 52. Schk. t. 218. Fl. dan. 509. Engl. bot. 457.*

In nemoribus umbrosis, im Hackenholze bei Mücheln, in den Schmonschen Bergen. 24

312. HIERACIUM.

* *Scapo unifloro.*

58. *H. Prionoxanthus*, foliis integerrimis ovatis hir-

CLASS XVI. SYNGENESIA.

tis subtus, tomentose, stolonibus repentibus. *Curt. n. 47. Fl. dan. 1110. Engl. bot. 10.*
In collibus apricis; verius fere ubique.

Scapo multifloro.

869. *H. dumum*, scapo sub-4-floro, foliis ellipticis subintegerrimis utraque hispida; subus stolonibus repentibus. *Fl. dan. 1111.*

In sylvis ad Lodenleben, Schmon, Ziegenhul. 2.

870. *H. Anagallis*, scapo unifloro tomentoso; floro, floribus umbellatis, foliis lanceolatis subintegerrimis hispida, stolonibus repentibus. *Fl. dan. 1044.*

In paludibus siccis, montosis sylvaticis passim.

871. *H. pratensis*, scapo racemoso; floribus perianthibus primoribus, foliis oblongis subintegerrimis pubescentibus. *Fl. dan. 1033. Fl. dan. 942.*

In collibus herbidis nemorosis, im Mitteleuropa; bei Aleleban. Jul. 2.

872. *H. montana*, scapo subfolioso; calyce pilosiusculo, floribus corymbofo-paniculatis, pedunculis propriis divaricatis, foliis lanceolatis, acutis integerrimis pilosis. *Walden. pl. Pilosella montana hispida Morif. VII. t. 8. f. 14. Buxb. 260. Ic. nostra.*

In vineis et collibus calcareis ad Rölling, Lerdorf. Jul. 2.

873. *H. cymosum*, scapo subfolioso, calyce piloso, floribus corymbofo-paniculatis, pedunculis propriis glomeratis, foliis oblongo-lanceolatis subintegerrimis hirtis. *Pilosella montana Morif. seq. VII. t. 8. f. 10. Buxb. 260. Ic. nostra 10.*

In sylvaticis, der Heide et alibi passim. Jul. 2.

*** *Caule folioso.*

H. MURORUM, caule simplici piloso, floribus paniculatis, foliis ovatis basi profunde dentatis, *Fl. dan.* 1113.

H. m. pilosissimum, pilis longissimis albidis.

H. m. sylvaticum, ramosius, glabrius, foliis submaculatis.

α. In rupibus auf der Peisnitz, ad Kröllwitz;
β. in collibus herbidis, ad margines nemorum copiose. *Jun.* 24.

H. PALUDOSUM, caule simplici glabro, floribus paniculatis, calycibus hispidis, foliis glabris oblongis basi attenuatis runcinato-dentatis, caulinis amplexicaulibus. *Fl. dan.* 928. *Schk.* t. 221. *Engl. bot.* 1094.

α umbrosis humidis ad Seeben, Gutenberg raria. *Jul.* 24.

H. SABAUDUM, caule simplici calyceque glabrusculo, floribus corymbosis, foliis ovali-lanceolatis inciso-dentatis, caulinis subamplexicaulibus subtus scabris. *Fl. dan.* 872. *Engl. bot.* 349.

α nemorosis, der Heide, dem Petersberger Holzwäldchen. *Aest.* 24.

H. UMBELLATUM, caule simplici calyceque glabro, pedunculis corymbofo-umbellatis rametaceis, foliis linearibus subdentatis. *Curt.* n. 67. *Fl. dan.* 680.

α pascuis editioribus, ad margines sylvarum vulgare. *Aug.* 24. *Variat caule unifloro et ramoso.*

313. SONCHUS.

S. PALUSTRIS, pedunculis calycibusque glanduloso-hispidis subumbellatis, foliis runcinatis basi sagittatis denticulato-spinulosis, radice ramosa. *Curt.* n. 51. *Fl. dan.* 1109. *Engl. bot.* 935.

212 CLASS. XVI. SYNGENESIA.

In pratis humidis subfalsis ad Dieskau, Karsdorf et Reinsdorf. Jul. 2.

879. *S. lanxensis*, pedunculis calycibusque glanduloso-hispidis subumbellatis, foliis runcinatis basi cordatis denticulatis spinulosis, radice repente. *Curt.* n. 16. *Fl. dan.* 606. *Engl. bot.* 674.

In agris humidiusculis, inter segetes. Jul. Aug. 2.

Varia caule subnigrescente, calycibus minus hispidis, foliis minus divisis.

880. *S. strackensis*, pedunculis subtomentosis umbellatis, calycibus glabris, foliis oblongo-lanceolatis amplexicaulibus sinuato-denticulatis. *Curt.* n. 21. *Fl. dan.* 687. *Engl. bot.* 845.

In cultis, hortis, agris ubique. Aest. ☉

Varia foliis pinnatifidis, dentibus rigidioribus, (*S. alper* *Bunb.* 307.) et foliis indivisis.

881. *S. canadensis*, pedunculis hispidis racemosis bracteatis, foliis runcinatis basi sagittatis glabris subtus glaucis, lobo terminali maximo deltoideo acuminato. *Fl. dan.* 182. *S. canadensis* *L. coruleus* *Smith.* *montanus* *Lam.*

In collibus calcareis ad Schmon. Jul. Aug. 2.

514. CREPIS.

882. *Ca. portula*, canescens hirsuta, foliis runcinato-pinnatifidis, summis lanceolatis basi profunde incis. *Engl. bot.* 406.

In pascuis siccis calcareis; ad Gutenberg, Kölm, Rottensburg, Cömmern et Brücke rarior. Jul. ☉ *Folia opium redolent.*

883. *Ca. tectorum*, glabriuscula, foliis radicalibus runcinatis, caulinis linearibus lanceolatis sagittatis, calycibus incano-pubescentibus. *Curt.* n. 55. *Engl. bot.* 1111. *Fl. dan.* 501.

In pascuis editioribus arenosis inter segetes. Jul. ☉

384. *CA. BIENNIS*, aspera, foliis runcinato-pinnatifidis, summis sessilibus, lanceolatis dentatis, carina calycibusque pubescentibus muricatis. *Engl. bot.* 149.

In pratis, pascuis, ruderalis vulgarissima. Aest. ♂

385. *CA. PINNATIFIDA*, glabra, foliis sessilibus lanceolatis pectinato-pinnatifidis apice integerrimis, calycibus pubescentibus. *Willd. sp. pl.*

Inter segetes vor der Heide, ad Diemitz. Iul. ☉

315. CHONDRILLA.

386. *CH. JUNCEA*, foliis radicalibus runcinatis, caulinis linearibus integris. *Schk. t.* 218.

In asperis montosis, zwischen dem Rocken- und Mittelholze copiose. Iul. 24

316. LACTUCA.

387. *L. QUERCINA*, foliis subtus laevibus sagittatis, inferioribus runcinatis denticulatis basi dilatatis superioribus lanceolatis, panicula stricta.

In nemoribus, praesertim ad Seeben, Dölau, Schleberode etc. Iul. ♂?

388. *L. SCARIOLA*, foliis verticalibus carina aculeatis, runcinato-sinuatis denticulatis acutis. *Engl. bot.* 258. *Fl. dan.* 1227.

In aggeribus fossarum, ruderalis copiose. Aest. ☉

389. *L. VIROSA*, foliis horizontalibus oblongo-lanceolatis carina aculeatis denticulatis obtusis hastatis, infimis sinuatis. *Schk. t.* 217.

Ad sepes circa Trebnitz. *Kruse.* ☉

390. *L. SALIGNA*, foliis subverticalibus carina aculeatis, radicalibus lanceolatis pinnatifidis, caulinis linearibus integerrimis sagittatis. *Rupp. jen. t.* 4.

Ad vias et agrorum margines prope Lützen, Trebnitz, an der Salske. Iul. ☉

226 CLASS. XVI. SYNGENESIA.

317. LEONTODON.

891. *L. TARAXACUM*, calyce exteriori reflexo, squamis lineari-lanceolatis, scapo unifloro; foliis runcinatis glabris, laciniis lanceolatis dentatis. *Curt. n. 3. Fl. dan. 574. Engl. bot. 910. Schk. t. 219.*

In cultis, hortis, versuris ubique. Per totum fere annum. 4

892. *L. LIVIDUS*, calyce exteriori erecto appresso, squamis ovatis, foliis lanceolatis sinuato-dentatis glabriusculis. *Willd. sp. pl. Kitw. hung. t. 115. L. palustris Engl. bot. 555. Salinus Roth., Wohl.*

In pratis humidis ad Nietleben. Iun. 24

318. APARGIA.

893. *A. AUTUMNALIS*, scapo ramofo, pedicellis squamosis, foliis lanceolatis pinnatifidis glabriusculis. *Leontodon autumnale L. Engl. bot. 834. Hedypnois autumnalis Smith.*

In pratis, pascuis, versuris vulgatissime. Aug. Sept. 24

894. *A. HISPIDA*, scapo unifloro, foliis runcinatis calycibusque hirtis, pilis subfurcatis. *Fl. dan. 862. Curt. n. 53. Engl. bot. 554. Leontodon hispidum L.*

In pratis, pascuis satis vulgaris. Iul. 24

319. TRAGOPOGON.

895. *TR. PRATENSI*, calycibus corollae radium laequantibus, pedunculo tereti, foliis carinatis integris subundulatis. *Fl. dan. 906.*

In pratis, pascuis vulgaris. Iun. — Aug. ♂ *Radii saepe calyces superat.*

896. *TR. MAIOR*, calycibus corollae radium superantibus, pedunculo superne incrassato, corollae apice rotundatis. *Jacqu. austr. t. 29.*

In pratis ad Rolsdorf rarius. Aug. 3

897. *TR. PORRIFOLIUS*, calycibus corollae radium longe superantibus, pedunculo superne incrassato, corollulis apice truncatis, foliis strictis. *Schk. t. 219. Fl. dan. 797. Engl. bot. 638.*

In pratis nemorosis ad Gutenberg, im Hackenholz bei Branderode. Iun. 3 Flores purpurei.

320. SCORZONERA.

898. *SC. HUMILIS*, caule subnudo subunisfloro, calycinisque squamis lanatis, foliis oblongo-lanceolatis nervosis planis. *L. Bauh. hist. II. 1061.*

In pratis sylvaticis ad Schmon, Farnstädt, in der Heide rarius. Iun. Iul. 2

- * 899. *SC. GLASTIFOLIA*, caule subunisfloro folioso calycibusque glabris, foliis lineari-lanceolatis nervosis planis. *Willd. sp. pl. Sc. graminifolia Roth. Sc. angustifolia altera L. Bauh. hist. II. 1061. Buxb. 298.*

In pratis sylvaticis in der Heide, bei Lieskau. Iul. 2

900. *SC. ROSA*, caule simplici paucifloro, foliis lanceolato-linearibus planis, caulinis carinato-triquetris. *Willd. sp. pl. Sc. purpurea L. f. I. Bauh. hist. II. 1062.*

In nemoribus montosis, dem Rockenholz, der Heide, hinter dem Petersberge, im Ramliner Holze, et alibi passim. Iun. Iul. 2

901. *SC. LACINIATA*, foliis inferioribus pinnatifidis linearibus, calycinis squamis inferioribus patulis mucronatis. *Schk. t. 215.*

In collibus apricis bei der Bergschenke, hinter Bennstädt, bei Nietleben, Trebnitz etc. Aest. 3

321. PICRIS.

902. *P. NIERRACIOIDES*, calyce exteriori polyphylo

228 CLASS. XVI. SYNGENESIA.

abbreviato foliis lanceolatis dentatis amplexi-
caulibus asperis, floribus corymbosis. *Schk.*
t. 216. *Engl. bot.* 196.

In pratis, versuris passim. Iul. 24

P. echioides (*Helminthia* Gärtn.) *semel a me*
inter Medicaginem sativum bei der Bergschenke lec-
ta, advena sine dubio, dein evanuit.

322. THRINCIA.

903. *THA. HIRTA*, scapo unifloro, calyce glabrin-
culo basi squamulis aucto, foliis lanceolatis
sinuato-dentatis. *Apargia hirta Schk.* t. 220.
Leontodon hirtum Curt. n. 66. *Hedypnois*
hirta Engl. bot. 555.

In vineis ad Kölme. Iul. 21 Radii corollulas
subtus virecentes; Pili sparsi foliorum furcati;
Calices ante anthesin penduli.

323. HYPOCHOERIS.

904. *H. MACULATA*, hirsuta, scapo solitario nudius-
culo subsimplici, foliis ovato-oblongis integris
dentatis. *Fl. dan.* 149. *Engl. bot.* 225.

In nemoreis montosis, in der Heide, im Ro-
ckenholze, Hackenholze et alibi infrequens.
Iul. 24

905. *H. GLABRA*, glabriuscula, caule ramoso subnu-
do, foliis dentato-sinuatis sublingulatis. *Schk.*
t. 225. *Curt.* n. 25. *Fl. dan.* 424. *Engl.*
bot. 575.

In campis aridis subarenosis passim. Iul. ☉

906. *H. RADICATA*, foliis runcinatis obtusis scabris,
caulibus ramosis nudis laevibus glaucescenti-
bus, pedunculis squamosis. *Curt.* n. 26. *Fl.*
dan. 150. *Engl. bot.* 831.

In pratis, pascuis humidis passim. Iul. 24

324. CICHORIUM.

907. *C. INTYBUS*, floribus geminis axillaribus, foliis

runcinatus. *Curt. n. 41. Fl. dan. 907. Engl. bot. 539. Sturm I. 6.*

In versuris, pratis, ruderatis fere ubique. Aug. 24

** CAPITATI.

325. ONOPORDON.

908. *O. ACANTHIUM*, foliis decurrentibus tomentosis-lanatis sinuato-dentatis spinosis. *Curt. n. 57. Fl. dan. 909. Engl. bot. 977. Schk. t. 230.*

In ruderatis, pagis, sepibus, ad vias vulgaris. Aest. ♂

326. CARDUUS.

909. *C. MUTANS*, foliis interrupte decurrentibus spinosis, floribus cernuis solitariis, calycis squamis lanceolatis superne patentibus. *Fl. dan. 675. Engl. bot. 1112.*

Ad vias, pagos copiose. Aug. ☉

910. *C. ACANTHOIDES*, foliis decurrentibus sinuato-spinosis subtus tomentosis, calycibus globosis subpedunculatis erectis villosis solitariis, squamis linearibus recurvatis. *Engl. bot. 973. Schk. t. 228. C. polyacanthos Curt. n. 67.*

Ad vias, in ruderatis. Aug. ♂

911. *C. CRISPUS*, foliis decurrentibus oblongis sinuato-spinosis subtus lanatis, calycibus pedunculatis aggregatis, squamis patulis. *Fl. dan. 621. Lüscl. pruss. t. 5.*

In agris, cultis, ad sepes. Aug. 24

912. *C. CYANOIDES*, foliis tenuissime decurrentibus linearibus pinnatifidis margine subrevolutis, subtus tomentosis, caule subbifloro, calycinis squamis mucronatis patentibus. *Gmel. fib. II. t. 15. Ic. nostra II. C. mollis Wöhl.*

In colle herbido zwischen Lettin und der Gersdorfer wüsten Feldmark. Aug. 24

236 CLASS. XVI. SYNGENESIA.

Cum *C. molli* congruit foliorum forma generali, odore sterum moschato, totoque habitu; differt tamen *C. mollis* verus foliis laevioribus margine undulatis, supra nudioribus, nullo modo decurrentibus. In nostra vero decursus foliorum etiam parum animadvertendus. De *C. molli* cf. *Clus. hist. et Jacq. vind.* 276.

913. *C. DESFLORATUS*, foliis semidecurrentibus pinnatifido-ferratis ciliato-spinulosis nudis, radicalibus indivisis, pedunculis unifloris longissimis lanuginosis. *Hall. stirp.* 2. 4.

In nemoribus montosis ad Laderaeben, Ebenrode, Aug. 24

914. *C. MARIANUS*, foliis amplexicaulibus hastato-pinnatifidis laevibus maculatis spinosis, calycibus glabris aphyllis, squamis foliaceis refractis margine aculeatis. *Curt. n.* 25. *Engl. bot.* 976.

In cultis, ruderalia variis, Aug. 3

327. CNICUS.

915. *CN. PALUSTRIS*, foliis decurrentibus nudis lanceolatis dentatis margine spinosis, calycibus racemoso-glomeratis, squamis mucronatis appressis. *Curt. n.* 62. *Engl. bot.* 974.

In pratis humidis frequens, Aug. 3

916. *CN. LANCEOLATUS*, foliis decurrentibus pinnatifidis hispidis, laciniis bilobis divaricatis spinosis, calycibus subsolitariis arachnoideo-pubescentibus, squamis lanceolatis spinosis patentibus. *Fl. dan.* 1173. *Engl. bot.* 107.

In ruderalia, ad vias vulgaris, Jul. Aug. 3

917. *CN. ERIOPHORUS*, foliis sessilibus pinnatifidis hispidis, laciniis geminatis divaricatis spinosis, calycibus aggregatis arachnoideo-pubescentibus, squamis mucronatis reflexis. *Engl. bot.* 386.

In montosis ad Seeben, montem serenum variis

Iul. Aug. *A priori caute distinguendus calycibus subglomeratis, squamis reflexis.*

918. CN. OLERACEUS, foliis amplexicaulibus cordatis pinnatifidis spinuloso-ciliatis, calycibus subracemosis bracteatis, squamis lanceolatis spinosis. *Schk., t. 229.*

In pratis vulgatissimus. Iul. Aug. 24

919. CN. TUBEROSUS, foliis amplexicaulibus pinnatifidis nudiusculis spinuloso-ciliatis, caule superne aphylo subbifloro, calycinis squamis mucronatis patulis, radice tuberosa. *l. Bauh. hist. III. 43.*

In pratis subhumidis, auf dem Wege nach Nielen et alibi. Iul. 24

920. CN. ARVENSIS, foliis sessilibus pinnatifidis nudiusculis spinosis, caule paniculato, calycibus ovatis, squamis mucronatis subappressis. *Curt. n. 63. Engl. bot. 975. Serratula arvensis L.*

In arvis et ad vias vulgatissimus. Iul. Aug. 24

921. CN. ACAULIS, foliis sessilibus pinnatifidis dentatis spinuloso-ciliatis, pedunculis radicalibus unifloris, calycibus ovatis glabris, squamis arcate imbricatis. *Fl. dan. 1114. Engl. bot. 161.*

In pratis, pascuis vulgaris. Iul. 24 *Variet pedunculo caulescente. (Cn. dubius Willd. berol. t. 6. f. 11.)*

328. ARCTIUM,

922. A. LAPPa, foliis caulinis cordatis petiolatis denticulatis, calycibus nudis, *Curt. n. 40. Engl. bot. 1228.*

In ruderalis, ad vias vulgatissimum. Iul. Aug. 24

923. A. BARBANA, foliis caulinis cordatis petiolatis integerrimis, calycibus arachnoideo-tomentosis. *Willd. sp. pl. A. Lappa β. L. Fl. dan. 642. Schk. t. 227.*

Ibidem cum priori, Iul. Aug. 24

232 CLASS. XVI. SYNGENESIA.

329. CARLINA.

924. *C. VULGARIS*, caule corymboso pubescente, foliis lanceolatis dentatis spinosis subtus pubescentibus. *Fl. dan.* 1174. *Engl. bot.* 1144. *Schk. t.* 232.

In montosis asperis frequens. Iul. Aug. ☉

925. *C. ACAULIS*, caule simplici unifloro, foliis pinatifidis nudis, laciniis inciso-dentatis spinosis. *Lobel. ic. II. p.* 4.

In montosis apricis ad Querfurth, Burgscheidungen. Iul. 24. *Variat caule palmari pedali; interdum subnullo.*

330. SERRATULA.

926. *S. TINCTORIA*, foliis argute serratis integris pinatifidisque, floribus corymbosis. *Schk. t.* 234. *Fl. dan.* 281. *Engl. bot.* 38. *Sturm l.* 3.

In pratis et nemoribus frequens. Iul. 24

*** DISCOIDEI.

331. CHRYSOCOMA.

927. *CHR. LINOSYRIS*, herbacea, foliis linearibus glabris, calycibus laxis. *Schk. t.* 238.

In collibus nemorosis ad Lettin, in der Heide et alibi passim. Aug. 24

332. EUPATORIUM.

928. *EU. CANNABINUM*, foliis digitatis serratis. *Fl. dan.* 745. *Engl. bot.* 428.

In pratis paludosis. Iul. Aug. 24

333. BIDENS.

929. *B. TRIPARTITA*, floribus discoideis erectis, foliis tripartitis lanceolatis dentatis. *Curt. n.* 40. *Engl. bot.* 1113.

Ad fossas, in inundatis frequens. Iul. Aug. ☉

930. *B. CERNUA*, floribus subradiatis cernuis, foliis

lanceolatis oppositis amplexicaulibus dentatis.
Curt. n. 32. Engl. bot. 1114, Schk. t. 238.
Sturm I. 1.

In paludibus, fossis frequens. Iul. Aug. ☉ *Dum
radii adsunt, vocatur Coreopsis* Bidens L.; *dum
pumila est, Bidens minima* L. Fl. dan. 312.

S U P E R F L U A.

334. ARTEMISIA.

31. *A. CAMPESTRIS*, foliis radicalibus pinnatis, laciniis trifidis incanis, caulibus multifidis linearibus glabris, caule procumbente ramofo virgato. Fl. dan. 1175. Engl. bot. 338. Schk. t. 240.

In rupestribus, collibus aridis frequens. Aug. 24.

32. *A. SALINA*, foliis incanis linearibus inferioribus pinnatis, caule ramisque erectis paniculatis tomentosis, calycibus pedunculatis bracteatis pendulis. Willd. sp. pl. *A. maritima* Leyss. *Abfinthium ponticum tenuifolium* Buxb. 2. Ic. nostr. 12.

In vinea ad Rolsdorf, an der nördlichen Ecke des salzigen Sees, rechts vom Wege nach Seeburg. Oct. 24 *A. maritima* L. *differt foliis niveo-tomentosis, ramisque cernuis.*

33. *A. PONTICA*, foliis subtus tomentosis bipinnatifidis linearibus, caule erecto nudo paniculato, calycibus subrotundis nutantibus. I. Bauh. hist. III. 175.

In nemorosis montosis. Aug. 24

34. *A. APSYNTHIUM*, foliis multipartitis sericeo-incanis, laciniis lanceolatis obtusiusculis, floribus racemosis hemisphaericis pendulis, receptaculo piloso. Engl. bot. 1230.

In ruderalis, coemeteriis passim. Iul. Aug. 24

234 CLASS. XVI. SYNGENESIA.

935. *A. VULGARIS*, foliis pinnatifidis subtus tomentosis, lacinulis lanceolatis acutis, calycibus subsessilibus racemosis ovatis tomentosis. *Fl. dan.* 1176. *Engl. bot.* 978.

In ruderalia, versuria, pagis. Iul. Aug. 24

335. GNAPHALIUM.

* *Chrysosoma.*

- * 936. *GN. LUTEO-ALBUM*, herbaceum albo-tomentosum, foliis semiamplexicaulibus lineari-lanceolatis repandis, inferioribus obtusis, floribus glomeratis. *Engl. bot.* 1002.

In arvis arenosis ad Westewitz, Iul. Aug. 6
(Kohl.)

- * 937. *GN. ANEMARUM*, herbaceum incano-tomentosum, foliis inferioribus spathulatis superioribus lineari-lanceolatis obtusis, corymbo compositis. *Fl. dan.* 641.

In collibus arenosis, versuris frequens. Iul. 24

** *Argyrocnemon.*

938. *GN. DIOICUM*, caule simplicissimo farmentoso, foliis radicalibus spathulatis, corymbo cernato, floribus dioicis. *Engl. bot.* 267. *Fl. dan.* 1228.

In pascuis editioribus, versuris, locis sylvaticis vulgatissimum. Iun. Iul. 24

*** *Filaginoides.*

939. *GN. RECTUM*, caule erecto herbaceo simplicifolius linearilanceolatis subtus sericeis, floribus axillaribus terminalibusque spicatis subsessilibus. *Fl. dan.* 1229. *Schk.* t. 234. *GN. sylvaticum Retz., Leyst.*

In sylvaticis montosis, Zorrs, Lindberg, Döls etc. Iul. Aug. 24 *GN. sylvaticum verum (Fl. dan. 254.) differt foliis utrinque lanatis,*

0. *GN. ULIGINOSUM*, caule herbaceo ramoso diffuso, foliis lineari-lanceolatis basi attenuatis sublanatis, floribus terminalibus congestis. *Engl. bot.* 1194. *Fl. dan.* 859.

In inundatis frequens. Iul. Aug. ☉

1. *GN. GERMANICUM*, caule herbaceo erecto simpliciusculo, foliis lanceolatis undulatis obtusiusculis patentibus subtomentosis, floribus globoso-capitatis terminalibus. *Willd. Filago germanica* L. *Fl. dan.* 997. *Sturm* I. 124. *Schk.* t. 266.

In campis sterilibus. arvis hinter der Heide. Aug. ☉

2. *GN. MONTANUM*, caule erecto herbaceo subdichotomo, foliis lineari-lanceolatis acutis appressis albo-tomentosis, floribus confertis axillaribus terminalibusque. *Willd. Filago montana* L.

In collibus apricis, montosis sterilibus, auf dem Galgenberge, am Zorge et alibi. Iul. Aug. ☉

3. *GN. ARVENSE*, caule erecto herbaceo paniculato, foliis oblongo-lanceolatis lanuginosis, floribus congestis subspicatis tomentosis. *Willd. Filago arvensis* L.

In campis sterilibus copiosissime. Iul. Aug. 24

336. TANACETUM.

4. *T. VULGARE*, foliis bipinnatis incisis serratis. *Fl. dan.* 871. *Engl. bot.* 1329. *Sturm* I. 10.

In versuris, nemorosis, sepibus vulgare. Iul. Aug. 24

337. CONYZA.

5. *C. SQUARROSA*, foliis ovato-lanceolatis pubescentibus, inferioribus petiolatis crenato-serratis, caule herbaceo corymboso, squamis calycinis foliaceis squarrosis. *Fl. dan.* 622. *Engl. bot.* 1195.

236 CLASS. XVI. SYNGENESIA.

In vineis ad Freyburg. Zscheplitz et Mönchen-
de rarius. Aug. 24

338. BELLIS.

946. *B. PERENNIS*, scapo nudo, foliis obovatis crenatis hirsutis, radice repente. *Curt. n. 51. Fl. dan. 503. Engl. bot. 424. Schk. t. 253.*

In pomariis, pratis, campis herbidis fere ubique
Primo vere. 24

339. MATRICARIA.

947. *M. CHAMOMILLA*, foliis bipinnatifidis linearibus glabris, radio patente, squamis calycinis pluriusculis. *Curt. n. 56. Engl. bot. 424. Schk. t. 253. b.*

Inter segetes copiose. Iul. ☉

340. CHRYSANTHEMUM.

948. *CHR. LEUCANTHEMUM*, radio albo, foliis simplicibus obovatis petiolatis, caulinis amplexiculis lanceolatis serratis, basi incisfis. *Curt. n. 59. Fl. dan. 994. Engl. bot. 601. Sturm I. 2.*

In pratis, pascuis, inter segetes fere ubique. Iul. 24

949. *CHR. SEGETUM*, radio luteo, foliis amplexiculis oblongis inciso-dentatis glaucescentibus. *Curt. n. 63. Fl. dan. 995. Engl. bot. 540.*

Inter segetes. Iun. Iul. ☉

341. PYRETHRUM.

950. *P. CORYMBOSUM*, foliis bipinnatifidis, laciniis lanceolatis argute serratis, pedunculis corymbosis. *Jacqu. austr. t. 379. Chrysanthemum corymbosum L.*

In sylvaticis montosis frequens. Iun. Iul. 24

951. *P. PARTHENIUM*, foliis pinnatis, pinnis bipinnatifidis oblongis obtusis dentatis, caule subra-

mofo, floribus corymbosis. *Curt. n. 56. Fl. dan. 674. Engl. bot. 1231. Matricaria Parthenium L.*

sepibus et dumetis passim. Iul. 24

P. nodorum, foliis bipinnatis, pinnis lineari-filiformibus acutis bi- tripartitis, caule erecto ramoso. *Engl. bot. 676. Chrysanthemum inodorum L. Fl. dan. 696. Schk. t. 253. a.*

1 ruderalis, cultis, agris. Iul. Aug. ☉

N. Pyrethrum maritimum, quod Rupp. ad in falsum invenit (174.) hodie evanuisse vi-

342. ARNICA.

A. montana, foliis ovatis integris, caulinis geminis oppositis. *Fl. dan. 63. Schk. t. 248.*

1 prato bei der Benndorfer Mühle, rechts am Wege von Delitzsch nach Holzweißig rarissime, 2 Spröder Holze hinter Delitzsch copiose. Iun. 24

343. INULA.

I. britannica, foliis amplexicaulibus lanceolatis basi serratis, subtus cauleque pilosis, ramis lateralibus medios superantibus. *Schk. t. 247. Fl. dan. 413. (Utrouque folia basi serrata, medio denticulata non bene expressa sunt.)*

1 pratis humidis, ad fossas passim. Iul. 24

I. dysenterica, foliis amplexicaulibus cordato-oblongis incano-tomentosis repandis obsolete denticulatis, ramis lateralibus medios superantibus patulis, squamis calycinis setaceis. *Fl. dan. 410. Curt. n. 28. Engl. bot. 1115.*

1 pratis humidis et fossis exsiccatis frequens. Iul. Aug. 24

I. pulicaria, foliis amplexicaulibus oblongis undulatis villosis, caule paniculato, pedunculis unifloris oppositifoliis, floribus subglobe-

288 CLASS. XVI. SYNGENESIA.

lia; radio brevissimo. *Curt. n. 26. Fl. dan. 613. Engl. bot. 1196.*

In ruderalis humidis, inundatis frequens. Aug.

957. *I. SALICINA*, foliis amplexicaulibus lanceolatis recurvis nudis serratis scabriusculis, ramis angulatis, inferioribus altioribus. *Fl. dan. 70.*

In pratis nemorosis, der Lucke, Peisanitz et al. Jul. Aug. 24

958. *I. HIRTA*, foliis sessilibus lanceolatis obliquis serratis rigidis hirtis, caule subunisfloro, calycis squamis lanceolatis ciliatis. *I. Bauh. II. 1647.*

In montosis nemorosis, ad Seeben, Gutenberg, Lieskau, dem Mittelholze. Jun. 24

959. *I. GERMANICA*, foliis semiamplexicaulibus lanceolatis integerrimis recurvis supra diutius subtus pubescentibus, floribus calycibus, calycibus oblongis. *I. Bauh. II. 1051.*

In montosis apricis ad Seeben, Beuchlitz, Rockenholz. Jul. Aug. 24

344. ERIGERON.

960. *E. CANADENSE*, caule paniculato hirta, foliis lanceolatis ciliatis. *Morif. sect. VII. t. 20. f. 2.*

In cultis et ruderalis, ex America septentrionali iam indigena. Aug. ☉

961. *E. ACRE*, caule racemoso piloso, foliis lanceolatis lingulatis. *Curt. n. 5. Engl. bot. 119 Schk. t. 241.*

In montosis arenosis calcareis freq. Jul. Aug.

345. SOLIDAGO.

962. *S. VIRGAURCA*, caule erecto tereti subdensato pubescente, foliis elliptico-lanceolatis, racemis erectis, bracteis elongatis. *Fl. dan. 6 Engl. bot. 301. Sturm I. 9.*

In nemorosis montosis. Aug. 24

346. CINERARIA.

53. *C. PALUSTRIS*, floribus corymbosis, foliis lanceolatis dentato-sinuatis, caule villoso. *Fl. dan.* 573. *Engl. bot.* 151. *Schk.* t. 246.

In pratis humidis ad Canena, Bruckdorf, Dieckau, Erdeborn. Iul. 24

64. *C. CAMPESTRIS*, umbella pauciflora, foliis radicalibus oblongis obtusis basi attenuatis subintegerrimis, caulinis linearilanceolatis, caule lanato simplicissimo. *Fl. dan.* 1177. *C. integrifolia* Wohll. *Engl. bot.* 152. *Morif. sect.* VII. t. 12. f. 28.

In collibus calcareis, auf dem Vogelsberge bei Bennstädt. Maio, Iun. 24

65. *C. CORDIFOLIA*, panicula pauciflora, foliis omnibus cordatis petiolatis duplicato-dentatis, petiolis basi subdentatis, caule simplici sublanato. *Barrel.* t. 145?

In nemoribus montosis ad Schmon, Lodersleben rarius. Aug. 24

347. SENECIO.

* *Corollis tubulosis.*

66. *S. VULGARIS*, foliis amplexicaulibus pinnatifidis dentatis, floribus corymbosis coarctatis. *Curt.* n. 8. *Fl. dan.* 513.

In cultis, ruderalis, hortis et agris ubique; per totum annum. ☉

** *Radio revoluta.*

67. *S. VISCOSUS*, foliis pinnatifidis denticulatis viscidis, pedunculis subsolitariis, calyculis laxis calycem subaequantibus, caule ramosissimo patulo. *Fl. dan.* 1230. *Engl. bot.* 32.

In ruderalis, cultis, ad pagos freq. Iul. Aug. ☉

240 CLASS. XVI. SYNGENESIA.

968. *S. SYLVATICUS*, foliis pinnatifidis lobatis denticulatis subpilosis, calyculis brevissimis, cauli simpliciusculo corymboso. *Rupp. jen. t. 3.*

In sylvis caeduis Zorge, Mittelholze rarius. In Aug. ☉

*** *Radice patente, foliis divisis.*

969. *S. ERUCAEFOLIUS*, radio patente, foliis pinnatifidis dentatis supra subhirsutis, subtus innotomentosis, calycibus apice maculatis (in sphacelatis).

In pratis editioribus, collibus herbidiis frequens. Aug. 2 [*Barrel. 153. huc non pertinet.*]

- * 970. *S. TENUIFOLIUS*, foliis pinnatis, pinnis linearibus acuminatis subincisilis subtus pubescentibus, caule subhirsuto. *S. erucaefolius* Curm. 50. *S. abrotanifolius* Wohlleb.

In pratis ad Passendorf, zwischen Karasdorf und Reinsdorf. Aug. 2

971. *S. JACOBAEA*, foliis lyrato-bipinnatifidis diviscatis dentatis glabriusculis, feminibus pilosis. *Engl. bot. 1135.*

In pratis editioribus frequens. Iul. Aug. 2

- * 972. *S. AQUATICUS*, radio patente, foliis lyratis ferratis, inferioribus obovatis indivisis, feminibus glabriusculis. *Fl. dan. 784. Engl. bot. 1131. S. Jacobaea* β. *Leyf. 2.*

In locis paludosis ad Zöckeritz, bei Bitterfeld. Aug. Sept. 2

**** *Foliis indivisis.*

973. *S. PALUDOSUS*, foliis semiaraplexicaulibus lanceolatis argute ferratis subtus subvillosis-lanceolatis, caule stricto corymboso. *Fl. dan. 385 Engl. bot. 650.*

In aquis stagnantibus bei Kollenbey an der Stachelbrücke, zwischen Schkopa und der Breyhanschenke, bei Radewell. Iul. Aug. 2

74. *S. nemorensis*, foliis ovato-lanceolatis serratis ciliatis subtus asperis basi inaequalibus, caule paniculato corymbofo, bracteis hirsutis ciliatis, pedunculis lanatis. *Virgaurea latifolia saracenica* I. Bauh. hist. II. 1063.

In paludibus nemorosis, an den Teichen im Lodersleben'schen Forste. Iul. Aug. 24

75. *S. saracenicus*, foliis lanceolatis subsessilibus serratis glabris, corymbo approximatis. *Solidago saracenica* I. Bauh. hist. II. 1063.

In nemoribus bei Schkopa, in der Heide rarius. Iul. Aug. 24

348. ASTER.

76. *A. Amellus*, foliis oblongo-lanceolatis integerrimis scabris, floribus corymbosis, calycinis squamis squarrosis obtusis apice coloratis. *Jacqu. auster.* t. 435.

In collibus calcareis, auf dem Vogelsberge bei Bennstädt, bei Schmon. Aug. 24 *Cultus mire variat, ut longe speciosior, elatior, ramosior evadat. Subest A. acris Leyfs.*

77. *A. Tripolium*, foliis lineari-lanceolatis carnosissimis triplinerviis, inferioribus apice subserratis, caule glabro corymbofo, calycibus subsimplicibus obtusis. *Fl. dan.* 615. *Engl. bot.* 87.

In pratis subsalsis uliginosis, ad Dieskau, Benckendorf an der Salzke, Kölme, ad lacum salinum copiosissime. Aug. 24

978. *A. annuus*, foliis pilosiusculis, inferioribus subovatis serratis, superioribus lanceolatis, calycis hemisphaerici squamis subaequalibus strigosis. *Fl. dan.* 486.

In pratis, am alten Teiche bei Zscherben. Iul. ☉

349. TUSSILAGO.

79. *T. Farfara*, scapo unifloro bracteato, floribus radiatis, foliis cordatis dentatis angulatis subtus

242 CLASS. XVI. SYNGENESIA.

pubescentibus. *Fl. dan.* 595. *Engl. bot.* 429.
Curt. n. 13. *Sturm I.* 2.

In agris limosis, maxime ad Seeben frequens.
Mart. Apr. 24

980. *T. PETASITES*, thyrso oblongo, floribus discoidis, foliis oblongo-cordatis lobis approximatis inaequaliter denticulatis, subtus pubescentibus. *Curt. n.* 23. *Fl. dan.* 842. *Engl. bot.* 431. *Sturm I.* 7.

In pomariis, sepibus. Mart. Apr. 24 *Variet flosculis omnibus hermaphroditis, et feminis plurimis.* (*T. hybrida* *Leyss. Engl. bot.* 430. *Schk. t.* 242.)

350. ANTHEMIS.

* *Radio albo.*

981. *A. ARVENSIS*, caule diffuso ramoso villosa, foliis pinnato-multifidis, laciniis lanceolato-linearibus cano-pubescentibus, paleis exsertis, seminibus coronato-marginatis. *Engl. bot.* 60.
Fl. dan. 1178.

Inter segetes copiose. Iun. Iul. ☉

982. *A. CORULA*, caule erecto glabriusculo, foliis bipinnatis glabris, foliolis tripartitis, paleis brevissime setaceis, seminibus nudis. *Curt. n.* 56.
Fl. dan. 1179. *Schk. t.* 254.

In ruderalis rarius. Iun. Iul. ☉

N. A. Pyrethrum, quod Rupp. 171. in den Giehlen bei Schleberode et Eberstode invenisse testatur, etiamnum latet.

** *Radio luteo.*

983. *A. TINCTORIA*, foliis bipinnatifidis argute serratis subtus pubescentibus, caule erecto ramoso.
Fl. dan. 741.

In sepibus et dumetis hinter Kröllwitz, an der Gersdorfer wüsten Feldmark, in vineis ad Köhne, Bennstädt copiose. Iul, Aug. 24

351. ACHILLEA.

984. A. PTARMICA, foliis linearibus aequaliter argute serratis acuminatis glabris. *Curt. n. 58. Fl. dan. 643. Sturm I. 10.*

In pratis passim: Iul. 24

985. A. MILLEFOLIUM, foliis bipinnatis multifidis nudiusculis, laciniiis linearibus inciso-dentatis suberectis. *Curt. n. 63. Fl. dan. 757. Sturm I. 10.*

In pratis, pascuis, versuris ubique. Aest. 24

Mire variat et florum colore roseo et foliis imis longioribus, laciniiis remotioribus, quae in sylvis obvia, A. magnam fere refert.

986. A. NOBILIS, foliis radicalibus triplicato-pinnatifidis, caulinis bipinnatifidis, laciniiis linearibus planis subdentatis, rachi alata dentata, corymbo composito fastigiato. *Schk. t. 255.*

In campis aridis, collibus apricis beim Lindberge, ad montem serenum copiose. Iul. Aug. 24

987. A. SETACEA, foliis bipinnatis, foliolis filiformi-setaceis confertissimis erectis pilosis, caule simplici dense piloso, corymbo fastigiato. *Ki. t. 80. A. odorata Leyss.*

In rupibus montosis, in horto botanico sponte, ad Griebichenstein. Maio, Iun. 24

FRUSTRANEA.

352. CENTAUREA.

988. C. MONTANA, calycis squamis serratis, foliis lanceolatis integerrimis decurrentibus glabriusculis, caule simplici. *Jacq. t. 371.*

In montibus ad Schmon et Vitsenburg rarius. Iul. 24

989. C. GRANUS, calycis squamis serratis, foliis linearibus sessilibus integerrimis, infimis basi

244 CLASS. XVI. SYNGETESIA.

pinnatifidis. *Fl. dan.* 993. *Engl. bot.* 277.
Sturm I. 4. Curt. n. 69.

Inter legetes copiose. Iul. Iul. ☉

990. *C. PANICULATA*, calycis squamis ciliatis appressis, foliis pinnatifidis, caule paniculato. *Merrif. sect. 7. t. 28. f. 15.*

In versuris, collibus, ad vias vulgaris. Iul. Aug. ☉

991. *C. SCABIOSA*, calycis pubescentis squamis ciliatis, foliis pinnatifidis scabriusculis, laciniis lanceolatis acutis basi pinnatifidis. *Fl. dan.* 1231. *Engl. bot.* 56.

In nemoribus, vineis. Iul. 24. *Occurrit variatus floribus albis ad marginem des Rockenholzes rarissime, quam Kohlbus primus invenit.*

992. *C. IACEA*, calycis squamis scariosis obtusis apice laceris, foliis lanceolato-integerrimis, infimis sinuato-dentatis, ramis angulatis. *Fl. dan.* 519. *Sturm I. 4.*

In pratis, pascuis vulgaris. Aest. 24

993. *C. CALCITRAPA*, calycis sessilis spinis divaricatis calyce triplo longioribus, basi palmatis, foliis pinnatifidis linearibus dentatis, caule divaricato-ramoso piloso. *Engl. bot.* 125. *Sturm I. 4.*

In versuris, pascuis vulgaris. Aug. Sept. ☉

994. *C. SOLSTITIALIS*, calycis solitarii pedunculati spinis divaricatis calyce longioribus, basi palmatis, foliis infimis lyrato-pinnatifidis, superioribus lanceolatis integerrimis decurrentibus, supremis linearibus, caule erecto lanato. *Engl. bot.* 243. *C. ficula Leyfs.*

In versuris, ad margines nemorum, beim Fassenhaufe et alibi rarius. Aug. ☉

NECESSARIA.

353. CALENDULA.

395. *C. ARVENsis*, seminibus cymbiformibus muricatis incurvis, exterioribus lanceolato-subulatis, foliis cordato-lanceolatis acuminatis. *Schk.* p. 265.

Inter segetes passim. Aest. ☉

396. *C. OFFICINALIS*, seminibus omnibus cymbiformibus muricatis incurvis, foliis spathulatis. *J. Bauh. hist. III. 101. Sturm I. 8.*

In cultis oleraceis, hortis. Aest. ☉

CLASSIS XVII.

GYNANDRIA.

MONANDRIA.

Anthera bilocularis. Calyx corollinus.

* *Calcaratae*.

354. ORCHIS. *Calyx* ringens 5-phyllus.
Cor. Labellum patens basi calcaratum.
Columna genitalium brevis. *Anthera*
 terminalis adnata.

** *Ecalcaratae*.

355. OPHRYS. *Calyx* ringens 5-phyllus.
Cor. Labellum patens subcarinatum.
Columna genitalium brevis. *Anthera*
 terminalis adnata.

246 CLASS. XVII. GYNANDRIA.

356. NEOTTIA. *Calyx* ringens 5-phyllus, foliolis exterioribus basin labelli antice amplexantibus. *Cor.* Labellum patulum basi ventricosum. *Columna* genitalium brevis. *Anthera* postice columnae adfixa iique parallela.

357. EPIPACTIS. *Calyx* erecto-patens 5-phyllus. *Cor.* Labellum calyce longius. *Columna* genitalium apice subbifida; *anthera* postico margini inserta; *lamellula* torida media inter antheram et stigma.

358. CYMBIDIUM. *Calyx* erecto-patens 5-phyllus. *Cor.* Labellum basi concavum. *Columna* genitalium elongata antice excavata. *Anthera* opercularis.

D I A N D R I A.

359. CYPRIPIEDUM. *Cal.* 4-phyllus corollinus. *Cor.* Labellum ventricoso-inflatum obliquum. *Columna* genitalium lacinula ultima stigma inter antheras distinctas tegens. *Capf.* 3-valvis 1-ocularis polysperma.

H E X A N D R I A.

360. ARISTOLOCHIA. *Cal.* 6. *Cor.* 1-

petala tubuloso-ligulata. *Capf*, 6-locularis polysperma.

Cf. de his characteribus Swartz. Acad. handling. 1800. p. 205. (nov. act. upsal. VI. p. 70.) Schraders Journ. 1799. II. p. 201. neues Journ. 1. Wächter in Römers Archiv, II. 2. p. 209. Sprengels Geheimn. der Befrucht. p. 402—428. Jaume S. Histoire exposée des famill. nat, l. p. 158. f.

MONANDRIA.

354. ORCHIS.

* *Tuberibus testiculatis.*

997. *O. BIFOLIA*, labello integerrimo obtuso, calcare germen duplo excedente, foliis radicalibus binis oblongis, caulinis vaginantibus brevissimis, *Fl. dan. 235. Engl bot. 22.*

In nemoribus plerisque vulgaris. Maio, Jun, 24
Flores viridi-pallescentes vesperi fragrantissimi.

998. *O. PYRAMIDALIS*, labello tripartito basi bituberculato, lacinii aequalibus integerrimis, calcare germen excedente, spica densa oblonga, *Engl. bot. 110. Haller stirp. t. 35. f. 1. n. 1286.*

In montosis calcareis ad Kölme, Zscheplitz rarissime. Iul. 24 *Flores vivide puniceae.*

999. *O. CORIOPHORA*, labello trifido, lacinia media angustiore integerrima, lateralibus reflexis denticulatis, calcare brevissimo, foliolis calycinis conniventibus, *Hall. stirp. n. 1284. t. 34.*

In pratis ad Dölau rarius. Jun, 24

1000. *O. MORIO*, labello trilobo, lobo medio emar-

248 CLASS, XVII. GYNANDRIA.

ginato, lateralibus crenulatis deflexis, calcare adscendente germen subaequante, foliolis calycinis obtusis conniventibus. *Curt. n. 30. Hall. stirp. n. 1281. t. 30. f. 1. Schk. t. 271.*

In pratis humidiusculis ad Seeben, Gutenberg passim. Iun. 24 *Flores violacei, incarnati, albi; labello maculato.*

- * 1001. O. PALUSTRIS, labello obovato leviter trilobo, calcare germinibus duplo breviori adscendente, calycinis foliolis obtusis, foliis linearilanceolatis. *Jacqu. ic. rar. t. 181.*

In pratis humidis ad Nietleben et alibi. Iul. 24 *Flores purpurei unicolores.*

1002. O. MAScula, labello trilobo crenulato obtuso, lobo medio bifido, cornu obtuso adscendente germen aequante, foliolis calycinis acutis exterioribus reflexis, foliis lato-lanceolatis. *Jacqu. ic. rar. t. 180. Curt. n. 21. Svensk bot. t. 220. (Fl. dan. 457. vix huc pertinet.) Hall. stirp. n. 1283. t. 33.*

In pratis humidis nemorosis ad Lodersleben rarissime. Iul. 24 *Calyces magis fusce, labellum vividius purpureum, macula media pallida, folia plerumque maculata.*

1003. O. USTULATA, labello tripartito, laciniis linearibus punctato-scabris, media bipartita, calycibus erectis acutis, germine calcar uncinatum triplo superante bracteas aequante. *Fl. dan. 103. Sturm I. 12. Engl. bot. 18. Hall. stirp. n. 1273. t. 28.*

In collibus siccioribus ad Rothenburg et Alaleben (*Kruse*). Iun. Iul. 24 *Calyces ruberrimi; labellum albidum punctis sanguineis notatum.*

- * 1004. O. VARIEGATA, labello trifido punctato, laciniis obtusis oblongis, media bifida ferrata cum mucrone interiecto, germine calcar rectum su-

bulatum duplo superante, bracteis breviori, calyce acuto connivente. *Hall. stirp. n. 1275. t. 30. O. militaris* γ. *Leyss. Rupp. jen. t. 6.*

In nemorosis, dem Mittelholze, bei Schmon. Seeben rarius. Iun. 24 *Calyces purpurei, labellum albidum, rubro punctatum.*

105. *O. fusca*, labello tripartito punctato - scabro, laciniis lateralibus oblongis, intermedia biloba crenata cum mucrone interiecto, germine cornu rectiusculum bracteasque triplo excedente, calycibus obtusiusculis conniventibus. *Haller stirp. n. 1276. t. 31. O. militaris* β. *Leyss. Engl. bot. 16. Curt. n. 68.*

In nemoribus ad Erdeborn, Holzzelle, Hornburg. Iun. 24 *Calyces fusco-sanguinei, labellum pallidum punctis sanguineis notatum; caulis cubitalis.*

106. *O. militaris*, labello tripartito punctato scabro, laciniis lateralibus linearibus, media biloba obtusa obsolete serrata cum mucrone interiecto, calyceibus acuminato-mucronatis conniventibus, germine calcar rectum duplo excedente, bracteis obsoletis. *Hall. stirp. n. 1277. t. 28. O. militaris* α. *Leyss.*

In nemoribus ad Lodersleben, Mûcheln, Brandorode rarius. Iun. 24 *Calyces pallide violacei, labellum albicans, pilis rubicundis stellato-punctatum, multo angustius, quam O. fuscae et variegatae; caulis humilior, pedalis.*

107. *O. pallens*, labello leviter trilobo, lobo intermedio retuso, foliolis calycinis lateralibus patentibus, calcare conico germem subaequante. *Hall. stirp. n. 1281. t. 30.*

In nemoribus montosis ad Schmon rarius. Maio. 24 *Calyces ochroleuci, labellum flavum; flores urinam felinam redolent*

1008. *O. hircina*, labello tripartito, laciniis late-

250 CLASS. XVII. GYNANDRIA.

radibus lineari-subulatis undulatis, media l-
neari subbifida tridentata germen triplo supe-
rante, calycibus obsusiusculis conniventibus,
cornu brevissimo conico serotiformi, bracteis
angustis germen excedentibus. *Swartz. So-*
cyrium. hircinum L. Hall. n. 1268. t. 25.
Engl. bot. 34.

In nemoribus umbrosis ad Lodersleben (*Leyss.*)
Im Hohlwege am Büchsenberge (*Bergener.*)

Caulis sempervialis; calyces viridi-rubig-
inosi, tabellam plumbeo-purpureum; flores hirs-
uti parvis odorati, ultra 20 in eadem spica.

Tuberibus palmatis.

1009. *O. latifolia*, labello leviter trilobo lateri-
bus reflexo, calycis foliolis lateralibus reflexis
mediis conniventibus, cornu conico germen
subaequante, bracteis flore longioribus, cano
filulosis superne angulato. *Hall. stirp. n.*
1279. t. 32. Curt. n. 59. Fl. dan. 366.
Sturm I. 7.

In pratibus fere omnibus. Jun. Jul. 24 *Flores*
incarnati, rubri, purpurei, violacei, sangui-
nei, rosei, albi; folia nonnunquam maculata.

1010. *O. maculata*, labello plano trilobo crenulato,
lobo medio minori acuto integro, calycis folio-
lia exterioribus divaricatis, interioribus conni-
ventibus, germine calcar cylindraceum et brac-
teas subaequante. *Hall. stirp. n. 1278. t. 32.*
Fl. dan. 933. Engl. bot. 632.

In nemoribus ad Schmon et Lodersleben copio-
se, im Ramsiner und Glesenschen Holze. Jun.
Jul. 24 *Flores incarnato-albidi, maculis pur-*
pureis eleganter notati; folia plerumque ma-
culata.

1011. *O. conopsea*, labello trilobo subaequali inte-
griusculo, calcare fetaceo germen duplo exce-
dente, calycis foliolis exterioribus patentissi-

mis, spicae cylindricae floribus sparsis. *Hall.*
n. 1287. t. 29. *Fl. dan.* 224. *Engl. bot.* 10.

In pratis nemorosis inter Nietleben et Granau,
in der Lucke, bei Lodersleben. Maio, Iun. 24

Floret purpurei parvi, odore caryophyllorum.

355. OPHRYS.

012. *O. MYODES*, caule folioso, labello sericeo foveo-
lato tripartito, laciniis lateralibus lineari-lan-
ceolatis, media longiore oblonga biloba, caly-
cis patentis foliolis exterioribus lanceolatis ob-
tusis, interioribus linearibus filiformibus bre-
vissimis. *Hall. stirp.* n. 1265. t. 24. f. 1.
Jacqu. ic. rar. t. 184. *Engl. bot.* 64.

In nemoribus humidis ad Gutenberg rarissime.
Iun. 24 *Caulis, spica rarissima, pedalis; calyx*
externus virens, interne purpurascens, labellum
atropurpureum, macula coerulea.

013. *O. ARACHNITES*, caule folioso, labello villoso
convexo trilobo, lobo medio obovato apice
brevissime trilobo, calycis patentis foliolis ex-
terioribus oblongis obtusis, interioribus lan-
ceolatis brevissimis. *Hall. stirp.* n. 1266.
t. 24. f. 2. *Engl. bot.* 65.

In nemoribus montosis, Reußen bei Zscheplitz.
Iun. Iul. 24 *Caulis spithameus; calyx albido-*
virens, dein purpurascens, labellum xerampe-
linum.

356. NEOTTIA.

014. *N. SPIRALIS*, labello ovato crispato crenulato,
spica tortili, floribus secundis, foliis radicali-
bus subpetiolatis oblongis. *Swartz. Ophrys*
spiralis L. *Hall. stirp.* n. 1294. t. 38. *Curt.*
n. 46. *Fl. dan.* 387. *Sturm* I. 12.

In nemorosis montosis ad Schmon et Lodersle-
ben. Aug. 24

252 CLASS. XVII. GYNANDRIA.

357. EPIPACTIS.

* *Labello integro.*

1015. *E. LATIFOLIA*, foliis ovatis amplexicaulis, bracteis inferioribus flore longioribus, floribus cernuis, labello integerrimo acuminato calycibus breviori, germine pubescente. *Swartz. Hall. stirp. n. 1297. t. 40. Fl. dan. 8. Engl. bot. 269. Serapias latifolia L.*

In sylvis montosis ad Erdeborn. Iun. Iul. 2.

Flores praecociores pallide, calyce viridescens, seriores atro-purpurei.

1016. *E. PALUSTRIS*, foliis lanceolatis amplexicaulis, bracteis flore brevioribus, floribus pendulis, labello crenato obtuso calycem subaequantem, germine pubescente. *Swartz. Hall. stirp. n. 1296. t. 39. Schk. t. 274. Fl. dan. 267. Engl. bot. 270. Sturm I. 13. Serapias longifolia L.*

In pratis udis vulgaris. Iun. Iul. 2. *Calycum labello pallidi purpureo-striati.*

1017. *E. PALLENS*, foliis oblongo-lanceolatis sessilibus, bracteis germine longioribus, floribus erectis, labello obtuso calycibus breviori, germine glabro. *Swartz. Hall. stirp. 1298. t. 41. Engl. bot. 271. Serapias grandiflora L. syst. veget.*

In sylvaticis montosis, solo calcareo, ad Schma. Iul. 2. *Flores albi non maculati.*

- † 1018. *E. ENSIFOLIA*, foliis lanceolatis acuminatis subdistichis, bracteis minutissimis subulatis, floribus erectis, labello obtuso calycibus duplo breviori, germine glabro. *Willd. Serapias Xiphophyllum L. suppl. S. ensifolia. Schk. t. 274. Engl. bot. 494. S. grandiflora Fl. dan. 506.*

Cum priori minus frequens. *Flores albi.*

1019. *E. RUBRA*, foliis lanceolatis, bracteis germine

glabro longioribus, floribus erecto, labello acuto lineis undulatis notato. Sw. Hall. stirp. n. 1299. t. 42. *Scrapias rubra* L. Engl. bot. 437. Fl. dan. 345.

Cam prioribus bei Schmon, Erdeborn. Flores purpurei, lineis labelli flavis.

** Labello bifido.

2020. E. NIDUS AVIS, caule aphylo vaginato, labello obcordato calycem obtusum duplo superante. Sw. Ophrys Nidus avis L. Hall. stirp. n. 1290. t. 37. Fl. dan. 181.

In nemoribus umbrosis, ad radices fagorum et quercuum prope Lodersleben, Schmon, Brandorode, Schleberode. Jun. 24. Planta fusca, calycibus pallidis, labello aurantiaco.

2021. E. OVATA, caule bifolio, foliis ovatis oppositis, labello lineari calycibus obtusis triplo longiori. Hall. stirp. n. 1291. t. 37. Schk. t. 273. Fl. dan. 137. Curt. n. 30. Ophrys ovata L.

In nemorosis humidis, ad Seeben, Gutenberg, Benpstadt im Ellernbusche et alibi frequens. Maio, Jun. 24. Flores flavescenti-virides.

358. CYMBIDIUM.

2022. C. CORALLORRHIZA, caule aphylo vaginato, floribus erectis, calycis foliolis lanceolatis, infimis deflexis, labello oblongo integro. Hall. stirp. n. 1301. t. 44. Sw. Ophrys Corallorrhiza L. Fl. dan. 451.

In sylvis paludosis ad Lodersleben et Ziegelrode rarissime. Jun. Jul. 24. Radix carnosae ramosae, lobis divaricatis; flores albi exigui. Calycis foliola ima deflexa seduxerunt ipsum L., ut labelli laciniis crederet.

DIANDRIA.

359. CYPRIPIEDIUM.

2023. C. CALCEOLUS, foliis ovatis nervosis, colum-

254 CLASS. XVIII. MONOECIA.

nae lacinula obtusa, calyce labellum superante.
Schk. t. 275. Sturm I. 8.

In nemoribus ad Erdeborn. Maio. 24

HEXANDRIA.

360. ARISTOLOCHIA.

3604. A. CLEMATITIS, foliis subrotundo-cordatis obtusiusculis petiolatis, pedunculis unifloris aggregatis, labio oblongo. Fl. dan. 1235. Schk. t. 276. Sturm I. 6.

In pomariis et vineis frequens. Iun. 24

CLASSIS XVIII.

MONOECIA.

MONANDRIA.

361. ZANNICHELLIA. ♂ Cal. o. Cor. o. ♀ Cal. 1-phyllus. Germina 4, 5 pedicellata, stigmata peltata.

TRIANDRIA.

362. CAREX. Flores amentacei, gluma 1-valvis. Stigm. 2 vel 3. Sem. arillata.

363. SPARGANIUM. Flores verticillato-globosi. Cal. Squamae plures. Cor. o. Drupa exsucca 1 — 2-sperma.

364. AMARANTUS. Cal. 3-phyllus. Styli 3. Caps. circumscissa. (E 34 spec. notis 22 triandrae sunt.)

TETRANDRIA.

65. URTICA. *Cal.* o. ♂ *Cal.* 4-phyllus. *Germinis* rudimentum cyathiforme. ♀ *Cor.* 2-phyllus. *Sem.* 1 nudum.

66. ALNUS. *Flores* amentacei. ♂ *Squamae* 3-florae. *Cor.* 4-partita. ♀ *Squamae* 2-florae. *Cor.* o. *Styli* 2. *Nux* angulato-compressa 1-locularis. (Cf. *Hartmann diff. in Röm. Arch. II. p. 451.*)

OCTANDRIA.

67. MYRIOPHYLLUM. *Cal.* 4-fidus bracteatus. *Cor.* 4-petala. *Stigm.* 4 fessilia. *Sem.* 4 corticata.

68. CORYLUS. ♂ *Flores* amentacei. *Cor.* o. *Squama* trifida. ♀ *Flores* gemmaeformes. *Cor.* o. *Cal.* 2-fidus lacer. *Styli* 2. *Nux* calyce coriaceo cincta.

POLYANDRIA.

69. ARUM. *Spatha* 1-phylla. *Spadix* superne antheris, inferne germinibus tectus. *Bacca* 1-locularis.

70. SAGITTARIA. *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 3-petala. *Stam.* et *Pist.* plurima. *Caps.* plurimae ventricosae 1-spermae.

71. POTERIUM. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.*

456 CLASS. XVIII. MONOECIA.

4-fida. *Pist.* 2. *Nux* bilocularis. *Stigm.* penicilliformia.

372. GERATOPHYLLUM. *Cal.* ♂ multipartitus ♀ 6-phyllus imbricatus. *Cor.* o. *Antherae* 2-cuspidatae. *Stigm.* elongata filiformia. *Nux* 1-sperma.

373. QUERCUS. *Flores* amentacei. *Cor.* o. ♂ *Cal.* multipartitus. *Antherae* didymae. ♀ *Cal.* integer. *Stigm.* 3-partitum. *Nux* coriacea.

374. FAGUS. *Flores* amentacei. *Cor.* o. ♂ *Cal.* campanulatus 5-fidus bracteatus. *Rudimentum* styli simplicis. ♀ *Cal.* duplex externus 4-fidus bracteatus 2-florus, internus germina vestiens multidentatus. *Stigm.* 3. *Nuces* 2, 3, calyce coriaceo muricato tectae.

MONADELPHIA.

375. BETULA. *Flores* amentacei. ♂ *Squama* 5-fida bracteata. *Antherae* binae staminum singulorum. ♀ *Squama* 3-loba 3-flora. *Styli* 2 capillares. *Samaras* nuda.

376. PINUS. *Flores* amentacei. ♂ *Squamae* simplices. *Antherae* binae, fila-

nenta racemosa. ♀ *Squamae* duplices
2-florae. *Nux* alata.

7. CARPINUS. *Flores* amentacei. ♂
Squama simplex. *Antherae* ternae aut
binae apice penicillatae. ♀ *Squama* tri-
fida 2-flora. *Cal.* proprius 6-dentatus.
Styli 2. *Nux* angulosa 1-ocularis.

8. TYPHA. *Flores* amentacei, fla-
mentis pedicellisque germinum longe
pilosus. *Antherae* subternae.

9. XANTHIUM. *Anthod.* imbricatum.
Ree. paleaceum. ♂ *Cor.* infundibuli-
formis 5-dentata. *Antherae* quinae in
angulo filamentis. ♀ *Cal.* 2-phyllus 2-
florus. *Cor.* 6. *Styl.* 2-fidus. *Drupa* sicca
muricata 2-fida. *Nucleus* 2-ocularis.

10. BRYONIA. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.*
5-partita. *Filamenta* terna. *Styli* 3.
Bacca infera polysperma.

MONANDRIA.

361. ZANNICHELLIA.

5. *Z. PALUSTRIS*, anthera 4-oculari, stigmatibus
integerrimis, seminibus curvatis dorso denti-
culatis. *Willd. Mich. gen. t. 34. f. 1.*
Fl. dan. 67. Schk. t. 280.

1. fossis et aquis stagnantibus frequens. Jul.

258 CLASS. XVIII. MONOECIA.

Aug. 24. *Folia filiformia verticillata; stipulae tubulosa membranacea.*

TRIANDRIA.

362. CAREX.

1. *Spicis dioicis.*

1026. C. LINNÆANA, spica simplici; stigmatibus binis, fructibus erectiusculis ovatis nervosis, foliis culmisque glabris, radice repente. *Hoffm. Gram. III. 77. C. dioica L. C. laevis Hoffm. Schk. t. A. f. 1. Fl. dan. 369. Engl. bot. 543.*

In pratis paludosis ad Gutenberg passim. Maii.

- *1027. C. DAVALLIANA, spica simplici, stigmatibus binis, fructibus recurvatis oblongo-lanceolatis triquetris nervosis superne margine scabris, foliis culmisque retrorsum hispidis, radice caudate. *Hoffm. I. 41. Schk. t. A. f. 2.*
Ibidem eodem tempore. 24

2. *Spicis androgynis.*

1028. C. SPICATA, spica simplici supernis masculis stigmatibus tribus, fructibus triquetris subrotundis breviter rostratis, foliis planis scabris, radice repente. *Schk. t. D. 15. C. Lutea glochin Wobll. C. pyrenaica Wahlenb.?*

In prato spongioso unter dem Tannenberge bei Gutenberg. Iun. 24

1029. C. INTERMEDIA, spica composita, spiculis alternis confertis inferioribus remotiusculis, intermediis masculis, fructibus ovatis marginatis bicuspidatis nervosis ciliato-ferratis. *Gosslen. Hoffm. I. 50. Schk. t. B. f. 7. C. disticha Leyfs.*

In pratis fere ubique. Iun. Iul. 24

1030. C. SCHREBERI, spica composita, spiculis alternis confertis, inferne masculis, fructibus ovatis nervosis glabris. *Hoffm. I. 4. Schk. t. B. f. 9. Engl. bot. 1099. C. parviflora Leyfs.*

In collibus herbidis frequens, in ipso horto botanico. Maio, Iun. 24

31. *C. ovalis*, spica composita, spiculis subsens ovalibus alternis approximatis, inferne masculis, fructibus ovatis striatis marginatis bicuspidatis ciliato-ferratis. *Hofst* I. 51. *Fl. dan.* 1115. *Schk. t.B. f. 8. Engl. bot.* 306. *C. leperina Leyss.*

In pratis ad Dölau, in den Pulverweiden frequens. Maio, Iun. 24

32. *C. vulpina*, spica decomposita, spiculis aggregatis ovalibus superne masculis, bracteis longioribus setaceis, fructibus ovatis divergentibus bicuspidatis. *Hofst* I. 56. *Schk. t.C. f. 10. Fl. dan.* 308. *Engl. bot.* 307.

In paludibus, ad fossas copiose. Maio, Iun. 24

33. *C. brizoides*, spica composita subdisticha, spiculis alternis oblongis nitidis, inferne masculis, fructibus ovatis marginatis ciliatis squama lanceolata latioribus. *Hofst* I. 47. *Schk. t.C. U. f. 12.*

In pratis nemorosis ad Döllnitz, Gutenberg. Maio, Iun. 24

34. *C. muricata*, spica composita, spiculis ovatis superne masculis, inferne remotiusculis, bracteis setaceis longioribus, fructibus ovatis horizontalibus bidentatis. *Hofst* I. 54. *Schk. t.E, Dd. f. 22. Engl. bot.* 1097.

In pratis paludosis ad Nietleben etc. frequens.

35. *C. stellulata*, spica composita, spiculis subternis subrotundis remotiusculis inferne masculis, fructibus ovato-rostratis bidentatis divaricatis. *Hofst* I. 53. *Schk. t.C. f. 14. Fl. dan.* 284. *C. echinata Wohl.*

In pratis ad Nietleben et Dölau frequens. Iun. 24

36. *C. remota*, spica composita, spiculis subqua-

260 CLASS. XVIII. MONOECIA.

ternis remotis subfessilibus, bracteis longissimis fructibus ovatis acuminatis bifidis. *Hofst I. 52. Schk. t. E. f. 23. Fl. dan. 370.*

In nemoribus humidis ad Bølberg, Holaweisg et Bitterfeld. Iun. 24

1037. *C. ELONGATA*, spica composita; spiculis alternis approximatis cylindraceis inferioribus pedunculatis, inferne masculis; fructibus ovato-acuminatis erectis bifidis dorso hispidis squamam ovatam excedentibus. *Hofst III. 79. Fl. dan. 1236. Schk. t. E. f. 25.*

In nemoribus humidis der Heide, ad Schmot Iun. 24

1038. *C. CURTA*, spica composita, spiculis ovalibus remotiusculis, fructibus ovatis apice integris squamam ovatam excedentibus. *Hofst I. 4. Schk. t. C. f. 13. Engl. bot. 1386. Fl. dan. 285. C. canescens Lèys.*

In paludibus ad Dölau et Lieskau frequens. Iun. 24

- * 1039. *C. PARADOXA*, spicis paniculatis superne masculis, ramis inferioribus remotiusculis, fructibus ovato-rostratis bidentatis, angulis ciliatis, culmo trigono. *Schk. t. E. f. 21. C. canescens Hofst I. 57.*

In palude ad Lieskau. Iun. 24

1040. *C. PANICULATA*, spicis paniculatis superne masculis, ramis remotis, fructibus ovatis superne membranaceo-marginatis ciliato-ferratis, culmo triquetro. *Hofst I. 58. Schk. t. D. f. 20. Fl. dan. 1116. Engl. bot. 1064.*

In nemoribus udis, in horto Dieskaviensi. Iun. 24

- * 1041. *C. BUXBAUMII*, spica androgyna terminali pedunculata obovata, femineis subternis remotis, bracteis longioribus, fructibus ellipticis obtusis obsolete 2-dentatis squamam oblongam mucronatam subaequantibus. *Willd. C. polyg.*

Sp. Schk. t. X. Gg. f. 76. Buzb. orient. cent. 4. t. 59.

In nemore ad Dölan. Iun. 24

3. *Spica mascula solitaria, femineis sessilibus.*

443. *C. CLANDESTINA*, spica ♂ pedunculata, ♀ remotis paucifloris subsessilibus bractea membranacea vaginante subinclusis, fructibus obovatis hirtis. *Hofst I. 67. Schk. t. K. f. 43. Sturm I. 2. C. humilis Leyfs.*

In montosis apricis ad Wettin, Langenbogen. Apr. 24

445. *C. DIGITATA*, spica ♂ sessili, ♀ linearibus, squamis cuneatis mucronatis remotiusculis fructus obovatos rostratos pubescentes subaequantibus, bracteis vaginantibus mucronatis margine membranaceis. *Hofst I. 60. Schk. t. H. f. 38. Engl. bot. 615.*

In collibus herbidis nemorosis ad Erdeborn, Harnburg. Aug. 24

446. *C. PILULIFERA*, spicis ♀ subternis approximatis subrotundis, bracteis longioribus, fructibus subrotundis teretibus brevissime rostratis pubescentibus squama oblonga acuta brevioribus, culmo decumbente. *Schk. t. J. f. 39. C. filiformis fl. dan. 1048.*

In nemoribus subhumidis, der Heide, ad Gutenberg. Apr. Maio. 24

447. *C. COLLINA*, spicis ♀ subgeminis approximatis subrotundis, bracteis brevissimis, fructibus oblongis trigonis brevissime rostratis pubescentibus, squamam retusam subciliatam subaequantibus, foliis radicalibus annuinis culmo longioribus. *Willd. C. montana Leyfs. Hofst I. 66. Schk. t. T. f. 29. Sturm I. 2.*

In montosis nemorosis ad Seeben, Gutenberg. Maio. 24

262 CLASS. XVIII. MONOECIA.

1046. *C. CILIATA*, spicis 2 subgeminis approximatis oblongis, bracteis brevioribus, fructibus obovatis subteretibus pubescentibus squamam oblongam obtusam ciliatam excedentibus, *Schk. t. F. f. 42. C. ericetorum Wohl.*

In ericetis um die Heide her. Maio. 24

1047. *C. PRÆCOX*, spicis 2 subgeminis approximatis oblongis, bracteis infimis longioribus vaginantibus, fructibus subrotundo-trigonis pubescentibus squamam ovato-cuspidatam aequantibus, *Hofst I. 68. Schk. t. F. f. 27. C. glauclaris Leyss.*

In siccis sterilibus bei der Bergschenke, Gieschenstein. Apr. 24

1048. *C. TOMENTOSA*, spicis 2 binis oblongis, superiore nuda approximata, inferiore remota bracteata, fructibus subrotundis teretibus tomentosis squamam ovatam acutam superantibus, *Schk. t. F. f. 28.*

In pratis ad Schlettau, Beuchlitz rarius. Maio, Iun. 24

1049. *C. FLAVA*, spicis 2 subternis oblongo-subrotundis, brevissime pedunculatis, bracteis longissimi vaginantibus delflexis, fructibus ovatis subobliquis nervosis birostratis squamam oblongam emarginatam superantibus, culmo tereti, *Hofst I. 63. Schk. t. H. f. 36. Fl. dan. 1047. Engl. bot. 1294.*

In pratis humidis ad Dölau, in der Peisnitz, et Gutenberg, Liebenau. Maio, Iun. 24 *Ubi re-strum fructus rectiusculum est, vocatur C. Oederi Hofst I. 65. Schk. t. F. f. 26.*

4. *Spica mascula solitaria, femineis inferioribus pedunculatis.*

1050. *C. DISTANS*, spicis 2 subternis oblongis remotis, inferioribus pedunculatis bractea longissima vaginante suffultis, fructibus ovatis acumi-

patis triquetriâ nervosis squamam ovatam acutam superantibus, culmo teretiusculo. *Schk. t. T. Py. f. 68. Engl. bot. 1234. Fl. dan. 1049.*

In pratis ad Seeben frequens. Maio, Iun. 24

1051. *C. PANICEA*, spicis 2 subbinis remotis cylindricis bractea brevior suffultis, fructibus ovatis obtusis teretiusculis glabris remotiusculis squamas ovatas uninervias (fusco-atras) superantibus. *Schk. t. Ll. f. 100. Host I. 79.*

In pratis plerisque udis, copiose. Iun. 24

1052. *C. CAESPITOSA*, spicis 2 subternis remotis oblongis brevissime pedunculatis bractea longior suffultis, fructibus subrotundo-oblongis obtusiusculis squamam oblongam obtusam uninerviam (fusco-atram) superantibus. *Schk. t. Aa. Bb. f. 85. Host I. 91.*

In pratis fere omnibus. Iun. 24

1053. *C. FALLESCENS*, spicis 2 subternis oblongis longe pedunculatis cernuis, fructibus oblongis obtusissimis glaberrimis squamam oblongam mucronatam (viridem) lubaequantibus, culmo triquetro retrorsum scabro. *Schk. t. Kk. f. 99. Host I. 74. Fl. dan. 1050.*

In pratis et palcuis plerisque. Maio, Iun. 24

1054. *C. LIMOSA*, spicis 2 binis ovatis pendulis, fructibus triquetris brevissime rostratis glabris squamam ovatam mucronatam (spadiceam) lubaequantibus. *Schk. t. X. f. 78. Host I. 89. Fl. dan. 646. C. elegans Willd. berol.*

In paludibus ad Lieskau et Schmon rarius. Mai. 24

1055. *C. PSEUDO-CYPERUS*, spicis 2 quaternis pendulis elongato-cylindricis, fructibus ovato-acuminatis bicuspidatis striatis horizontalibus squamam setaceam aequantibus. *Schk. t. Mm. f. 102. Host I. t. 85. Engl. bot. 242. Fl. dan. 1117.*

264 CLASS. XVIII. MONOECIA.

In fossis ad Dieskau et Canena. Maio. 24

1056. *C. SYLVATICA*, spicis ♀ remotis filiformibus longe pedunculatis cernuis bractea longissima suffultis, fructibus remotiusculis ovato-acuminatis rostratis glabris squamam ovatam mucronatam superantibus. *Schk. t. Ll. f. 101. Host I. 84. Fl. dan. 404. C. drimeis Ehrh. Willd.*

In nemoribus humidis ad Seeben et alibi. Iun. Jul. 24

5. *Spicis masculis pluribus.*

1057. *C. FLACCA*, spicis ♂ geminis, ♀ subternis cylindricis longe pedunculatis pendulis bractea longiore suffultis, fructibus obovatis pubescentibus squamam lanceolatam (spadiceam) superantibus. *Schk. t. O. P. f. 57. Host. I. 90. C. recurva Good., Smith., Willd. Fl. dan.*
1051. *C. glauca Leyf.*

In paludibus ad Seeben, Dölau et alibi frequens. Iun. 24

- * 1058. *C. FILIFORMIS*, spicis ♂ geminis, ♀ subquaternis remotis oblongis breviter pedunculatis, fructibus ellipticis bicuspidatis hirsutis teretibus squamam lanceolatam cuspidatam subaequantibus. *Schk. t. K. f. 45. Host. I. 86. C. splendida Willd., Roth. C. lasiocarpa Ehrh.*

In paludibus ad Dölau, Lieskau, Iun. 24

1059. *C. ACUTA*, spicis ♂ subternis, ♀ subquaternis cylindrico-oblongatis cernuis, fructibus inferioribus remotis oblongis teretibus glabris brevissime rostellatis ore integro pertuso, squamam lanceolatam subaequantibus. *Schk. t. Ee. Ef. f. 92. Host. I. 95. Engl. bot. 580. C. gracilis Curt. n. 47.*

In aquosis et fossis frequens. Maio, Iun. 24

1060. *C. PALUDOSA*, spicis ♂ binis, ♀ ternis erectis cylindricis, fructibus triquetris ovatis leviter nervosis bidentatis squama lanceolata subaristata latioribus. *Schk. t. Oo. f. 101. Host. I. 92. C. acuta Curt. n. 47.*

In fossis et paludibus.

1061. *C. RIPARIA*, spicis ♂ aggregatis, ♀ ternis erectis elongato-cylindricis, fructibus teretibus ovatis striatis bifurcatis squama lanceolata cuspidata brevioribus. *Schk. t. Qq. f. 105. Engl. bot. 579. Fl. dan. 1118. Curt. n. 47. C. crassa Host. I. 93.*

In paludibus, fossis, fluvii vulgaris. Iun. 24

1062. *C. VESICARIA*, spicis ♂ subaggregatis, ♀ subgeminis ovalibus erectiusculis, fructibus ovato-lanceolatis bicuspidatis inflatis teretiusculis nervosis squamam lanceolatam superantibus, culmo exacte triquetro. *Schk. t. Ss. f. 106. Host. I. 98. Fl. dan. 647. Curt. n. 47. Sturm I. 2. C. inflata Roth.*

In paludibus sylvaticis ad Dölau, Iun. 24

1063. *C. AMPULLACEA*, spicis ♂ aggregatis, ♀ binis erectis cylindricis, fructibus horizontalibus subglobosis inflatis rostratis bifurcatis glabris, squama lanceolata latioribus, culmo trigono. *Schk. t. Ft. f. 107. Host. I. 99. C. vesicaria Roth.*

In paludibus ad Seeben, Dölau, Lieskau. Iun. 24

1064. *C. HIRTA*, spicis ♂ aggregatis, ♀ remotissimis oblongis breviter pedunculatis, bractea longissima, fructibus lanceolatis bicuspidatis hirtis squamam lanceolatam aristatam superantibus, foliis villosis. *Schk. t. Uu. f. 108. Host. I. 96. Engl. bot. 685.*

In versuris sabulosis ad Gutenberg, in der Heide. Iun. 24

466 CLASS. XVIII. MONOECIA.

363. SPARGANIUM.

no65. *SP. RAMOSUM*, foliis basi triquetris lateribus concavis, caule ramoso. *Curt. n. 58. Engl. bot. 744.*

In aquis lente fluentibus. Iul. 2.

no66. *SP. SIMPLEX*, foliis basi triquetris lateribus planis, caule simplici. *Curt. n. 58. Engl. bot. 745. Schk. t. 282.*

In aquis lente fluentibus priori frequentius. Iul. 2.

364. AMARANTUS.

no67. *A. BLITUM*, glomerulis axillaribus spicatis, foliis rhombeo-ovatis retusis, caule diffusis. *I. Bauh. hist. II. 967.*

In cultis passim. Aug. ☉

TETRANDRIA.

365. URTICA.

no68. *U. URENS*, foliis oppositis ellipticis subquiquenerviis serratis, spicis glomeratis axillaribus folio brevioribus. *Curt. n. 64. Fl. dan. 739. Engl. bot. 1236.*

In cultis ruderalis, ad sepes ubique. Aest. ☉

no69. *U. DIOICA*, foliis oppositis cordatis serratis, paniculis geminis folio longioribus, floribus subdioicis. *Curt. n. 64. Fl. dan. 746.*

In ruderalis, sepibus vulgatissima. Aest. ☉

366. ALNUS.

no70. *A. GLUTINOSA*, foliis subrotundo-cuneatis subretusis repandis serratis glutinosis, axillis venarum subtus villosis. *Kerner 2. t. 14. Betula Alnus L.*

In pratis udis, ad ripas Salae vulgaris. Mart. ☿

OCTANDRIA. POLYANDRIA. 267

OCTANDRIA.

367. MYRIOPHYLLUM.

1071. *M. SPICATUM*, foliis omnibus pinnatis capilla-
ceis, spica terminali verticillata nuda. *Schk.*
t. 296. *Fl. dan.* 681. *Engl. bot.* 83.

In fossis et stagnis fere omnibus. Iul. Aug. 24.

1072. *M. VERTICILLATUM*, foliis pinnatis capillaceis,
summis pectinato-pinnatifidis, floribus axilla-
ribus verticillatis. *Fl. dan.* 1046. *Engl. bot.* 218.

In fossis et stagnis rarius. Iul. Aug. 24.

368. CORYLUS.

1073. *C. AVELLANA*, stipulis oblongis obtusis, caly-
cibus fructus campanulatis apice patulis lacero-
dentatis. *Schk.* *t.* 305. *Engl. bot.* 723.

In nemoribus copiose. Mart. 5.

POLYANDRIA.

369. ARUM.

1074. *A. MACULATUM*, acaule, foliis hastato-sagitta-
tis, lobis deflexis, spadice clavato. *Curt.*
n. 19. *Fl. dan.* 505. *Engl. bot.* 1298.

In nemoribus humidis, in Lafontaine's Garten,
auf der Rabeninsel, bei Liebenau etc. Maio. 24.

370. SAGITTARIA.

1075. *S. SAGITTAEFOLIA*, foliis sagittatis acuminatis,
scapo simplici. *Schk.* *t.* 298. *Fl. dan.* 172.
Engl. bot. 84.

In Sala, piscinis fere omnibus. Iun. Iul. 24.

Quandoque folia lanceolata, graminea obser-
vantur. Cf. *Quensel in svensk bot. ad t.* 164.

371. POTERIUM.

1076. *P. SANGUISORBA*, inerme, caulibus subangulo-

368 CLASS. XVIII. MONOECIA.

lis. *Schk. t. 300. Curt. n. 15. Engl. bot. 806.*

In montosis calcareis, auf dem Vogelsberge bei Benüßstädt, bei Helmsdorf, Belsenstädt passim.
Iun. 4

372. CERATOPHYLLUM.

1077. *C. DEMERSUM*, foliis dichotomo - bigeminis, fructibus 3-spinosis. *Schk. t. 297. Engl. bot. 947.*

In aquis stagnantibus, fossis. Iun. Iul. 4

1078. *C. SUBMERSUM*, foliis dichotomo - trigeminis, fructibus muticis. *Fl. dan. 510. Engl. bot. 679.*

In aquis stagnantibus rarius. Iun. Iul. 4

373. QUERCUS.

1079. *QU. ROBUR*, foliis oblongis basi attenuatis petiolatis glabris sinuatis lobis rotundatis, fructibus oblongis sessilibus. *Schk. t. 301. b. Engl. bot. 1342. Kerner t. 8.*

In sylvis, nemoribus. Iun. 5

1080. *QU. PEDUNCULATA*, foliis oblongis basi attenuatis subsessilibus glabris sinuatis lobis rotundatis, fructibus oblongis pedunculatis. *Fl. dan. 1180. Kerner t. 9. Schk. t. 301. a.*

In sylvis, nemoribus. Maio. 5

374. FAGUS.

1081. *F. SYLVATICA*, foliis ovatis glabris repandis subundulatis ciliatis. *Schk. t. 303. Kerner t. 10.*

In sylvis ad Erdeborn, Lodersleben. Maio 5

MONADELPHIA.

375. BETULA.

1082. *B. ALBA*, foliis ovato - deltoideis acuminatis duplicato - serratis glabris. *Schk. t. 288.*

In sylvis copioso. Apr. Maio. 5 *Variat ramis pendulis elongatis tuberculato-scabris. (E. pendula Roth.)*

376. PINUS.

083. *P. sylvestris*, foliis geminis rigidis, strobilis junioribus pedunculatis recurvis. *Lambert pin. t. 1. Kerner t. 3.*

In sylvis. Maio. 24

084. *P. Abies*, foliis solitariis tetragonis erectiusculis, strobilis cylindricis, squamis rhombeis complanatis margine repandis erosis. *Lamb. t. 25. Fl. dan. 193. Schk. t. 308. Kerner t. 2.*

In sylvis. Maio. 24

377. CARPINUS.

085. *C. Betulus*, foliis ovatis acuminatis duplicato-ferratis, strobilorum squamis tripartitis. *Schk. t. 304. Kerner t. 11.*

In sylvis ad Erdeborn, Loderaleben. Maio. 5

378. TYPHA.

086. *T. latifolia*, foliis linearibus planis, spicis cylindricis approximatis. *Curt. n. 29. Fl. dan. 645. Schk. t. 281.*

In piscinis, fossis profundioribus. Iul. 24

087. *T. angustifolia*, foliis linearibus canaliculatis, spicis cylindricis remotis. *Curt. n. 29. Fl. dan. 815.*

In stagno Kölmensi. Iul. 24

379. XANTHIUM.

088. *X. strumarium*, inerme, foliis cordatis trinerviatis lobato-ferratis. *Fl. dan. 970.*

In ruderalis rarius. Iul. ☉

380. BRYONIA.

089. *B. alba*, foliis cordatis quinquelobis dentr-

tis callōso-punctatis scabris, floribus racematis. *Schk. t. 316.*

In sepibus vulgaris. Jun. 24

CLASSIS XIX.

D I O E C I A.

381. VISCUM. *Cal.* corollinus 4-fidus. *Antherae* paucae subrotundae sessiles. *Stam.* o. *Styl.* o. *Bacca* polysperma.

382. SALIX. *Flores* amentacei. *Glandula* nectarifera ad basin squamae. *Stam.* pauca. *Stigm.* 2. *Capf.* 1-ocularis 2-valvis. *Sem.* basi lanata.

383. JUNIPERUS. *Strobili* singuli antheras et germina colligentes. *Antherae* paucae margini squamarum infidentibus globosae. *Strobilus* ♀ in galbulum sphaeriticum apice trifurcatum tripterium coalescens. *Nucula* 1-ocularis.

384. HUMULUS. ♂ *Cal.* 5-phyllus. *Antherae* 5 apice biporosae. ♀ *Amentum* squamae binae 4-florae. *Squama* interna simplex. *Styli* 2. *Sem.* 1 arillatum.

385. POPULUS. *Flores* amentacei. *Squa-*

mae multifidae. Cor. infundibuliformis integra. Antherae plurimae. Stigm. 4. Caps. 1-locularis 2-valvis. Sem. basi lanata.

386. MERCURIALIS. *Cal. 3-partitus. Cor. o. Antherae plurimae didymae. Styli 2. Sem. 2 arillata.*

387. HYDROCHARIS. *Cal. 3-fidus. Cor. 3-petala. ♂ Filamenta plurima, trium interiorum appendiculi styliiformes. ♀ Styli 6 bifidi; filamenta 3 sterilia. Caps. 6-locularis polysperma.*

† *Si ab Humulo recesseris, antherarum numerus in tota classe varius; nec lanipetrus ad monadelphiam referenda.*

† *Valeriana dioica (III). Rhamnus catharticus. Ribes alpinum (V). Rumex Acetosa. Acetosella (VI). Cucubalus Otites. Lychnis sylvestris, pratensis (VIII). Urtica dioica (XVIII).*

381. VISCUM.

1090. V. ALBUM, foliis lingulatis integerrimis terminalibus oppositis, caule dichotomo, capitulis axillaribus. *Schk. t. 320. Sturm I. 8.*

Parasiticum in Pyro Malo et communi, tum in Quercubus, Mart. † *Frequenter rami evulsi in der Heide inveniantur.*

382. SALIX.

• *Foliis ferratis glabriusculis.*

1091. S. HELIX, monandra erecta, foliis lanceolatis utrinque attenuatis serrulatis glabris subtus glaucescentibus, stipulis nullis, stylo elongato filiformi, stigmatibus linearibus, capsula lanata. *S. monandra Engl. bot. 1343. Curt. n. 61. Hofm. sal. t. 1. 23. f. 1. S. purpurea Leyfs.*

1092. S. TRIANDRA, triandra arborea, foliis oblongo-lanceolatis subtus glaucescentibus serratis serraturis inflexo-glandulosis, stipulis glabris ovatis crenatis deciduis, amentorum squamis villosis, capsulis glaberrimis pedicellatis. *Curt. n. 62. Hofm. sal. t. 9. 12. 23. f. 2.*

1093. S. AMYGDALINA, triandra fruticosa, foliis ovato-acuminatis, basi inaequalibus serratis subtus glaucescentibus, stipulis semicordatis crenatis maximis, amenti squamis glabris, capsulis pedicellatis glaberrimis. *Linn. fl. lapp. t. 8. f. 2.*

Tres hae species vulgares ad ripas Salae, in pratis salicetis. Maio. ♀

- 1094. S. PENTANDRA, arborefcens, foliis ovalibus basi attenuatis crenulatis glabris subtus glaucis, stipulis subnullis, amenti squamis rotundatis basi villosis, capsulis glabris pedicellatis. *Fl. dan. 943. Linn. fl. lapp. t. 8. f. 2.*

In sylvis ad Lodersleben. Maio. ♀

1095. S. FRAGILIS, diandra arborefcens, foliis lanceolatis acuminatis glaberrimis serratis, serraturis inflexis glandulosis, petiolis dentato-glandulosis, stipulis rotundatis obsolete dentatis deciduis, nectario gemino. *S. decipiens Hofm. sal. t. 31. Linn. fl. lapp. t. 8. f. b.*

In pratis, ad ripas Salae. Maio. ♀

•• *Folii pubescentibus.*

195. *S. vusca*, diandra fruticuloso-erecta, foliis longius petiolatis ovali-oblongis acutis obsolete denticulatis, margine glandulosis, supra glabris subtus glauco-sericeis, capsulis pedicellatis villosis. *Linn. fl. lapp. t. 8. f. r.*

In ericetis udis ad Lieskau, auf der Benndorfer Wiese am Löberbach. Maio. †

197. *S. aepens*, diandra, fruticuloso-radicans, foliis lanceolatis integerrimis acutis, supra glabris subtus glaucis subsericeis, stipulis nullis, capsulis subsessilibus glabriusculis birostratis. *S. depressa Winkl. S. pumila linifolia Buxb.*

191. *S. pumila Reicheid t. 27.*

In palude turfosa ad Dölau, Nietleben, Lieskau, Benndorf. Maio. † (*Huc S. glauca, incubacea, et rosmarinifolia amicorum, non verae.*)

198. *S. avarta*, diandra fruticosa, foliis ovatis adunco mucronulatis, utrinque villosis reticulato-venosis, stipulis polymorphis, capsulis longius pedicellatis subulatis villosis. *Hofm. sal. t. 22. f. 1. t. 5. f. 3. (S. caprea Leyf.)*

In sepibus humidiusculis ad Dieskau. Maio. †

199. *S. caprea*, diandra arborea, foliis ovatis acuminatis undulatis repando-serratis, supra glabriusculis, subtus dense tomentosis venosis, stipulis sublunatis, capsulis pedicellatis ovatis birostratis villosis. *Hofm. sal. t. 3. 31.*

In sepibus, nemoribus ad Nietleben. Apr. †

200. *S. acuminata*, diandra arborefcens, foliis oblongo-lanceolatis acuminatis repandis apice dentatis, supra glabris, subtus tomentosis venosis, stipulis reniformibus dentatis, capsulis pedicellatis subulatis pubescentibus. *Hofm. sal. t. 6. 22. Engl. bot. 1434.*

In humidiusculis nemorosis, ad Dieskau. Apr. †

1101. *S. VIMINALIS*, diandra fruticosa, foliis lanceolato-linearibus longissime acuminatis integerrimis subtus sericeis, ramis virgatis, stylo elongato. *Hofm. sal. t. 2. 5. 21. Svensk. b. t. 217.*

Ad ripas Salae. Apr. 5

1102. *S. ALBA*, triandra arborea, foliis lanceolatis acuminatis serratis utrinque sericeis, serraturis infimis glandulosis, capsulis subsessilibus glabris birostratis. *Hofm. sal. t. 7. 8.*

In pratis, ad ripas fluviorum ubique. Apr. 1
(Subest *S. vitellina* Leyss.)

383. JUNIPERUS.

1103. *J. COMMUNIS*, foliis ternis patentibus natis nato-spinosis. *Fl. dan. 1119. Engl. bot. t. 110. Schk. t. 338.*

In sylvaticis arenosis hinter der Heide. Apr. 5

384. HUMULUS.

1104. *H. LUPULUS*, *Fl. dan. 1239. Engl. bot. 47. Schk. t. 326.*

In sepibus, dumetis frequens. Aug. 24

385. POPULUS.

1105. *P. ALBA*, foliis cordato-subrotundis lobatis dentatis subtus niveo-tomentosis, junioribus subpalmatis, amentis ovatis. *L. Bauh. I. 2. 100. P. nivea Willd. Baumz. 227.*

In dumetis humidis. Mart. Apr. 5

1106. *P. CANESCENS*, foliis subrotundis angulatis repandis subtus cinereo-tomentosis, amentibus cylindricis laxis. *Smith. I. Bauh. I. c.*

In pratis, ad fossas vulgaris. Mart. Apr. 5

1107. *P. TREMULA*, foliis suborbiculatis dentato-repandis utrinque glabris, petiolis compressis, ramulis hirtis. *Kerner t. 27.*

Ad pagos frequens. Mart. Apr. 5.

1103. *P. nigra*, foliis deltoideis, acuminatis serratis glabris, petiolis subhirsutis. *Kern. t. 28.*

In pratis frequens. Mart. Apr. 5.

386. MERCURIALIS.

1104. *M. perennis*, caule simplicissimo, foliis scabris, radice repente. *Curt. n. 14. Fl. dan. 400.*

In nemoribus montosis, dem Zorge und Lindberg. Apr. Maio. 2.

1110. *M. annua*, caule brachiato, foliis glabris, radice fibrosa. *Schk. t. 332. Curt. n. 57. Engl. bot. 559.*

In hortis copiose. Aest. G.

387. HYDROCHARIS.

1111. *H. Montana* *nana*. *Curt. n. 28. Fl. dan. 878. Schk. t. 333. Engl. bot. 808.*

In der Elster ad Ratzeburg copiose. Iul. 2. *Folia reniformia integerrima; flores albi.*

CLASSIS XX.

A T E L I A.

(Organa fructificationis vel incompleta, vel dubia, vel nulla.)

ÆTHROGAMIA.

(Organa fructificationis dubia, incompleta.)

388. CHARA. Bacca 1-lobularis, polysperma apice 5-dentata. Globularillo

diaphano supra aut infra aut inter fructus sessiles, nunquam dehiscentes, filis moniliformibus farcti. (*Antherae esse fere nequeunt, quum nunquam dehiscant. Gemmae ne? Analogia suadet cum globulis Anthocerotis, Riccias, Blasiae, maxime vero cum globulis gemmiferis Ectospermarum Vaucl. Cf. Conserua furcata.*)

389. EQUISETUM. Racemus amentaceus, squamis peltatis. Involucella bivalvia. Sem. nuda taeniis 4 spathulatis polliniferis (?) circumplexata.

390. LYCOPODIUM. (*Lepidotis Palisot-Beauvois.*) *Antherae* bivalves bracteatae? *Fructus?*

II. EPIPHYLLOSPERMAR.

* *Gyratae.*

† *Nudae.*

391. POLYPODIUM. Capsulae in punctis subrotundis sparsis.

†† *Indusio velatae.*

392. ASPIDIUM. Capsulae in punctis subrotundis sparsis. Indusium umbilicatum undique demum hiscens.

393. ATHYRIUM. Capsulae in punctis subrotundis sparsis. Indusium laterale, hinc dehiscens.

394. ASPLENIUM. *Capsulae* in lineolis rectis sparsis. *Indusium* laterale, introrsum dehiscens.

395. PTERIS. *Capsulae* in linea continua marginati. *Indusium* e margine frondis inflexo, introrsum dehiscens.

396. ONOCLEA. *Capsulae* confertae, dorsum totum frondis contractum tegentes. *Indusium* e margine frondis revolutum interius dehiscens.

397. BLECHNIUM. *Capsulae* in lineis continuis nervo medio utrinque proximis. *Indusium* continuum interius dehiscens.

III. PTEROIDES.

(*Capsulae* agyratae in spicis s. racemis dispositae.)

398. OSMUNDA. *Capsulae* 2-valves 1-loculares reticulatae in racemo paniculato collocatae.

399. BOTRYCHIUM. *Capsulae* evalves 1-loculares globosae glabrae in racemum dispositae.

400. OPHIOGLOSSUM. *Capsulae* 1-loculares in spicam articulata distiche dispositae, transversim dehiscentes.

IV. MUSCI FRONDOSI.

* *Capsula operculo destituta.*401. PHASCUM. *Peristomium nullum.*** *Capsula operculata.*† *Peristomium nudum.*402. SPHAGNUM. *Calyptra medio transversim rupta.*403. GYMNOSTOMUM. *Calyptra integra secedens.*†† *Peristomium figuratum simplex.*404. TETRAPHIS. *Peristom. dentibus 4 liberis.*405. SPLACHNUM. *Peristom. dentibus 8 geminis; capsula cum apophysi.*406. ENCALYPTA. *Peristom. dentibus 16 simplicibus integris; seta terminalis; calyptra campaniformis maxima.*407. GRIMMIA. *Peristom. dentibus 16 simplicibus integris; seta terminalis; calyptra exilis.*408. MASCHALOCARPUS. *Peristom. dentibus 16 simplicibus integris; seta axillaris.*409. DICRANUM. *Peristom. dentibus 16 simplicibus flexis solidis fissis.*

410. TRICHOSTOMUM. *Peristom.* dentibus 16 simplicibus rectis capillaribus fissis.

411. DIDYMODON. *Peristom.* dentibus 16 geminis.

412. POLYTRICHUM. *Peristom.* dentibus 32 brevibus apice epiphragmate nexis.

413. BARBULA. *Peristom.* ciliis numerosis tortilibus.

††† *Peristomium figuratum duplex.*

Γ *Dentes externi* 8, 16 apice liberi,

414. ORTHOTRICHUM. *Perist.* int. *Cilia* fornicata basi libera.

415. NECKERA. *Perist.* int. *Cilia* recta basi libera.

416. CLIMACIUM. *Perist.* int. *Cilia* recta basi libera, trabeculis transversalibus nexa.

417. LESKEA. *Perist.* int. *Membrana* dentibus uniformibus coronata,

418. BARTRAMIA. *Perist.* int. *Membrana* plicata dentibus geminis uniformibus coronata. *Capf.* subglobosa.

419. BRYUM. *Perist. int. Membrana plicata dentibus integris et interpositis ciliis coronata.*

420. MNIMUM. *Perist. int. Membrana plicata dentibus foratis et interpositis ciliis coronata. Seta terminalis.*

421. HYPRUM. *Perist. int. Membrana plicata dentibus foratis et interpositis ciliis coronata. Seta axillaris.*

422. FONTINALIS. *Perist. int. Reticulum conicum.*

423. BUXBAUMIA. *Perist. int. Fila multiplicia conica. Perist. ext. Dentes truncati brevissimi.*

FF *Dentes externi apice cohaerentes.*

424. FUNARIA. *Perist. int. Cilia fornicata.*

V. HEPATICAE.

425. ANTHOCEROS. *Caps. filiquosa corniculata 2-valvis, columnula media libera. Semina catenulis nexa. Gemmulae globosae aggregatae intra frondem.*

426. JUNGERMANNIA. *Caps. 4-valvis. Semina filis spiralibus nexa.*

VI. HOMALLOPH. VII. LICHEN. 202

427. MARCHANTIA. *Capf.* multivalvis
sub peltis radiatis pedicellatis. *Semina*
filis spiralibus nexa. *Gemmulae* dupli-
ces in cyathis et peltis.

VI. HOMALLOPHYLLAE.

428. TARGIONIA. *Capf.* globosa in in-
volucro bivalvi sub apice frondis la-
tens. *Sem.* filis nexa.

429. RICCIA. *Capf.* globosa intra sub-
stantiam frondis latens, apice demum
forata. *Sem.* nuda, utriculis diaphanis
sub 3 locularibus primum inclusa.

VII. LICHENES.

* *Idiothalami.*

† *Semen pulverulentum.*

430. OPEGRAPHIA. *Apothecia*, lirellae.
Thallus crustaceus.

431. LECIDEA. *Apothec.* patellae. *Thal-*
lus crustaceus, foliaceus.

432. URCEOLARIA. *Apothec.* patellae
scutelliformes urceolatae, margine ac-
cessorio spurio. *Thallus* crustaceus.

433. CALICIUM. *Apothec.* pilidia. *Thal-*
lus crustaceus.

434. GYROPHORA. *Apothec.* tricae.
Thallus foliaceus umbilicatus.

282 CLASS. XX. ATHELIA.

†† *Semen catenulatum.*

435. VERRUCARIA. *Apothec. tubercu-*
la. Thallus crustaceus.

††† *Semina thecis diaphanis obvoluta.*

436. ENDOCARPON. *Apothec. thala-*
mium intra frondem reconditum. Thal-
lus membranaceus.

** *Coenothalamia.*

437. SPHAEROPHORON. *Cistula thal-*
lo vestita apice lacero dehiscens. Thal-
lus fruticulofus.

438. BAEOMYCES. *Cephalodium non*
marginatum, membrana feminifera ob-
ductum, nucleo thallode, podetiis suf-
fultum. Thallus foliaceus fruticulofus.

439. USNEA. *Orbillae planae ambitu ra-*
diatae. Thallus loreus filamentofus
fruticulofus.

440. CORNICULARIA. *Orbillae scute-*
lifformes convexiusculae. Thallus car-
tilagineus fruticulofus.

441. THELOTREMA. *Thalamia multi-*
locularia, femina thecis diaphanis ob-
voluta. Thallus crustaceus cartilag-
neus.

442. **PARMELIA.** *Apothec. scutellae.* *Sem. tubulis inclusa. Thallus crustaceus, foliaceus, filamentosus.*

443. **PELTIDEA.** *Apothec. peltae. Sem. tubulis inclusa. Thallus foliaceus lobatus, subtus fibrillosus.*

444. **CETRARIA.** *Apothec. peltae scutellaeformes centro adnatae. Thallus foliaceus margine crispus utrinque nudus.*

VIII. ALGAE.

445. **CONFERRA.** *Tubuli subgeniculati, utriculis cylindricis massam granulofam continentibus.*

446. **ULVA.** *Membrana diaphana, granulis sparsis innatis.*

447. **RIVULARIA.** *Substantia gelatinoso-cartilaginea hyalina, nuda. Filamenta articulata recta subramosa per totam substantiam.*

448. **LINKIA.** *Substantia gelatinosa hyalina membrana obvoluta. Filamenta articulata curvata per totam substantiam.*

449. **TREMELLA.** *Substantia gelatino-*

sa hyalina membrana obvoluta. *Gemma* membranae superficialis inaequalis.

IX. GASTROMYCEI. 2199

* *Sclerocarpi*. (*Xylomyces* Pers.)

450. SPHAERIA. *Perithecia* sphaerica intus gelatinosa thecis spermatorum farcta.

451. STILBOSPORA. *Massa* nigra serpens e sporulis constans.

452. NEMASPORA. *Gelatina* flexibilis lente amorphae in cirrhis prorumpens.

453. XYLOMA. *Perithecia* nuda suborbicularia inaequalia debilem rima farctum.

454. HYSTERIUM. *Perithecium* oblongum rima longitudinali.

** *Sarcocarpi*.

455. SCLEROTIUM. *Corpus* carnosum connexum, vesiculis farctum.

456. SPHAEROBOLUS. *Receptaculum* globosum radiatum fissum, vesiculis inclusam elastice protrudens.

457. PILOBOLUS. *Receptaculum* stipitiforme hydrophorum, cui imposita vesicula elastice defiliens.

*** *Dermatocarpi.*

Trichosporium.

458. TULOSTOMA. *Peridium* stipitatum, ore cylindrico cartilagineo.

459. EGIVISTA. *Peridium* laeve sessile, cortice exteriori demum evanescente, apice irregulariter hiscente.

460. LYCOPERDON. *Peridium* verrucis tubiformi caulescens, apice demum ruptum.

461. GEASTRUM. *Volvatum*. *Peridium* radiatum fissum ore piloso.

462. LYCOGALA. *Peridium* subrotundum laeve, substantia pulposa primum, dein pulvere filis raris intertexto farctum.

463. FULIGO. *Peridium* effusum, primo pulposum, dein fibroso-cellulosum, demum pulverulentum.

464. PHYSARUM. *Peridium* duriusculum subfarinaceum, filis reticulatis adnatis latentibus.

465. TRICHIA. *Peridium* glabrum inaequaliter ruptum. *Capillitium* compactum elastico expansum.

466. ARCYRIA. *Peridium* circumscissum. *Capillitium* ovatum peridio calculato impositum.
467. STEMONITIS. *Peridium* tenuissimum evanescens. *Capillitium* columnulae adnatum.
468. CRIBRARIA. *Peridium* tenuissimum aut totum aut dimidium levissimum. *Capillitium* filis reticulatis cancellatum pulverem congestum ambiens. Cf. *Batsch el. fung. t. 42. f. 232.*
469. DIDERMA. *Peridium* duplex, exterius fragile, interius pellucidum. Fila latentia columnulae ovali adnata.
470. SPUMARIA. *Peridium* duplex effusum, exterius furfuraceum, interius persistens ramoso-cornutum.
- †† *Gymnospirmi.*
471. MUCOR. *Peridium* stipitatum subglobosum, primum aquosum fugax.
472. TUBULINA. *Peridia* tubulosa caespitem connata stromati membranaceo imposita.
473. CHAENOCARPUS. *Peridium* ovale superne longitudinaliter debile

pulvere centrali, stromati fetoso infidens.

474. RÖSTELIA. *Peridium* e filis conice cohaerentibus compositum, stromati solido infidens.

475. AECIDIUM. *Peridia* cylindrica ore plerumque dentato dehiscentia.

476. PUCCINIA. *Peridia* turbinata septulis interstincta.

477. UREDO. *Peridium* effusum ab epidermide formatum; pulvere uniformi globuloso prorumpente.

††† *Sarcospermi.*

478. CYATHUS. *Peridium* campanulatum coriaceum, fructibus lentiformibus repletum.

X. FUNGI.

* *Eurothecii.*

479. PHALLUS. *Volvatus*. *Pileus* ovatus stipitatus, hymenio reticulato liquescente.

480. TUBERCULARIA. *Hemisphaerica*, hymenio gelatinoso glabro.

** *Hymenothecii.*

481. AMANITA. *Volvata*; hymenium lamellosum.

482. AGARICUS. *Evolveratus*, *Hymenium lamellosum.*

483. MERULIUS. *Hymenium venosum*,
venis turbidulis.

484. DAEDALEA. *Hymenium* fructu
poriformibus reticulatum.

485. BOLETUS. *Hymenium tubulis* poro-
porum.

486. SISTOTREMA. *Hymenium* poro-
porum gyrolo-porosum, dein dentibus
difformibus lacerum.

487. HYDNUM. *Hymenium echinatum.*

488. THELEPHORA. *Hymenium* sub-
capitatum uniforme subpapillosum.

*** *Dermatothecii.*

489. CLAVARIA. *Clavaeformis similis*
stipiti continua. (Huc Merisma Ref.)

490. GEOGLOSSUM. *Clavaeformis mar-*
gine prominenti, stipiti contigua.

491. SPATHULARIA. *Pileus compressus*
membranaceus in stipitem recur-
rens.

492. LECTIA. *Pileus subrotundus mar-*
gine reflexus stipitem ambiens.

1. **HELVELLA.** *Pileus* difformis utrinque deflexus.

2. **MORCHELLA.** *Pileus* areolis lacunosus.

3. **PEZIZA.** *Corpus* concavum f. cuculiforme. *Hymenium* thecis spermatophoris farctum.

4. **STILBUM.** *Capitulum* stipitatum obaquosum, dein compactum.

XI. BYSSI.

1. **RHIZOMORPHA.** *Filam.* ramosa rentia solida, medulla stupacea farcta.

2. **HIMANTIA.** *Filamenta* villosa, ramoso-fibrosa.

3. **RACODIUM.** *Filamenta* densissime intertexta pannosa.

4. **MONILIA.** *Fila* moniliformia f. stipitata aut effusa.

5. **DEMATIUM.** *Fila* breviter erecta fasciculata aut caespitosa.

6. **ERINEUM.** *Fila* rigida grumosa in caespitulum foliis appressum glomerata.

7. **ISARIA.** Simplex aut ramosa subpyriformea molliuscula alba pulvere farinaceo oblecta.

L. AETHEOGAMIA.

388. CHARA.

1112. *Ch. vulgaris*, caule ramulisque verticillatis basi nudis striatis, articulis foliolis, foliolis oblongo-subulatis, bracteis bacca brevioribus. *Willd. sp. pl.* Hedw. *theor. gen.* t. 32. 33. *Engl. bot.* 335.

In aquis stagnantibus vulgarissima. Aest. ☉ *Herba hepatis sulfuris redolet, crusta terrea nonnullam obducta.*

1113. *Ch. hispida*, caulibus ramulisque verticillatis basi nudis striatis, articulis foliolis, foliolis tereti-subulatis. *Fl. dan.* 154. *Engl. bot.* 463.

In aquis salis frequens ad Köhne, Langenborge. *Aug.* ☉

1114. *Ch. flexilis*, caulibus diaphanis nudis, ramulis aphyllis verticillatis bifurcatis, bracteis obracteatis. *Schmidel ic.* t. 14. *Schk.* t. 280. *Hippuris satis bifurcis* *Buch.* 160.

In fossis ad Teutschenthal rarius. Sept. ☉

389. EQUISETUM.

1115. *E. hyemale*, caule nudo scabro basi submerso, vaginis basi apiceque sphacelatis integumentis terminali. *Bolt. fil.* t. 39. *Engl. bot.* 915.

In paludibus ad Oberschmon, Zöckeritz, huius terfeld. Aug. 2.

1116. *E. limosum*, caule nudiusculo ramisque nullis laevibus, vaginis setaceo-multifidis, integumentis terminali. *E. fluviatile* *Fl. dan.* 1184. *Bolt. fil.* t. 38. *Engl. bot.* 929.

In inundatis ad fossas pratorum passim. Jap. 2.

1117. *E. palustre*, caule ramisque angulatis laevibus, vaginis setaceo-multifidis, densis

I. AËTHEOGAMIA.

291

patentibus margine scariosis, amento terminali.
Fl. dan. 1183. *Bolt. fil.* t. 35.

In pratis spongiosis. Iun. 24

118. *E. ARVENSE*, caulibus sterilibus undique ramosis, ramis subangulatis scabriusculis, vaginis distantibus late incisfis, amento terminali.
Curt. n. 48. *Bolt. t.* 34.

In campis sterilibus ubique. Iun. 24

119. *E. PRATENSE*, caule striato ramisque angulatis scabris, vaginis arctis apice breviter dentatis, amentis ramorum lateralium numerosis.
Ehrh.

In pratis rarius ad Lettin. Iun. 24

120. *E. SYLVATICUM*, caule sterili ramosissimo, ramis compositis arcuato-deflexis scabris, vaginis latissimis incisfis scariosis. *Fl. dan.* 1182.
Bolt. t. 32. 33.

In nemoribus umbrosis, ad Liebenau. Maio. 24

390. LYCOPODIUM.

121. *L. CLAVATUM*, caulibus prostratis radicanibus, foliis confertis linearibus apice piliferis. *Dill. musc. t.* 58. f. 1. *Fl. dan.* 126. *Engl. bot.* 224.
Sturm II. 5.

In nemoribus montosis Zorge et Lindberg. Iul. Aug. 24

122. *L. COMPLANATUM*, caule prostrato, ramis erectis, foliis bifariis connatis, superficialibus solitariis. *Dill. musc. t.* 59. *Fl. dan.* 78.
Sturm II. 5.

In sylvis ad Lodersleben. Iul. Aug. 24

II. EPIPHYLLOSPERMAE.

391. POLYPODIUM.

123. *P. VULGARE*, frondē pinnatifida, laciniis oblongis obtusis subserratis, radice squamata:

Curt. n. 12. Schk. krypt. t. 11. Sturm I. 1. Engl. bot. 1149. Fl. dan. 1060.

In rupibus ad Giebichenstein, in locis umbrosis montosis vulgare.

1124. *P. PRæOPTERIS*, fronde pinnata, pinnis lanceolatis acuminatis pinnatifidis basi coadunatis, imis reflexis. *Schk. krypt. t. 20. Bolt. fil. t. 20. a. b.*

In nemoribus umbrosis ad Lodersleben.

1125. *P. DAYOPTERIS*, fronde ternata bipinnata, laciniis obtusis subcrenatis. *Schk. t. 25. Engl. bot. 616. Bolt. fil. t. 23. Sturm II. 1.*

In nemoribus montosis ad Schmon.

392. ASPIDIUM.

- * 1126. *A. OROPTERIS*, fronde pinnata, pinnis pinnatifidis, laciniis obtusis integerrimis subus planis, punctis seminum marginalibus approximatis; indusis fugacibus. *Schk. t. 35. 36. Fl. dan. 1121. Engl. bot. 1019.*

In der Heide, hinter dem Fasanenhaufe passim.

1127. *A. FILIX MAS*, fronde bipinnata, pinnulis obtusis ferratis, stipite paleaceo. *Bolt. t. 24.*

In nemoribus umbrosis frequens.

1128. *A. DILATATUM*, fronde bipinnata, pinnulis ovato-oblongis pinnatifidis, lacinulis inciso-ferratis spinulosis, stipite rhachique paleacea. *Roth., Smith. Pluken. phyt. t. 181. f. 3. Polypodium cristatum Leyfs. Bolt. t. 23.*

In nemoribus humidis ad Seeben, in der Heide et alibi frequens.

393. ATHYRIUM.

1129. *A. FRAGILE*, fronde bipinnata, pinnulis remotis pinnatifidis, lacinulis inciso-ferratis obtusiusculis, stipite laevi. *Pluken. phyt. t. 180. f. 5. Bolt. t. 27.*

II. EPIPHYLLOSPERMAE. 293

In fissuris rupium montis sereni, in den Hohlwegen der Heide. (*Huc sine dubio Polyp. regium Leyf's. et Filix rhaetica Buxb.*)

1130. A. FILIX FEMINA, fronde bipinnata, pinnis pinnatifidis pinnulisque lanceolatis, lacinulis apice 2—3-dentatis. *Pluken. phyt. t. 180. f. 4. Bolt. fil. t. 25. Polyp. dentatum Hofm. Sturm II. 1.*

In nemoribus umbrosis, ad Seeben etc. frequens. *Variat pinnulis angustioribus, sublinearibus et ovalibus obtusiusculis.*

394. ASPLENIUM.

1131. A. SEPTENTRIONALE, stipite nudo superne bipartito, foliolis linearibus apice laciniatis. *Acrostichum septentrionale L. Fl. dan. 60. Sturm II. 5. Engl. bot. 1017.*

In fissuris rupium ad Giebichenstein et Kröllwitz.

1132. A. TRICHOMANES, fronde pinnata, pinnis ovato-subrotundis crenatis, stipite nitido (atro-purpureo) subtus carinato. *Fl. dan. 119. Engl. bot. 576. Bolt. fil. t. 13.*

In fissuris rupium frequens.

1133. A. RUTA MURARIA, fronde alternatim decomposita, pinnis rhomboideo-cuneiformibus subtrilobis apice crenatis. *Fl. dan. 190. Engl. bot. 150. Bolt. t. 16.*

In muris antiquis frequens.

1134. A. ADIANTUM NIGRUM, fronde deltoidea alternatim subtripinnata, pinnulis ovato-lanceolatis inciso-segatis. *Fl. dan. 250. Sturm II. 5. Bolt. t. 17.*

In rupibus ad Giebichenstein, linker Hand vom Dorfe, rarissime.

395. PTERIS.

1135. PT. AQUILINA, fronde supradecomposita, pin-

nulis lanceolatis superioribus integerrimis infimis crenato-pinnatifidis. *Sturm II. 1.*

In sylvis vulgarissima.

396. ONOCLEA.

- * 1136. *O. STRUTHIOPTERIS*, fronde pinnata, sterili pinnis elongato-lanceolatis pinnatifidis, laciniis ovatis obtusis obsolete crenulatis, fertilia pinnis linearibus obtusis dorso contractis crenatis. *Fl. dan. 169.*

In nemoribus umbrosis ad Schmon.

397. BLECHNUM.

1137. *BL. BOREALE*, fronde lanceolata sterili pinnatifida, laciniis subfalcatis integerrimis, fertili pinnata, pinnulis linearibus acutis. *Osmunda Spicant L. Cart. n. 22. Fl. dan. 99. Engl. bot. 1159. Bolt. fil. t. 6.*

In nemoribus humidis, hinter dem Fasanenhause rarissime.

III. PTEROIDES.

398. OSMUNDA.

1138. *O. REGALIS*, fronde bipinnata, pinnulis cordato-lanceolatis subserratis, panicula terminali. *Fl. dan. 217. Engl. bot. 209. Sturm II. 6.*

In paludibus nemorosis hinter dem Fasanenhause, bei Dölau.

399. BOTRYCHIUM.

- * 1139. *B. LUNARIA*, fronde solitaria basi spicifera pinnata, pinnis lunulatis crenatis. *Fl. dan. 18. Engl. bot. 318. Sturm II. 1. Osmunda L.*

In montosis hinter der Heide, am Petersberge.

400. OPHIOGLOSSUM.

1140. *O. VULCATUM*, fronde ovata. *Fl. dan. 147. Engl. bot. 108. Bolt. t. 3. Sturm II. 1.*

In pascuis humidis bei Bennstädt rarius,

IV. MUSCI FRONDOSI.

401. PHASCUM.

1141. *PH. CUSPIDATUM*, subacaule, foliis ovatis cuspidatis patulis, intimis conniventibus. *Dill. t. 32. f. 11. Schreb. phasc. t. 1. f. 1. 2. Sturm II. 6. Curt. n. 46.*

In pomariis, hortiis cultis fere ubique.

1142. *PH. MUTICUM*, acaule, foliis ovato-concavis muticis conniventibus. *Dill. t. 32. f. 12. Schreb. phasc. t. 1. f. 12.*

Eisdem cum praecedente locis.

1143. *PH. SUBULATUM*, caulescens, foliis lineari-subulatis, perichaetialibus longissimis. *Dill. t. 32. f. 12. Hedw. stirp. I. 35. Curt. n. 46. Sturm II. 6.*

In arenosis sylvaticis cum *Baeomyces pyxidato*.

402. SPHAGNUM.

1144. *SPH. LATIFOLIUM*, foliis ovatis concavis obtusis, ramis apice turgidis. *Dill. t. 32. f. 1. Fl. dan. 474.*

In paludibus turfosis vulgare.

1145. *SPH. CAPILLIFOLIUM*, foliis ovato-lanceolatis planiusculis acuminatis, ramis apice capillaceis. *Dill. t. 32. f. 2.*

In rivulis hinter dem Fasanenhaus. *Dum aquis innatat, folia patentiuscula faciunt Sph. cuspidatum Smith et Turn.*

403. GYMNOSTOMUM.

1146. *G. TRUNCATUM*, foliis ovatis acuminatis planis integerrimis, capsula obovata truncata. *Dill. t. 45. f. 7. Hedw. stirp. I. 5. Sturm II. 2. Fl. dan. 537. f. 2.*

In hortiis, cultis fere ubique.

- * 1147. *G. ovatum*, foliis ovatis obtusis integerrimis concavis aristatis, capsula ovata. *Hedw. stirp. I. 6.*

In muris limosis.

1148. *G. pyriforme*, foliis planis acutis apice serratis, capsula pyriformi. *Dill. t. 44. f. 6. Engl. bot. 413. Fl. dan. 537. f. 1. G. fasciculare Hedw. spec. posth. t. 4. f. 5. (Cl. Turn. hibern. 10. Schultz stargard. 280.)*

Ad latera fossarum.

- * 1149. *G. ciliatum*, trunco erecto ramosissimo, foliis ovato-lanceolatis apice diaphanis, perichaetibus ciliatis, capsulae axillaris subsessilis operculo planiusculo. *Hedwigia ciliata Hedw. stirp. I. 40. Dill. t. 32. f. 5. Engl. bot. 1179.*

In rupibus apricis frequens.

404. TETRAPHIS.

- * 1150. *T. pellucida*, trunco erecto, foliis ovato-lanceolatis integris, capsula cylindrica. *Dill. t. 31. f. 2. Schmidel icon. t. 3. Hedw. spec. posth. t. 7. f. 1. Engl. bot. 1020. Sturm II. 2.*

In sylvaticis udibus, in der Heide, in palude Dölau.

405. SPLACHNUM.

- * 1151. *Spl. ampullaceum*, apophysi ampullaeformi capsulam excedente, foliis ovato-lanceolatis acuminatis, superioribus denticulatis. *Dill. t. 44. f. 3. Hedw. stirp. II. 14. Engl. bot. 144. Fl. dan. 822.*

In palude turfosa ad Dölau, hodie rarius. *Dum. nondum adolevit, est Spl. Turnerianum Engl. bot. 1116. Dickf. t. 10. f. 11.*

406. ENCALYPTA.

1152. *E. vulgaris*, caule simplici, foliis spathulato-lanceolatis, calyptra basi integra. *Dill. t. 45.*

IV. MUSCI FRONDOSI.

297

f. 8. *Hedw. stirp. I.* 18. *Sturn II.* 3.
Leersia exstinctoria *Leyss.* (exclusa var. β .)

In arenosis, muris.

407. GRIMMIA.

1153. GR. CONTROVERSA, subacaulis, foliis subulatis
siccitate tortilibus, capsulae ellipticae operculo
subulato. *Weissia controversa* *Hedw. stirp.*
III. 5. B. *Sturn II.* 7. *Weissia viridula*
Leyss. *Grimmia crispa* *Rotk.*

Ad vias cavas am Bischofsberge in der Heide.

1154. GR. CIRRHATA, trunco erecto ramoso, foliis
linearibus siccitate tortilibus carinatis, capsula
ovata. *Dill. t.* 48. f. 42. *Weissia cirrhata*
Hedw. sp. posih. I. 12. *Barbula cirrhata*
Bridel. *Leersia cirrhata* *Leyss.* *Anium*
cirrhatum *Fl. dan.* 538. f. 4.

Ad rupes prope Giebichenstein, linker Hand vom
Dorfe.

- * 1155. GR. LANCEOLATA, trunco erecto, foliis lan-
ceolato-concavis acuminatis, capsula ovata.
Leersia lanceolata *Hedw. stirp. II.* 23. *En-*
-calypta *Hedw. sp. posih.*

Ad aggeres fossarum frequens.

1156. GR. APOCARPA, trunco ramoso diffuso, foliis
ovatis acuminatis, perichaetialibus piliferis,
capsula ovata sessili. *Dill. t.* 32. f. 4. *Hedw.*
stirp. I. 39. *Engl. bot.* 1234. *Fl. dan.* 480.

In rupibus ad Giebichenstein.

408. MASCHALOCARPUS.

- * 1157. M. FILIFORMIS, trunco debili subramoso, fo-
liis lanceolatis concavis integerrimis enerviis
imbricatis. *Pterigynandrum filiforme* *Hedw.*
stirp. IV. 7.

In sylvis ad Loderleben et Ziegelrode.

409. DICRANUM.

- *158. *D. VIRIDULUM*, trunco simplici adscendente, foliis subdistichis imbricatis elliptico-lanceolatis acutis, seta terminali. *Swartz. succ. t. 2. f. 3. Fissidens exilis Hedw. spec. posth. t. 38. f. 7. Bryum viridulum. Dickf. t. 1. f. 5. Dill. t. 34. f. 1.*

In viis cavis, scrobibus.

- *159. *D. BRYOIDES*, trunco simplici adscendente, foliis distichis oblongis obtusiusculis, seta terminali. *Swartz. succ. t. 2. f. 4. Fissidens bryoides Hedw. stirp. III. 29. Fissidens osmundoides Hedw. sp. posth. t. 40. Hypnum asplenioides Dickf. t. 5. f. 5.*

In viis cavis, ad aggeres fossarum, in sylvis frequens.

- *160. *D. TAXIFOLIUM*, trunco simplici, foliis distichis oblongo-lanceolatis, seta subradicali. *Dill. t. 34. f. 2. Sturm II. 2. Fissidens taxifolius. Hedw. sp. posth. t. 39. Engl. bot. 426. Fl. dan. 473.*

In umbrosis sylvaticis.

- *161. *D. PURPUREUM*, trunco subdichotomo, foliis lanceolato-acuminatis erecto-patulis carinatis, capsula cylindrica. *Hedw. sp. posth. t. 36. Dill. t. 49. f. 52.*

In ericetis montosis frequens.

- *162. *D. PULVINATUM*, foliis oblongis obtusis piliferis, seta arcuata. *Dill. t. 50. f. 65. Sturm II. 8. Fissidens Hedw. sp. posth. t. 40.*

In rupibus, muris et saxis ubique.

- *163. *D. OVALE*, foliis lanceolato-subulatis piliferis, seta recta. *Hedw. stirp. III. 34. A.*

In montosis apricis ad Giebichenstein rarius.

- *164. *D. GLAUCUM*, trunco erecto ramoso, foliis im-

IV. MUSCI FRONDOSI. 899

bricatis ovato-lanceolatis enerviis glaucis, operculo curvirostro. *Dill. t. 46. f. 20.*

In sylvaticis humidis.

64. *D. SCIUROIDES*, trunco repente ramoso, ramis erectis flexitate incurvis, foliis imbricatis lanceolatis fuscatis. *Dill. t. 41. f. 54.*

In arborum truncis. *Apud nos genuniferum, non capsuliferum.*

66. *D. SCOPARIUM*, trunco ramoso, foliis lanceolato-subulatis secundis, seta solitaria, operculo obliquo. *Dill. t. 46. f. 16. A. B. Sturm II. 2. Engl. bot. 354. Curt. n. 7.*

In rupestribus, nemorosis vulgatissimum.

167. *D. UNDULATUM*, trunco ramoso, foliis lanceolato-acuminatis undulatis subsecundis, setis aggregatis. *Dill. t. 46. f. 16. D. Swartz succ. t. 3. f. 5. Sturm II. 2.*

In sylva, der Heide, rarius.

68. *D. HETEROMALLUM*, trunco simpliciusculo, foliis subulatis falcatis secundis, capsulae cernuae operculo curvirostro. *Dill. t. 47. f. 37. Hedw. stirp. I. 26. Engl. bot. 1272. Sturm II. 6.*

Ad vias cavas, in scrobibus, ad aggeres fossarum.

169. *D. INTERRUPTUM*, trunco subramoso, foliis subulatis falcatis secundis deciduis, capsulae subcylindricae obliquilaterae operculo subulato. *Dill. t. 47. f. 38. Hedw. sp. posth. t. 29.*

In montosis sylvaticis, ad arborum truncos.

170. *D. FLEXUOSUM*, trunco subramoso, foliis subulatis enerviis subsecundis, seta flexuosa. *Dill. t. 47. f. 33. Hedw. sp. posth. t. 38. Sturm II. 7.*

In montosis sylvaticis.

171. *D. RASTIGIATUM*, trunco ramoso, ramis fasti-

giatis, foliis linearibus carinatis obtusiusculis apice serrulatis appressis, capsulae subcylindricae tectae operculo subulato. *Schultz stirp. gard.* 300.

In paludibus turfosis cum Sphagno.

- * 1172. *D. strumiferum*, trunco ramoso, foliis linearibus siccitate tortilibus, capsula cernua strumifera. *Hedw. stirp. II.* 32. *Sturm* 1827.

In pinetis der Heide rarius.

410. TRICHOSTOMUM.

- * 1173. *Tr. pallidum*, trunco simplici, foliis capsularibus rectis, capsulae ovato-cylindricae operculo conico. *Dill. t.* 49. *f.* 57. *Hedw. stirp. I.* 27.

In montosis apricis ad Giebichenstein.

- * 1174. *Tr. canescens*, trunco ramoso, foliis ovato-lanceolatis striatis reflexis apice imbricatis, capsulae ellipticae operculo subulato. *Dill. t.* 47. *f.* 27. B—E. *Hedw. stirp. III.* 5.

In montosis sterilibus.

411. DIDYMODON.

- * 1175. *D. rigidulus*, trunco simplici, foliis lanceolatis nervosis cuspidatis rigidiusculis, operculo subulato subincurvo. *Hedw. stirp. III.* 4.

In muris antiquis, et in sterilibus.

- * 1176. *D. capillaceus*, trunco ramoso, foliis dimidiatis semivaginantibus setaceis nervosis, capsula erecta. *Swartzia capillacea. Hedw. stirp. II.* 26. *Cynontodium capillaceum Hedw. sp. posth. Trichostomum capillaceum Turcz. hibern. Engl. bot.* 1152. *Bryum capillaceum Dickf. t. I. f.* 6. *Fl. dan.* 1000. *f.* 1.

In montosis sylvaticis der Heide rarius.

412. POLYTRICHUM.

- * *Capsula apophysi insidentibus.*

- 1177. *P. commune*, trunco simplici erecto, foliis

IV. MUSCI FRONDOSI. 301

lanceolato-acuminatis serrulatis reflexis, capsula oblonga tetraëdra. *Dill. t. 54. f. 1. Engl. bot. 1197.*

In sylvaticis humidis vulgare.

1178. *P. JUNIPERINUM*, trunco simplici, foliis lanceolato-acuminatis integerrimis carina scabris, capsula oblonga tetraëdra. *Dill. t. 54. f. 2. Hedw. sp. posth. t. 18. Engl. bot. 1200. Linn. transact. IV. t. 6. f. 4. Sturm II. 4.*

In ericetis.

1179. *P. PILIFERUM*, trunco subsimplici, foliis lanceolatis integerrimis revolutis apice piliferis, capsula tetraëdra. *Dill. t. 54. f. 3. Engl. bot. 1199. Sturm II. 4.*

In ericetis.

•• *Capsulis basi nudis.*

1180. *P. NANUM*, subacaule, foliis lanceolatis obtusis apice serrulatis, seta flexuosa, capsula turbinata cernua. *Dill. t. 55. f. 6. G—L. Hedw. stirp. I. 13. Sturm II. 4.*

In ericetis sylvaticis.

1181. *P. SUBROTUNDUM*, subacaule, foliis lanceolatis obtusis integerrimis rigidis, seta rectiuscula, capsula turbinata suberecta. *Menz. Dill. t. 55. f. 6. A—F. Curt. n. 17.*

In ericetis sylvaticis.

1182. *P. ALOIDES*, trunco simplicissimo, foliis lanceolatis obtusis serrulatis, capsula cylindrica subobliqua. *Dill. t. 55. f. 7. Hedw. stirp. I. 14. Sturm II. 4.*

In ericetis sylvaticis.

1183. *P. UNDULATUM*, trunco erecto subsimplici, foliis lanceolatis serratis undulatis siccitate tortilibus, capsula cylindrica cernua, calyptra infra apicem laevi. *Dill. t. 46. f. 18. Hedw.*

stirp. I. 18. 17. *Fl. dan.* 477. *Engl. bot.* 1220. *Hofm. germ.* t. 1. *Curt.* n. 6.

In sylvaticis umbrosis vulgare.

413. BARBULA.

1184. *B. umbiculata*, trunco subramoso, foliis lanceolatis carinatis mucronatis nervosis, capsula oblonga. *Dill.* t. 48. f. 48. (*Fide Hedw. stirp.* I. 25. *Engl. bot.* 1221.)

In muris, campis aridis uberrime.

1185. *B. adnata*, trunco ramoso, foliis ovatis longis carinatis reflexis piliferis, operculo obliquo conico. *Dill.* t. 45. f. 12. *Sturn II.* 1.

In tectis, aridis ubique.

1186. *B. muralis*, trunco subsimplici, foliis oblongo-spathulatis patulis piliferis, operculo emarginato. *Dill.* t. 46. f. 14. 15.

In muris, saxi, rupibus.

1187. *B. subulata*, trunco subsimplici, foliis oblongo-lanceolatis mucronulatis patulis, capsula cylindrica maxima operculo subulato. *Dill.* t. 49. f. 10. *Hedw. sp. posth.* t. 27. *Engl. bot.* 1101. *Sturn II.* 5. *Fl. dan.* 1000. f. 2. *Curt.* n. 36.

In rupibus.

414. ORTHOTRICHUM.

1188. *O. striatum*, trunco erecto ramoso, foliis lanceolatis carinatis revolutis, capsulae pedunculatae ovatae striatae operculo obtusiusculo, peristomii interni ciliis 16. *Hedw. stirp.* II. 36. *Grimmia striata* *Leys.* *Fl. dan.* 537. f. 5.

Ad arborum truncos.

1189. *O. adpressum*, trunco erecto ramoso, foliis lanceolatis carinatis revolutis, capsulae subsessili

IV. MUSCI FRONDOSI. 303

cylindricae operculo subulato, peristomii internis ciliis 8. *Dill. t. 55. f. 8. Engl. bot. 1322.*

Ad salicū, ulmorum truncos.

- * 1190. *O. ANOMALUM*, trunco erecto subramoso, foliis lanceolatis carinatis revolutis obtusiusculis, capsulae pedunculatae ovatae sulcatae operculo obtuso, peristomio interno nullo. *Dill. t. 55. f. 9. Hedw. stirp. II. 37.*

Cum prioribus passim et in muris antiquis.

- * 1191. *O. DIAPHANUM*, trunco subsimplici, foliis lanceolatis revolutis acuminatis apice diaphanis serrulatis, capsulae sessilibus striatae operculo umbonato, peristomii interni ciliis 16. *Turn. hibern. t. 9. f. 1. (Huc et O. aristatum Ej. f. 2.) Engl. bot. 1324.*

In salicū vetustarum truncis:

415. NECKERA.

- * 1192. *N. PENNATA*, trunco ramoso, foliis bifariam imbricatis lanceolatis resime acuminatis, capsulis subsessilibus. *Dill. t. 32. f. 9. Hedw. stirp. III. 19.*

In cortice fagorum ad Lodersleben rarius.

- * 1193. *N. CRISPA*, trunco ramoso, foliis distichis oblongis transverse rugosis, capsulis pedunculatis. *Dill. t. 36. f. 12. Engl. bot. 617.*

In nemorosis montosis, solo calcareo.

- * 1194. *N. VITICULOSA*, trunco repente ramoso, ramis erectis simpliciusculis, foliis ovatis obtusis subreflexis, capsulis pedunculatis. *Dill. t. 39. f. 43. Hedw. sp. posth. t. 48. Engl. bot. 265.*

In rupibus ad Giebichenstein copiose.

416. CLIMACIUM.

- * 1195. *CL. DANDROIDES*, trunco erecto basi nudiusculo, ramis fasciculatis terminalibus, foliis ob-

longis apice serrulatis nervosis. *Hypnum dendroides* L. *Dill.* t. 40. f. 48. *Sprengel krypt.* t. 7. f. 70. *Fl. dan.* 823. f. 2.

In nemorosis montosis.

417. LESKEA.

* 1196. *L. TRICHOMANOIDES*, trunco ramoso, ramis apice obtusis, foliis distichis oblongis obtusis subnatis (sub lente tenerrime serrulatis) capsula. *Dill.* t. 54. f. 8.

Ad truncos arborum copiose bey Seeben.

* 1197. *L. COMPLANATA*, trunco ramoso repente, ramis apice attenuatis, foliis ovato-oblongis apiculatis enerviis. *Dill.* t. 34. f. 7.

Ad truncos arborum copiose bey M. Fasanenhause.

* 1198. *L. ATTENUATA*, trunco ramoso, ramis incurvis gracilescantibus, foliis ovato-acuminatis enerviis. *Hedw. stirp.* I. 12.

Ad truncos arborum bey Seeben.

* 1199. *L. POLYANTHA*, trunco repente ramoso, ramis subincurvis, foliis lanceolatis acuminatis enerviis, *Hedw. stirp.* IV. 2. *Dill.* t. 42. f. 62.

Ad truncos arborum.

* 1200. *L. SERICEA*, trunco repente ramoso, ramis erectis incurvis, foliis lanceolato-acuminatis trifariatis, seta muriculata, capsula erecta. *Dill.* t. 42. f. 59. *Hedw. stirp.* IV. 17. *Curt.* n. 21.

Ad truncos arborum.

* 1201. *L. SUBTILIS*, trunco repente ramosissimo, ramis filiformibus, foliis lanceolatis acuminatis enerviis reticulatis, capsula erecta. *Hedw. stirp.* IV. 9. (Sub *Hypno serpente* *Leyss. l. c.*; quod differt solummodo capsulis cernuis, foliis basi nervosis et peristomio internis.)

Ad truncos arborum.

IV. MUSCI FRONDOSI. 305

1202. *L. PALUDOSA*, trunco repente, ramis erectis, foliis ovatis concavis subsecundis. *Dill. t. 37.*

f. 27. B. Hedw. stirp. IV. 1.

Ad salicum radices, iuxta fluvios.

418. BARTRAMIA.

1203. *B. POMIFORMIS*, trunco ramoso, ramis brevioribus incrassatis, foliis lineari-subulatis argute ferrulatis siccitate tortilibus. *Dill. t. 44. f. 1. Bridel musc. t. II. P. 3. t. 1. f. 3. Webera pomiformis Leyss.*

In rupibus, viis cavis copiosissime.

1204. *B. ITIHYPHYLLA*, trunco subramoso, ramis apice aequalibus, foliis lineari-subulatis integerrimis siccitate rectissimis. *Bridel musc. t. II. P. 3. t. 1. f. 6.*

In viis cavis nemorum rarius.

1205. *B. FONTANA*, trunco erecto, ramis terminalibus subverticillatis, foliis imbricatis ovato-lanceolatis apice ferrulatis subsecundis. *Swartz in Schrad. Journ. 1800. II. 180. Minium fontanum L. Dill. t. 44. f. 2.*

In paludibus ad scaturigines.

419. BRYUM.

1206. *B. CAMPESTRICUM*, trunco erecto subramoso, foliis lanceolato-cuspidatis nervosis strictis, capsulae pendulae pyriformis operculo mammillari. *Dill. t. 50. f. 66. A—E.*

In ericetis sylvaticis copiose.

1207. *Ba. ARGENTEUM*, trunco erecto subramoso, foliis dense imbricatis ovatis obtusis mucronulatis argenteis, capsulae obovatae pendulae operculo obtuso. *Dill. t. 50. f. 62. Curt. n. 28.*

In muris, tectis, saxis, collibus apricis copiose.

1208. *Ba. ANNOTINUM*, trunco erecto subramoso,

foliis sparsis ovato-lanceolatis serratis, capsulae pendulae pyriformis operculo obtuso. *Dill.* t. 50. f. 68. *Hedw.* sp. posth. t. 43. *Hofm.* fl. germ. (Trentepohlia.) *S. w. a. r. t. 2.* in *Schrad. Journ.* 1800. 2. t. 3. C.

In pratis atenosis frequens. Pterunque gemmifera.

1209. BR. ANDROGYNUM, truncus erectus subrotundus, foliis remotiusculis oblongo-lanceolatis serratis, capsulae cylindricae operculo conico. *Dill.* t. 31. f. 1. *Hedw.* bot. t. 1238. *Fl. dan.* 299.

Ad rupes umbrosas. Fere semper gemmifera, pedicellis.

1210. BR. CAPILLARE, truncus brevissimus, foliis stellatis ovatis nervosis piliferis siccatibus, capsulae obovatae pendulae operculo conico. *Dill.* t. 50. f. 67. *Br. u. s. p.* C. M. t. n. 28.

In umbrosis humidis frequens.

420. MNIMUM.

* 1211. MN. PALUSTRE, truncus erectus apice diviso, foliis lanceolato-acuminatis integerrimis pilosis, capsulae subcernuae operculo obtusiusculo. *Dill.* t. 31. f. 3. *Engl. bot.* 391.

In paludibus copiose. Gemmifera duplici modo, stellulas enim et capitula pedicellata profert.

* 1212. MN. POHLIA, truncus erectus simpliciter, foliis lineari-lanceolatis nervosis, capsulae basi elongatae cernuae operculo mammillari. *Hedw. stirp.* I. 36. (*Pohlia elongata.*)

In saxis humidis.

* 1213. MN. NUTANS, truncus simpliciter, foliis lineari-lanceolatis serrulatis strictis, capsulae oblongae subpendulae operculo mammillari. *Dill.* t. 59. f. 61. A — C. *Hedw. stirp.* I. 4.

IV. MUSCI FRONDOSI. 307

In pinetis.

1214. *MN. HORNUM*, trunco erecto sublimplici, foliis oblongo-lanceolatis ferratis nervosis patulis, capsulae pendulae operculo mammillari. *Dill. t. 51. f. 71. Curt. n. 8.*

Ad rivulos paludum, hinter dem Fasanenhaufe.

1215. *MN. CRUDUM*, trunco simplici, foliis lanceolato-linearibus subdistichis, summis dentatis, capsulae oblongae operculo convexo. *Dill. t. 51. f. 70. Hedw. stirp. I. 37.*

In rupibus subhumidis.

1216. *MN. CUSPIDATUM*, trunco sterili reptante, foliis ovato-lanceolatis ferratis cuspidatis, capsulae pendulae operculo convexo. *Dill. t. 53. f. 79. Hedw. sp. posth. t. 45.*

In sylvaticis umbrosis.

1217. *MN. PUNCTATUM*, trunco sterili reptante, foliis subrotundis integerrimis, capsulae ovatae operculo acuminato. *Dill. t. 53. f. 81. Engl. bot. 1183.*

In sylvaticis umbrosis.

1218. *MN. ROSEUM*, trunco erecto simplici, foliis rosaceo-congestis ovato-lanceolatis acuminatis tenuissime ferrulatis, capsulae pendulae operculo convexo. *Dill. t. 52. f. 77. Mn. pre-liferum Leyfs.*

In nemorosis umbrosis.

1219. *MN. UNDULATUM*, trunco sterili reptante, foliis oblongis undulatis ferratis, capsulae pendulae operculo acutiusculo. *Dill. t. 52. f. 76.*

In nemorosis rupestribus.

421. HYPNUM.

* *Foliis nervosis, directione varia.*

240. *H. ALOPECURUM*, trunco erecto, ramis super-

ne fasciculatis, foliis ovatis acutis concavis serrulatis, capsulae cernuae operculo rostrato. *Dill. t. 41. f. 49. Engl. bot. 1182.*

In nemorosis humidis.

- * 1221. *H. CURVATUM*, trunco repente, ramis recurvis, foliis ovato-acuminatis integerrimis (nervo vix conspicuo) capsula erecta. *Dill. t. 41. f. 50. H. myosuroides Hedw. stirp. IV. 8. H. myurum Brid. H. ornithopodioides Fl. dan. 649. f. 2.*

Ad arborum truncos.

1222. *H. MYOSUROIDES*, trunco repente, ramis subs fasciculatis recurvis, foliis ovato-lanceolatis serratis, capsula cernua. *Dill. t. 41. f. 51. H. myosurum Schrad.*

Ad arborum truncos, praesertim beyrn Falschhaufe.

1223. *H. ABIETINUM*, trunco decumbente ramoso, ramis pinnatis attenuatis rigidis, foliis imbricatis appressis ovato-lanceolatis striatis, capsula cernua. *Dill. t. 35. f. 17. Hedw. IV. 32.*

In siccis sylvaticis. *Apud nos nunquam capsulas fert.*

1224. *H. RECOGNITUM*, trunco decumbente ramose pinnato, ramis apice convolutis, foliis ovato-acuminatis, summis nerviis papillofis, capsula subcernua. *Dill. t. 35. f. 14. Hedw. stirp. IV. 35. H. delicatulum Leyfs. ? proliferum Ej. Curt. n. 2.*

In sylvaticis copiose.

1225. *H. PRÆLONGUM*, trunco decumbente, ramis laxis, foliis ovato-lanceolatis remotiusculis denticulatis, seta muriculata, capsulae cernuae operculo rostrato. *Dill. t. 35. f. 15. Hedw. stirp. IV. 29.*

In pomariis, hortis ubique.

IV, MUSCI FRONDOSI. 309

126. *H. SERPENS*, trunco repente ramossissimo, foliis ovato-acuminatis basi nervosis, capsulae cernuae operculo mammillari. *Dill. t. 42. f. 64. Hedw. stirp. IV. 18. Engl. bot. 1037.*

In sylvaticis rarius. Cf. *Leskeam subtilem*.

127. *H. VELUTINUM*, trunco repente, ramis erectis simplicibus, foliis confertis ovato-lanceolatis suberratis, perichaetialibus crinitis, capsula cernua ovata. *Dill. t. 42. f. 61. Hedw. stirp. IV. 27. Sturm II. 4.*

In sylvaticis frequens.

128. *H. PLUMOSUM*, trunco reptante, ramis bifariis depressis, foliis ovato-lanceolatis striatis, seta laevi, capsulae cernuae operculo conico. *Dill. t. 35. f. 16. Turn. hibern. t. 15. f. 1. Hedw. stirp. IV. 15.*

In sylvaticis.

129. *H. LUTESCENS*, trunco procumbente ramossissimo, foliis ovato-lanceolatis tristriatis, seta muriculata, capsula cernua. *Dill. t. 42. f. 60. Hedw. stirp. IV. 76. Engl. bot. 1301.*

In siccis, sub arboribus, in pomariis. *Simillima Leskea sericea differt solummodo capsula erecta et peristomio interno.*

130. *H. PUBUM*, trunco ascendente pinnato, foliis imbricatis ovalibus concavis mucronulatis nitidis, capsulae cernuae operculo mucronulato. *Dill. t. 40. f. 45. Hedw. sp. posth. t. 66. Curt. n. 34.*

In nemorosis copiose.

131. *H. MURALE*, trunco decumbente subramoso, foliis ovatis acutis concavis integerrimis, capsulae cernuae operculo curvirostro. *Dill. t. 41. t. 52. Hedw. stirp. IV. 30. Engl. bot. 1038.*

In sylvaticis udis, in der Heide.

- * 1232. *H. RIPARIUM*, trunco prostrato, ramis radi-
cantibus, foliis remotiusculis ovatis acuminatis
integerrimis, capsulae cernuae operculo conico.
Dill. t. 40. f. 44. B. C. D. Hedw. stirp.
IV. 3. (? H. fluitans Leyst.)

In fluviorum ripis.

- * 1233. *H. RUTABULUM*, trunco ramosissimo, foliis
ovatis acuminatis patulis ferrulatis, seta muri-
culata, capsulae cernuae operculo conico.
Dill. t. 38. f. 29. Hedw. stirp. IV. 12.

In sylvaticis paludosis, ad Seeben copiose.

- * 1234. *H. PILIFERUM*, trunco ramosissimo, foliis
ovatis concavis obtusiusculis apice piliferis, se-
ta muriculata, capsulae cernuae operculo ro-
strato. *Hedw. stirp. IV. 14.*

In sylvaticis.

- * 1235. *H. STRIATUM*, trunco ramosissimo, ramis sub-
recurvis, foliis ovatis obsolete ferrulatis stri-
atis, horizontaliter patentibus, capsulae nutantis
operculo rostrato. *Dill. t. 38. f. 30. (Hedw.*
IV. 13. mala) H. longirostrum Brid.

In sylvaticis.

- * 1236. *H. FLUITANS*, trunco gracili pinnato, foliis ob-
longo-lanceolatis acuminatis remotiusculis,
capsulae cernuae operculo mammillari. *Dill.*
t. 38. f. 33. Hedw. stirp. IV. 36.

In aquis stagnantibus.

** *Foliis nervosis secundis.*

- * 1237. *H. COMMUTATUM*, trunco exacte pinnato, fo-
liis ovato-subulatis tortilibus, setis rameis,
capsulae cernuae operculo conico. *Dill. t. 36.*
f. 19. B — D. Hedw. stirp. IV. 26.

In sylvaticis udis. Cf. *H. Crista castrensis.*

- * 1238. *H. FILICINUM*, trunco procumbente subpin-
nato, foliis ovato-subulatis rectis, setis caulinis,

IV. MUSCI FRONDOSI. 316

capsulae cernuae operculo apiculato. *Dill.*
t. 36. f. 79. A. E. F. *Hedw. sp. posth.* t. 76.
H. extricatum Hofm., compressum Brid.,
dubium Sw.

In sylvaticis ad arborum truncos.

1239. *H. uncinatum*, trunco procumbente subpin-
nato, foliis lanceolato-subulatis striatis remo-
tiusculis, capsulae incurvae operculo acumina-
to. *Hedw. stirp.* IV. 25.

In sylvaticis montosis.

1240. *H. aduncum*, trunco erecto, ramis patulis,
foliis ovato-acuminatis incurvis, summis se-
cundis, perichaetialibus apiculatis, operculo
convexo mucronulato. *Dill.* t. 37. f. 26.
Hedw. stirp. IV. 24.

In paludibus et aquis stagnantibus.

1241. *H. angustum*, trunco subramoso, ramis erec-
timaculis incrassatis recurvis, foliis ovato-lan-
ceolatis basi rugosis. *Dill.* t. 37. f. 24.

In montosis arenosis, am Bischofsberge. Nun-
quam cum capsulis.

*** *Foliis enerviis, directione varia.*

1242. *H. denticulatum*, trunco subsimplici, foliis
bifariam positis lanceolatis integerrimis, seta
subbasilari, capsulae cernuae operculo conico.
Dill. t. 34. f. 5. *Hedw. stirp.* IV. 31,
Engl. bot. 1260.

β. *H. sylvaticum, foliis remotioribus, operculo*
rostrato. *Dill.* t. 34. f. 6. *Turn. hibern.*
t. 12. f. 1.

In umbrosis sylvaticis rupesribus.

1243. *H. triquetrum*, trunco pinnato, ramis spar-
sis subrecurvis, foliis deltoideo-lanceolatis pa-
tulis serrulatis striatis, capsulae cernuae oper-
culo conico. *Dill.* t. 38. f. 28.

In sylvia, rupibus vulgare.

1244. *H. squarrosum*, trunco erecto pinnato, foliis ovatis acuminatis recurvis, capsulae subnatis operculo conico. *Dill. t. 39. f. 38. Fl. dan. 535.*

In sterilibus sylvaticis vulgare.

1245. *H. cuspidatum*, trunco pinnato, foliis lanceolatis patulis, summis convolutis, capsulas cernuae operculo conico. *Dill. t. 39. f. 34.*

In paludosis frequens.

1246. *H. compressum*, trunco pinnato subcompresso, ramis subincurvatis, foliis laxe imbricatis ovatis concavis. *Dill. t. 40. f. 47. H. purum β. Leyse.*

In sylvaticis copiose.

1247. *H. splendens*, trunco bipinnato, foliis appressis ovato-acuminatis apiculatis, capsulas cernuae operculo rostrato. *Dill. t. 35. f. 15. Hedw. sp. posth. t. 67. H. parietinum L.*

In ericetis et sylvis frequens.

- * 1248. *H. umbratum*, trunco bipinnato, foliis cordato-ovatis acutis serrulatis, capsulae subnatis operculo conico. *Hedw. sp. posth. t. 67.*

In nemoribus umbrosis.

**** *Foliis enerviis secundis.*

1249. *H. crista castrensis*, trunco pinnato, ramis distichis suboppositis, foliis linearibus falcatis subdenticulatis. *Hedw. sp. posth. t. 76. Dill. t. 36. f. 19.*

In sylvis ad arborum truncos. (*H. commutato simillimum, solo fere defectu nervi diversum.*)

1250. *H. cupressiforme*, trunco prostrato pinnato, ramis simpliciusculis subincurvatis, foliis ovato-acuminatis arcte imbricatis, capsulae cernuae operculo rostrato. *Dill. t. 37. f. 23. Hedw. stirp. IV. 23.*

V. HEPATICAE. 313

Humi et in arboribus ubique. Varietas ramis filiformibus, foliis parum secundis, vocatur H. extenuatum Hofm.

422. FONTINALIS.

1251. *F. ANTIPIRYRETICA*, trunco triquetro ramossissimo, foliis ovatis acutis complicato-carinatis enerviis, capsula subsessili. *Dill. t. 33. f. 1. Engl. bot. 359.*

In fluviis, ad aggeres molendinarum.

423. BUXBAUMIA.

1252. *B. APHYLLA. Schmidel Buxbaum. c. ic. Dill. t. 68. f. 5. Sturm II. 3. Fl. dan. 44.*

In sylvaticis umbrosis, ad collium margines.

424. FUNARIA.

1253. *F. HYGROMETRICA. Dill. t. 52. f. 75. Engl. bot. 342. Sturm II. 2. Fl. dan. 648. f. 2.*

In limosis.

V. HEPATICAE.

425. ANTHOCEROS.

1254. *A. PUNCTATUS*, fronde crispa sinuato-laciniosa. *Dill. t. 68. f. 1. Schmidel t. 47. Hofm. germ. t. 5.*

In agris humidis hinter der Heide.

1255. *A. LAEVIS*, fronde plana crenata. *Dill. t. 68. f. 2. Schmidel t. 19. Hedw. t. 29. 30. Fl. dan. 396.*

Cum priori rarius. In fronde utriusque corpuscula incarnata aggregata occurrunt, quae propagines fiunt.

426. JUNGERMANNIA.

* *Cauliscentes.*

† *Nudae f. sine auriculis et stipulis.*

1256. *J. ASPLENTIODES*, trunco ramoso adscendente,

foliis distichis ovatis denticulato-ciliatis. *Dill.* t. 69. f. 5. 6. *Michel.* t. 5. f. 1. *Fl. dan.* 1061.

In nemorosis umbrosis et rupibus ad Giebichenstein.

* 1257. *J. VITICULOSA*, trunco adscendente ramoso, foliis distichis subrotundis integerrimis. *Dill.* t. 69. f. 7. *Michel.* t. 5. f. 4.

In nemorosis montosis.

* 1258. *I. GLOBULIFERA*, trunco repente; foliis imbricatis ovatis planis apice emarginato-bidentatis. *Roth.*

Ad aggeres fossarum in sylvaticis umbrosis. *Glaumerulos gemmiferos in apice foliorum gerit.*

* 1259. *J. BARRATA*, caulibus repentibus, foliis subquadratis plicatis apice subquadridentatis, dentibus mucronatis. *Schmidel icon. et analysi* t. 48.

In viis cavis sylvaticis in der Heide.

* 1260. *J. FUSILLA*, trunco brevissimo repente, foliis distichis imbricatis obovatis undulatis, apice crenulatis. *Dill.* t. 71. f. 22. *C. Schmidel icon. et anal.* t. 22.

In apricis humidis glareosis hinter der Heide.

* 1261. *J. BICUSPIDATA*, trunco procumbente diffuso, foliis distichis subquadratis, apice emarginato-bicuspidatis, calycibus lateralibus. *Dill.* t. 70. f. 13. *Schmidel* t. 63. *Bryum fissum* *Leyf.* *Fl. dan.* 888.

In sylvaticis umbrosis copiose.

* 1262. *J. BYSSACEA*, trunco adscendente capillari, foliis alternis remotiusculis acute bidentatis, calycibus terminalibus imbricatis. *Roth.*

In sylvaticis umbrosis. *Dematium aut Conferam* *mentiens.*

* 1263. *J. DULAVIENSIS*, trunco scandente, foliis

pillaribus ternis trifidisque. *n. sp. Ic. nostra 8.*

Conserva hypnoides Fl. dan. 828. f. 2.

In Sphagno latifolio parasitica rarissima.

†† *auriculatae.*

1264. *J. NEMOROSA*, trunco subramoso, foliis auriculisque imbricatis subrotundis margine ciliatis.

Dill. t. 71. f. 18. Michel. t. 5. f. 8.

In sylvaticis umbrosis.

††† *stipulatae.*

165. *J. BIDENTATA*, trunco prostrato radicante, foliis ovatis apice emarginatis bidentatis, stipulis bipartitis quadridentatis. *Dill. t. 70. f. 11.*

Michel. t. 5. f. 12.

In umbrosis vulgarissima. *Occurrit varietas minor, foliis bicuspidatis quae J. bicuspidatam nuntiatur, solo microscopio, quod stipulas ostendit, distinguenda.*

1266. *J. PALLESCENS*, trunco prostrato, foliis ovato-subrotundis integerrimis, stipulis ovatis acutis bifidis. *Ehrh.*

In collibus sylvaticis ad septentrionem, Zorgs.

1267. *J. TRICHOMANIS*, trunco prostrato, foliis ovatis stipulisque subrotundis emarginatis. *Dickf. t. 8. f. 5. Dill. t. 31. f. 5.*

Ad rivulos umbrosissimos hinter dem Fasanen-hause. Priori simillima, sed minor et foliis stipulisque emarginatis discrepans.

168. *J. TRILOBATA*, trunco repente radicante, foliis stipulisque subquadratis imbricatis apice tridentatis. *Dill. t. 71. f. 22. A.B.*

In sylvaticis umbrosis. *J. barbata simillima, sed oareo stipulis.*

169. *J. REPTANS*, trunco repente, foliis stipulisque quadratis apice subquadrifidis, calycibus tri-

- foliis distichis ovatis denticulato-ciliatis. *Dill.* t. 69. f. 5. 6. *Michel.* t. 5. f. 1. *Fl. dan.* 1061.

In nemorosis umbrosis et rupibus ad Giebichenstein.

- * 1257. *J. VITICULOSA*, trunco adscendente ramose, foliis distichis subrotundis integerrimis. *Dill.* t. 69. f. 7. *Michel.* t. 5. f. 4.

In nemorosis montosis.

- * 1258. *I. GLOBULIFERA*, trunco repente; foliis imbricatis ovatis planis apice emarginato-bidentatis. *Roth.*

Ad aggeres fossarum in sylvaticis umbrosis. *Glo-merulos gemmiferos in apice foliorum gerit.*

- * 1259. *J. BARRATA*, caulibus repentibus, foliis subquadratis plicatis apice subquadridentatis, dentibus mucronatis. *Schmidel icon. et analysi* t. 48.

In viis cavis sylvaticis in der Heide.

- * 1260. *J. PUSILLA*, trunco brevissimo repente, foliis distichis imbricatis obovatis undulatis, apice crenulatis. *Dill.* t. 71. f. 22. *C. Schmidel icon. et anal.* t. 22.

In apricis humidis glareosis hinter der Heide.

- * 1261. *J. BICUSPIDATA*, trunco procumbente diffuso, foliis distichis subquadratis, apice emarginato-bicuspидatis, calycibus lateralibus. *Dill.* t. 70. f. 13. *Schmidel* t. 63. *Bryum fissum Leyss.* *Fl. dan.* 888.

In sylvaticis umbrosis copiose.

- * 1262. *J. BYSSACEA*, trunco adscendente capillari, foliis alternis remotiusculis acute bidentatis, calycibus terminalibus imbricatis. *Roth.*

In sylvaticis umbrosis. *Dematium aut Conferam* *mentiens.*

- * 1263. *J. DULAVIENSIS*, trunco scandente, foliis ca-

pillaribus ternis trifidisque. *n. sp. Ic. nostra 8.*
Conserva hypnoides Fl. dan. 828. f. 2.

In Sphagno latifolio parasitica rarissime.

†† *auriculatae.*

1264. *J. NEMOROSA*, trunco subramoso, foliis auriculisque imbricatis subrotundis margine ciliatis.
Dill. t. 71. f. 18. Michel. t. 5. f. 8.

In sylvaticis umbrosis.

††† *stipulatae.*

1265. *J. BIDENTATA*, trunco prostrato radicante, foliis ovatis apice emarginatis bidentatis, stipulis bipartitis quadridentatis. *Dill. t. 70. f. 11.*
Michel. t. 5. f. 12.

In umbrosis vulgarissima. *Occurrit varietas minor, foliis bicuspidatis quae J. bicuspidatam imitatur, solo microscopio, quod stipulas ostendit, distinguenda.*

1266. *J. PALLASCENS*, trunco prostrato, foliis ovato-subrotundis integerrimis, stipulis ovatis acutis bifidis. *Ehrh.*

In collibus sylvaticis ad septentrionem, Zorgs.

1267. *J. TRICHOMANIS*, trunco prostrato, foliis ovatis stipulisque subrotundis emarginatis. *Dicks t. 8. f. 5. Dill. t. 51. f. 5.*

Ad rivulos umbrosissimos hinter dem Fasanen-hause. *Priori simillima, sed minor et foliis stipulisque emarginatis discrepans.*

1268. *J. TRILOBATA*, trunco repente radicante, foliis stipulisque subquadratis imbricatis apice tridentatis. *Dill. t. 71. f. 22. A. B.*

In sylvaticis umbrosis. *J. barbata simillima, sed caret stipulis.*

1269. *J. REPTANS*, trunco repente, foliis stipulisque quadratis apice subquadrifidis, calycibus tri-

quetris. *Dill. t. 71. f. 24. Schmidel icon. et anal. t. 68.*

In sylvaticis umbrosis.

1270. *J. CILIARIS*, trunco repente glabro, foliis stipulisque ovatis incisus dentato-ciliatis imbricatis, calycibus glabris. *Dill. t. 69. f. 3. Hofm. germ. t. 2.*

In rupibus umbrosis.

* 1271. *J. TOMENTELLA*, trunco repente tomentoso, foliis stipulisque oblongis multifido-ciliatis imbricatis, calycibus hirsutis. *Dill. t. 73. f. 35.*

Ibidem.

1272. *J. COMPLANATA*, trunco repente complanata, foliis stipulisque rotundatis planis integerrimis densissime imbricatis, calycibus oblongis compressis. *Dill. t. 72. f. 26. Fl. dan. 1000. Curt. n. 45.*

Ad arborum truncos.

1273. *J. PLATYPHYLLA*, trunco procumbente, foliis ovatis imbricatis, stipulisque integerrimis triplici ordine, intermediis duplo maioribus. *Dill. t. 72. f. 32.*

In rupibus ad Giebichenstein.

1274. *J. DILATATA*, trunco repente dense caespitosa, foliis rotundatis imbricatis arcte appressis, stipulis lateralibus ovatis, intermediis bifidis margine revolutis approximatis. *Roth. J. tamariscifolia Schmidel icon. et anal. t. 57. Dill. t. 72. f. 27. Michel. t. 6. f. 5.*

In rupibus.

1275. *J. TAMARISCIFOLIA*, trunco repente laxiuscula, foliis rotundatis laxius imbricatis, stipulis lateralibus rotundatis, intermediis ovatis bifidis planis remotis. *Michel. t. 6. f. 6. Dill. t. 72. f. 31. Engl. bot. 1086.*

In arborum truncis. *Stipulas in his saepe clavatas (maxime in J. magellanica) perperam pro capsulis et capsulas pro antheris quadriovalvibus habet* Palisot-Beauvois (*flore d'Oware* 3, p. 21: *Carpolepidum*.)

** *Acaules.*

1276. *J. EPIPHYLLA*, fronde obverso ovata obtuse lobata medio fructifera. *Hedw. theor. gener. t. 23—25. Hofm. germ. t. 4. Dill. t. 74. f. 41. Fl. dan. 359.*

In rivulis umbrosissimis, ad Seeben, Dölau.

1277. *J. PINGUIS*, frondibus carnosis oblongis dichotomis laciniatis, latere fructiferis. *Dill. t. 74. f. 42. Schmidel icon. et anal. t. 35.*

In media via per nemusculum Seebenſe.

1278. *J. FURCATA*, frondibus linearibus dichotomis integerrimis nervosis emarginatis. *Dill. t. 74. f. 45. Hedw. theor. gen. t. 21. 22.*

In scrobibus rupium. *Gemmas vesiculares sub fronde gerit.*

427. MARCHANTIA.

1279. *M. POLYMORPHA*, frondibus obtuse lobatis, receptaculo gemmifero duplici, scyphiformi et peltato, seminifero radiato. *Dill. t. 76. 77. f. 7. Schmidel t. 9.*

In locis umbrosis, cultis, rupestribus, humidis copiose.

1280. *M. CONICA*, frondibus dichotomis sinuatis verrucosis, receptaculo gemmifero simplici sessili, seminifero conico. *Dill. t. 75. f. 1. Schmidel t. 31. Hedw. theor. gener. t. 25. 26. Fl. dan. 274.*

Ad rivulos in nemusculo Seebenſi. *Sed nondum fructiferam inveni.*

VI. HOMALLOPHYLLAE.

428. TARGIONIA.

- * 1281. T. MYPOPHYLLA. *Michel. t. 3. Schreber im Naturforsch. 15. t. 5. Sprengel in act. holm. 1802. t. 4. Pronotar. soc. philomath. 9. N. 52. p. 27. Sturm. II. 3.*

In rupibus ad Kröllwitz.

429. RICCIA.

- † 1282. R. GLAUCA, frondibus dichotomis apice emarginatis obtusis sulcatis. *Dill. t. 78. f. 10. Schmidel t. 44. f. 1. Fl. dan. 898. f. 1. R. crysiallina Leyss.*

In agris sabulosis limosis autumnis.

- * 1283. R. CILIARIS, frondibus dichotomis lanceolatis apice bifidis obtusiusculis concavis ciliatis. *Schmidel t. 45. f. 4.*

In rupibus ad Giebichenstein.

- † 1284. R. PYRAMIDATA, frondibus oblongis indivisis, apice inferne triangulariter incrassatis, fructibus pyramidatis. *Dill. t. 78. f. 16.*

In rupibus ad Giebichenstein *Willd. bot. Magaz. 4. p. 9.*

VII. LICHENES.

430. OPEGRAPHA.

- * 1285. O. VULGATA, crusta tenui effusa albo-virescente subpulverulenta, lirellis oblongo-linearibus simplicibus confertis. *Fl. dan. 1242. f. 2.*

In cortice abietum.

- * 1286. O. RUBELLA, crusta limitata rugulosa rubra, lirellis simplicibus oblongis subflexuosis. *Perf. in bot. annal. 7. t. 1. f. 2. a.*

In cortice ulmorum.

- * 1287. O. ONSCURA, crusta membranacea suboliva.

ca. lirellis simplicibus oblongis difformibus rugulosis. *Perf. l. c. t. 3. f. 5. B. b.*

In cortice quercuum et ulmorum.

1288. O. PARALLELA, crusta effusa candida laevissima, lirellis simplicibus lineari-ellipticis acuminatis parallelis. *Hysterium abietinum Perf.*

Ad ligna exsiccata abietina.

1289. O. PULVERULENTA, crusta effusa alba membranacea, lirellis connato-subramosis flexuosis linearibus pulverulentis. *Perf. l. c. t. 1. f. 2. B. b.*

In cortice alnorum.

1290. O. SERPENTINA, crusta limitata alba leprosa, lirellis flexuoso-ramosis linearibus pruinosis subcaesiis. *Fl. dan. 1242. f. 1.*

In cortice corylorum, Populi tremulae et acerum.

291. O. SCRIPTA, crusta tenuissima albo-virescente, nigro limitata, lirellis flexuosis simplicibus ramosisque glabris.

In cortice quercuum et corylorum.

431. LECIDEA.

* *Thallus crustaceus uniformis.*

1292. L. MUSCORUM, crusta tenui albicante, patellulis convexis confluentibus atris. *Fl. dan. 1003. f. 1. Sturm II. 6.*

Muscis destructis innascitur.

1293. L. PARASEMA, crusta tenui cinereo-viridescente nigro-limitata, patellulis planiusculis atris. *L. sanguinarius Leyfs.*

In cortice arborum.

1294. L. LAPICIDA, crusta tartarea cinerea areolato-subrugosa, patellulis depressis confertis subconfluentibus angulosis atris. *Hofm. lich. t. 57. f. 2. L. pertusus Leyfs.*

In saxis et rupibus.

In nuda humo am Zorge. *Nimis adfinit* L. n. *pestri*.

*** *Thallus foliaceus submembranaceus peltatus.*

1310. L. PUSTULATA, thallo umbilicato papuloso cinereo-virescente subtus lacunoso fusco, patellulis subfessilibus atris. *Hofm., lich. t. 3. f. 1. 29. f. 3. Engl. bot. 1283. Fl. dan. 597. f. 2.*

In rupibus copiose. *Apud nos non fructifera sed plena gemmulis ramosis.*

432. URCEOLARIA.

1311. U. CALCAREA, crusta determinata tenuissimulosa pulverulento-candida, patellulis minutis immersis nigris. *Achar., method. l. 1. f. 1. L. calcarius Leyfs.*

In saxis calcareis copiose.

*1312. U. TESSULATA, crusta subdeterminata glauco-albo-glauescente, patellulis immersis, demum emergentibus nigris.

In saxis et rupibus.

*1313. U. CINEREA, crusta nigro-limitata tartarea rimosa verrucoso-areolata cinerea, patellulis immersis nigris subconfertis.

In rupibus porphyreis. *Ad Lecideam lapideam accedit, differt vero patellulis concavis marginibus accessorio cinctis; similis etiam Parmeliae Glaucomati, quas differt scutellis elevatis marginibus proprio thalloe coronatis. Hofmanni (lich. t. 22. f. 1.) vix diversam existimo. Quomodo differat a Parmelia multipuncta Achar. (Hofm. lich. t. 63.) equidem ambigo, quum in rupibus nostris transitus facillime observetur, marginibus etiam accessorius in nostra adsit.*

*1314. U. SCHUPOSA, crusta effusa tartarea rugulata granulata albo-cinerascente, patellulis immersis nigris, margine accessorio tumido

Hexo subcrenulato. Hofm. lich. t. 11. f. 2.
Engl. bot. 266. Spreng. Anl. t. 9. f. 91.

In saxis et rupibus.

4. *U. bryophila, patallulis nigro-caestis, margine accessorio subnullo, proprio libero.*
Hofm. lich. t. 21. f. 1.

In multis ad terram. *Anibitus foliaceus thalli*
Baeomyci cuidam adiudicandus. Achar.

433. CALICIUM.

1315. *C. CLAVICULARIS*, crusta leproso-granulosa cinereo-olivacea, pilidiis ferrugineo-atris. *C. salicinum. Persf. in bot. Ann. 7. t. 3. f. 3.*
Embolus senulcralis Batsch el. fung. t. 26. f. 133. Dill. t. 14. f. 3.

In cortice salicum, quercuum, ulmorum. Stilbum quoddam aut Dematium virescens mentitur, agerrime dignoscendum.

1316. *C. HYPERELLUM*, crusta rugulosa areolata flavo-virescente, pilidiis atris, pedicello basi incrassato. *Spreng. Anl. t. 9. f. 88.*

In cortice abietum.

1317. *C. CANTHERELLUM*, crusta tenui albo-pulverulenta, pilidiis lutescentibus, pedicello filiformi demum fulco-rufescente. *C. pallidum Persf. in bot. Ann. 7. t. 3. f. 1. 2.*

In cortice arborum variarum.

1318. *C. CAPITELLATUM*, crusta pulverulenta flavicante, pilidiis globosis pedicellis filiformibus incarnato-flavo-pulverulentis. *Batsch el. fung. t. 30. f. 178. (sed color non exacte quadrat)*

Ad truncos ulmorum vetustarum, ad Seeben.

434. GYROPHORA.

1319. *G. DRYINA*, thallo membranaceo sublobato

In nuda humo am Zorgs. *Nimis adfinis L. re-
pofiri.*

*** *Thallus foliaceus submembranaceus
peltatus.*

1310. *L. PUSTULATA*, thallo umbilicato papuloso ci-
nereo-virescente subtus lacunoso fusco, patel-
lulis subfessilibus atris. *Hofm. lich. t. 2.
f. 1. 29. f. 3. Engl. bot. 1283. Fl. dan. 597. f. 2.*

In rupibus copiose. *Apud nos non frutifera
sed plena gemmulis ramosis.*

432. URCEOLARIA.

1311. *U. CALCAREA*, crusta determinata tenuis-
simulosa pulverulento-candida, patellulis im-
mersis nigris. *Achar. method. lich. t. 1.
f. 1. L. calcarius Leyfs.*

In saxis calcareis copiose.

* 1312. *U. TESSULATA*, crusta subdeterminata glau-
albo-glaucelcente, patellulis immersis, demum
emergentibus nigris.

In saxis et rupibus.

* 1313. *U. CINEREA*, crusta nigro-limitata tartareo-
rimosa verrucoso-areolata cinerea, patellulis
immersis nigris subconfertis.

In rupibus porphyreis. *Ad Lecideam lapideam
accedit, differt vero patellulis concavis margi-
nibus accessorio cinctis; similis etiam Parmeliae Glau-
comati, quae differt scutellis elevatis margi-
nibus proprio thallode coronatis. Hofmanni (lich.
t. 22. f. 1.) vix diversam existimo. Quomodo
differat a Parmelia multipuncta Achar. (Hofm.
lich. t. 63.) equidem ambigo, quum in rupibus
nostris transitus facillime observetur, namque
etiam accessorius in nostra adsit.*

* 1314. *U. SCHRUPOSA*, crusta effusa tartarea rugosa
plicata granulata albo-cinerascente, patellulis
immersis nigris, margine accessorio tumido in-

In cortice fagorum.

- * 1326. *V. GEMMATA*, crusta effusa laevigata glaucescente, tuberculis sparsis papillatis atris nitidis. *Achar. meth. t. 3. f. 1.*

In cortice quercuum.

- * 1327. *V. NITIDA*, crusta effusa cartilagineo-membracea laevigata pallido-virescente, tuberculis confertis papillatis atris nitidis. *Sphaeria nitida Weig. obs. t. 2. f. 14. Spreng. Anl. t. 10. f. 98.*

In truncis fagorum et quercuum.

- * 1328. *V. UMBRINA*, crusta subdeterminata tenuissima rimosa umbrino-fusca, tuberculis papillatis fusco-nigris.

In rupibus ad Giebichenstein.

436. ENDOCARPON.

- * 1329. *E. MINIATUM*, thallo foliaceo ambitu subrepando subcartilagineo albo-cinerascente punctato, subtus fulvo. *Fl. dan. 532. f. 1. Spreng. Anl. t. 8. f. 80. L. minutus Lcyx. Sphaeria foliacea Bolt. t. 131.*

In rupibus ad Giebichenstein et Kröllwitz copiose.

437. SPHAEROPHORON.

- * 1330. *SPH. FRAGILE*, thallo fruticuloso caespitoso fragili cinereo-fusco, ramis brevibus confertis fastigiatis, cistulis turbinato-globosis subverruculosis. *Achar. meth. t. 3. f. 5. Hofm. lich. t. 33. f. 3.*

In collibus calcareis ad Schmon.

438. BAEOMYCES.

* *Podetia aequalia.*

- * 1331. *B. ROSA*, thallo crustaceo leproso cinerascente, podetiis brevissime cylindricis albis, sphaeolus planiusculis globosis carneis. *Fl. dan. 1003. f. 2.*

Ad terram argillosam.

- * 1332. *B. AURESTRIS*, thallo crustaceo granulato albo-virescente, podetiis subcompressis albis, cephalodiis terminalibus rufo-fulcis. *Dill.* t. 14. f. 4. 5.

In rupibus et ad terram limosam,

- * 1333. *B. DELICATUS*, thallo crustaceo cartilagineo lobato, laciniis minutissimis lineari-multifidis crispis erectiusculis pulverulentis albis, podetiis filiformibus nudis simplicibus subdivisisque, cephalodiis conglomeratis fusco-nigris.

Ad corticem arborum putrescentium.

** *Podetia apice dilatata, scyphiformis.*
Thallus cartilagineus lobatus, laciniis inciso-crenatis.

- * 1334. *B. BACILLARIS*, podetiis filiformibus cinctis, scyphis subcylindricis integris clausis aut nullis, cephalodiis coccineis. *Dill.* t. 14. f. 10.

In sylvaticis ad terram,

- * 1335. *B. COCCINEUS*, podetiis brevibus cinereo-virescentibus, scyphis dilatatis integris clausis, cephalodiis marginalibus coccineis. *Dill.* t. 14. f. 7. A. D. *Spreng. Atl.* t. 9. f. 9. *Fl. dan.* 1188. f. 1.

In sylvaticis,

- * 1336. *B. CORNUCOPIOIDES*, podetiis cinereis, scyphis turbinatis clausis ambitu foliaceo-squamulosis, cephalodiis marginalibus subpedicellatis coccineo-spadiceis. *Dill.* t. 14. f. 9.

In ericetis sylvaticis,

- * 1337. *B. DIGITATUS*, podetiis cylindricis subdivisis flexuosis squamulosis cinereis, scyphis obsoletis digitato-radiatis, cephalodiis coccineis. *Dill.* t. 15. f. 19. A. B. *Fl. dan.* 1188. f. 2.

In ericetis sylvaticis rarius.

- * 1338. *B. DEFORMIS*, podetiis elongatis clavato-ventricosis pallide virefcentibus pulverulentis subdivisis subsquamulosis, scyphis denticulatis clausis demum perviis, cephalodiis marginalibus coccineis, *Dill. t. 15. f. 18.*

In sylvaticis rarius.

- * 1339. *B. PYRIDATUS*, podetiis brevibus, scyphis cyathiformibus clausis integris, cephalodiis marginalibus fuscis, *Dill. t. 14. f. 6. A.*

In ericetis copiose.

- * 1340. *B. RADIATUS*, podetiis elongatis cylindricis albo-virefcentibus pulverulentis subsquamulosis, scyphis irregularibus subdenticulatis digitato-radiatis, cephalodiis terminalibus fuscis, *Dill. t. 15. f. 16. Fl. dan. 1188. f. 3.*

In ericetis sylvaticis rarius.

- * 1341. *B. GRACILIS*, podetiis elongatis filiformibus acuminatis sterilibus scyphiferisque, scyphis clausis subulato-dentatis, cephalodiis pedicellatis fuscis. *Dill. t. 14. f. 13. C. D.*

In ericetis sylvaticis.

- * 1342. *B. PNEOLEPIS*, podetiis cinereo-fulcescentibus rigidis squamosis brevibus, scyphis irregularibus lacero-crispis vage ramosis proliferisque substerilibus. *Dill. t. 14. f. 9.*

In ericetis sylvaticis.

- * 1343. *B. ALCICORNIS*, podetiis suprafoliaceis brevissimis, scyphis minutis turbinateis, cephalodiis marginalibus, *Dill. t. 14. f. 12. A.*

In ericetis sylvaticis.

*** *Thallus subfoliaceus evanescens.*

- * 1344. *B. UNCIALIS*, podetiis caespitose-aggregatis tubulosis albo-virefcentibus, ramis brevibus palmatis stellato-radiatis densiculatis perforatis,

328. CLASS. XX. ATELIA.

cephalodiis minutis, globosis spadiceis. *Dill.*
t. 16. f. 22.

In ericetis sylvaticis.

*345. *B. RANGIFERINUS*, podetiis teretibus tubulosis
ramosissimis cinerascens, axillis perforatis,
ramulis apice cernuis, cephalodiis globosis fus-
cis. *Dill.* t. 16. f. 29. *Engl. bot.* 173. *Fl.*
dan. 539. *Svensk bot.* t. 47.

In sterilibus ubique.

*346. *B. FURCATUS*, podetiis teretibus squamulosis
tubulosis attenuatis ramosis subdichotomis acu-
minatis, cephalodiis fuscis. *Dill.* t. 16.
f. 26. 27.

In ericetis sylvaticis. (*Huc et B. subulans*
Achar.)

*1347. *B. SPINOSUS*, podetiis tubulosis teretiusculis
vage ramosis, ramis curvatis flexuosis retror-
sum spinulosis, cephalodiis fuscis. *Dill.*
t. 16. f. 25.

In ericetis rarius.

439. USNEA.

1348. *U. FLORIDA*, thallo subcrustaceo fruticuloso
tereti exasperato fibrilloso, fibrillis horizonta-
libus, ramis sparsis subfastigiatis simpliciuscu-
lis, orbillis terminalibus albo-virescentibus,
tuberculis gemmaiferis luteis. *Dill.* t. 15.
f. 13. *Hofm. lich.* t. 30. f. 2.

In quercubus annosis ad Lodersleben et Schmon.

β. *U. hirta*, thallo magis caespitoso, graciliori.
Dill. t. 15. f. 12. *Hofm.* t. 30. f. 1.

In arboribus ubique.

1349. *U. FLICATA*, thallo filamentoso-ramoso pen-
dulo, ramulis elongatis fibrillosis implexis, or-
billisque pallescentibus. *Dill.* t. 11. f. 1.
Spreng. Anal. t. 9. f. 83. 84.

In truncis quercuum vepastarum apud Schleherode, Schmon.

150. *U. BARBATA*, thallo filamentoso pendulo, ramulis filiformibus elongatis dichotomis subarticulatis, tuberculis gemmiferis incarnatis.
Dill. t. 12. f. 6.

In truncis pinuum vetustarum, rarius.

440. CORNICULARIA.

151. *C. SPADICEA*, thallo cartilagineo fruticuloso glabro castaneo, ramulis plano-compressis sublacunosis flexuosis denticulatis. *Dill. t. 17. f. 31. Hofm. lich. t. 5. f. 2. L. islandicus tenuissimus Lys.*

In montibus sterilibus ad Giechenstein et Trotha rarius.

152. *C. ACULEATA*, thallo cartilagineo fruticuloso glabro-castaneo, ramulis brevibus confertis angulosis compressis, apice spinuloso-denticulatis. *Michel. t. 39. f. 7.*

In montibus sterilibus ad Giebichenstein frequens.

441. THELOTREMA.

153. *TH. PERTUSUM*, crusta submembranacea verrucosa cinerea, verrucis subglobosis-foratis. *Dill. t. 18. f. 9. Fl. dan. 766. Spreng. Anl. t. 10. f. 99. Sphaeria pertusa Bolt. t. 126.*

In trunco fagorum annosarum ad Erdeborn et Lodersleben.

442. PARMELIA.

1. *Thallus crustaceus uniformis.*

154. *P. ATRA*, crusta rugoso-granulata cinerea, scutellis planiusculis auria margine flexuoso. *Dill. t. 18. f. 15. A.*

In cortice arborum.

155. *P. PERICLEA*, crusta leprosa tenui albida, scutellis atris scabris hemisphaericis.

⁂ In cortice pinuum et abietum.

- *1356. P. GLAUCOMA, crusta tartarea rimosa albo-cinerascente, scutellis convexis congestis ossio-pruinosis, demum nigris, margine flexuoso: *Hofm. lich. t. 52. 53.*

In rupibus nostris et saxis. *Similis* Lecideae epipoliae, a qua tamen tum rimosa crusta, tum margine accessorio vero differt.

- *1357. P. ANGULOSA, crusta tenui albo-cinerascente, scutellis plano-convexis aggregatis angulosis cinereo-fuscis,

⁂ In cortice arborum frequens.

- *1358. P. ALBELLA, crusta tenui glabra lactea, scutellis minutis sparsis concoloribus, disco immum subcarneo.

⁂ In asperibus et cortice quercuum.

- *1359. P. PARILLA, crusta tartarea rimoso-verrucosa alba, scutellis confertis subconcavis concoloribus margine turgido. *Dill. t. 18. f. 11. Hofm. lich. t. 12. f. 5.*

In rupibus et arborum truncis, ubi P. *palescens* audit. (*Hofm. lich. t. 21. f. 2.*)

- *1360. P. TARTAREA, crusta tartarea granulata albivirescente, scutellis planis testaceis sublaevissimis rugulosis, margine turgido albo. *Fl. dan. 712. f. 1. Sturm II. 6.*

In rupibus nostris rarior.

- *1361. P. VENTOSA, crusta tartarea rimosa cinereo-flavescente, areolis plicato-verrucosis, scutellis tumidulis irregularibus rufo-fuscis, margine tenui pallido. *Verrucaria cruenta Hofm. lich. t. 27. f. 1. Sturm II. 4. Fl. dan. 472. f. 1. L. cruentus Leyf.*

In rupibus passim.

- *1362. P. SUBFUSCA, crusta tenuissima laevigata albo-

cineralcente, scutellis sparsis convexiusculis ru-
fescens, margine turgido.

Ad arborum corticem.

β. *P. pellaea*, *scutellis confertissimis fuscis, mar-
gine albo.*

In faxis psammiticis. *Invitus coniunge hanc
varietatem, satis dissimilem.*

*1363. *P. dispersa*, crusta dispersa inaequabili ci-
nerea, scutellis sparsis minutis fulco-caeliis
pruinoso-nigris, margine crenulato exalbido.

In rupibus nostris frequentissima, crusta saepe
nulla.

*1364. *P. rubra*, crusta effusa granuloso-pulveru-
lenta alba, scutellis concavis rubris, margine
convexo crenulato albo-pulverulento. *Hofm.
lich. t. 17. f. 2.*

In cortice ulmorum et ad latera rupium muscosa.

*1365. *P. effusa*, crusta effusa tenui pulverulenta
dilute aeruginosa, scutellis convexiusculis pal-
lide fuscis, margine tenuissimo flavo-vire-
scente.

Ad salicis corticem.

*1366. *P. salicina*, crusta effusa granulosa cinereo-
lolescente, scutellis demum convexis aurantia-
cis, margine pallidiori. *Hofm. lich. t. 61.
f. 3-9.*

Ad salicis corticem.

β. *P. erythrella*, *crusta fluidiore; in saxis.*

*1367. *P. cerina*, crusta effusa tenui subcinerea,
scutellis planis ceriis, margine cinereo. *Hedw.
strep. II. 21. B. Hofm. lich. t. 33. f. 1.*

In cortice arborum.

*1368. *P. vitellina*, crusta leprosa granulata vitel-
lina, scutellis planis confertis concoloribus dif-
formibus subpruinosis. *Hofm. lich. t. 26. f. 1.*

In affertibus.

- *1369. *P. VARIA*, crusta granulata cinereo flavo-virescente, scutellis confertis planis fusco-flavescentibus, margine albido aut cinereo. *Hofm. t. 23. f. 4. Sturm II. 4.*

Ad afferes. *Huc potius Verr. pallida Hofm. quam ad V. subfuscum, quo Achar. refert.*

2. *Thallus effiguratus squamose-imbricatus.*

- *1370. *P. HYPERICUM*, crusta imbricata laciniato-lobata, margine pulverulento, viridi-fusca, scutellis sparsis planis fusco-rufis.

In muscis.

- *1371. *P. LEPIDORA*, crusta subimbricata granulato-lobata pallide lutescente, scutellis planis badia, margine crenato-squamuloso. *Hofm. t. 6. f. 4—7. Fl. dan. 956.*

In muscis.

- *1372. *P. CANDELARIA*, crusta imbricato-lobata, lobis confertissimis lacero-granulatis viridiflavis, scutellis planis concoloribus. *Byssus candelaris Ley. Fl. dan. 899. f. 2.*

In arborum cortice, rupibus, saxis.

3. *Thallus foliaceus plano-depressus orbicularis, ambitu lobato-stellato.*

- *1373. *P. CIRCINNATA*, crusta radiato-rimosa cinereo-caesia, scutellis centralibus confertissimis planis nigricantibus, margine tenuissimo cinereo. *Hofm. t. 59. f. 1. 60. f. 3.*

In saxis et rupibus, psammiticis.

- *1374. *P. SAXICOLA*, crusta subimbricata pallide virescente, lobis crenatis implicato-flexuosis, scutellis planiusculis incarnatis, margine pallide crenulato. *Hofm. t. 16. f. 1.*

In saxis ubique.

579. *P. LENTIGERA*, crusta subimbricata alba, lobis planiusculis crenatis, scutellis confertis planiusculis flavo-rufescentibus. *Hofm. t. 48. f. 1. Fl. dan. 1185. f. 2.*

In apricis editioribus ad terram.

1376. *P. VULGENS*, crusta subimbricata pallide flava, lobis inciso-crenatis subtus albidis, scutellis planiusculis ruberrimis. *Hofm. t. 48. f. 2. Hedw. stirp. II. 30. C.*

Cum priore, maxime zwischen dem Rocken- und Mittelholze, am Wege von Teicha nach Oppin.

1377. *P. REGULARIS*, crusta depressa aurantiaca, ambitu inciso-lobato, lobis lineari-multifidis, scutellis concoloribus. *Hofm. t. 17. f. 3. 2.*

In muris lateritiis antiquis.

1378. *P. MINIATA*, crusta granulosa miniata, ambitu lobato, lobis obtusis minutis subincisis, scutellis concoloribus. *Hofm. t. 60. f. 1.*

In faxis et rupibus.

1379. *P. MURORUM*, crusta plicato-rugosa rimosa virefcenti-flava, lobis incisis, scutellis subconcoloribus, margine dilutiori. *Hofm. t. 17. f. 3.*

In faxis et muris frequentissima,

1380. *P. CARSIA*, thallo cinerascens subtus nigro-fibrilloso, sorediis gemmiferis caesiis, scutellis planis pruinosis-nigris, margine albo. *Hofm. lich. t. 8. f. 1.*

In rupibus horti botanici et aliis.

1381. *P. CYCLOSELIS*, thallo cinereo glauco multifido, laciniis margine elevatis pulverulentis, subtus nigro fibrilloso spongioso, scutellis fusco-nigris, margine subcrenulato. *Hofm. t. 66. f. 1.*

In arborum truncis copiose, passim etiam in faxis. Quandoque adnascuntur scutellarum facies

inferiori ciliola: unde P. ulothrix Achar. (Dill. t. 24. f. 72.) huc potius referenda.

1382. *P. SAXATILIS*; thallo cinereo - glaucescente scabro lacunoso, subtus nigro fibrilloso, scutellis badiis. *Dill. t. 24. f. 83.*

In saxis vulgarissima; sed scutellae rarissimae.

1383. *P. CONSPERSA*, thallo subcoriaceo virescente glabro punctato, sorediis subramosis, scutellis centralibus spadiceis, margine inflexo integro. *Hofm. t. 16. f. 2. L. centrifugus Leyss.*

In saxis et rupibus.

1384. *P. AMBIGUA*, thallo sulfureo - virescente pulverulento, scutellis sparvis rubro - spadiceis planis, margine elevato subintegro. *Hofm. t. 40. f. 2 — 4. 42. f. 2. 3.*

Ad alferes.

1385. *P. STELLARIS*, thallo cinereo, laciniis subnearibus stellatis subtus cinereo - fibrillosis, scutellis caesiis, demum nigris. *Fl. dan. 957.*

In cortice arborum ubique.

1386. *P. ALPOLIA*, thallo cinereo - spadiceo - caesiis, subtus nigro fibrilloso, laciniis imbricatis planis crenatis, scutellis caesiis, margine tumido albo.

In truncis vetustis ulmorum.

1387. *P. FULVERULENTA*, thallo (humectato) viridi - fulco, (sicco) cinereo pruinoso, subtus nigro tomentoso, scutellis caesiis. *Hofm. lich. t. 8. f. 2.*

In truncis arborum ubique.

1388. *P. PARIETINA*, thallo stellato flavo subtus subfibrilloso, laciniis rotundato - lobatis crispis, scutellis concoloribus. *Dill. t. 24. f. 76. Fl. dan. 1005.*

In muris, arboribus ubique.

1375. *P. LENTIGERA*, crusta subimbricata alba, lobis planiusculis crematis, scutellis confertis planiusculis flavo-rufescentibus. *Hofm. t. 48. f. 1. Fl. dan. 1185. f. 2.*

In apricis editioribus ad terram.

1376. *P. VULGARE*, crusta subimbricata pallide flava, lobis inciso-crenatis subtus albidis, scutellis planiusculis ruberrimis. *Hofm. t. 48. f. 2. Hedw. Stirp. II. 30. C.*

Cum priote, maxime zwischen dem Rocken- und Mittelholze, am Wege von Teicha nach Oppin.

1377. *P. REGULARIS*, crusta depressa aurantiaca, ambitu inciso-lobato, lobis lineari-multifidis, scutellis concoloribus. *Hofm. t. 17. f. 3. a.*

In muris lateritiis antiquis.

1378. *P. MINIATA*, crusta granulosa miniata, ambitu lobato, lobis obtusis minutis subincisis, scutellis concoloribus. *Hofm. t. 60. f. 1.*

In saxis et rupibus.

1379. *P. MURORUM*, crusta plicato-rugosa rimosa virescenti-flava, lobis incisis, scutellis subconcoloribus, margine dilutiori. *Hofm. t. 17. f. 3.*

In saxis et muris frequentissima.

1380. *P. CARSIA*, thallo cinerascens subtus nigro-fibrilloso, sorediis gemmiferis caesiis, scutellis planis pruinosis-nigris, margine albo. *Hofm. lich. t. 8. f. 1.*

In rupibus horti botanici et aliis.

1381. *P. CYCLOSELIS*, thallo cinereo glauco multifido, laciniis margine elevatis pulverulentis, subtus nigro fibrilloso spongioso, scutellis fusco-nigris, margine subcrenulato. *Hofm. t. 66. f. 1.*

In arborum truncis copiose, passim etiam in saxis. Quandoque adnascuntur scutellarum facies

- marginalibus depresso maioribus rotundatis, scutellis sparsis badiis submarginalibus. *Lichen pulposus Bernhard. Schrad. journ. 1799. t. 1. f. 1. Fl. dan. 462. f. 1.*

Inter muscos.

- *1396. *P. fascicularis*, thallo imbricato atro-viridi, lobis confertissimis plicatis crispis anastomofantibus granulatis, scutellis marginalibus turbinato-pedicellatis fasciculatis obscure rufis. *Bernh. l. c. f. 3. a. Engl. bot. 1162. Dill. t. 19. f. 27. Fl. dan. 462. f. 2.*

In saxis et collibus, dicht hinter der Ziegelscheune.

- *1397. *P. subtilis*, thallo substellato fusco-viridi, laciniis expressis angustissimis radiatim subdivisis obtusis, scutellis centralibus planiusculis concoloribus. *Bernhard. l. c. t. 2. f. 6.*

In glebis calcareis.

- *1398. *P. muscicola*, thallo pulvinato atro-viridi, laciniis teretibus erectiusculis nodulosis fastigiatis obtusiusculis, scutellis planis bruneis. *Dicks. t. 6. f. 9. Bernh. l. c. t. 2. f. 7. a. 8.*

In muscis.

5. *Thallus foliaceus depressus, laciniis linearibus subinflatis.*

- *1399. *P. tenella*, thallo cinerascete, laciniis ciliatis obtusis apice fornicatis, scutellis caesiis nigris. *Hofm. t. 3. f. 2. Sturn II. 1. Fl. dan. 1186. f. 1.*

Ad corticem arborum frequens.

1400. *P. physodes*, thallo glabro albicante subtus nigro-fusco, laciniis sinuato-multifidis, scutellis rubris. *Dill. t. 20. f. 49. Fl. dan. 1186. f. 2.*

Ad corticem arborum.

- *1401. *P. diatrypa*, thallo cinereo subtus albo nigro-fibrilloso, laciniis foratis, scutellis rubellis margine albo.

d corticem acerum.

6. *Thallus foliaceus subcaespitosus, laciniis erectiusculis linearibus subtus canaliculatis.*

3. *P. FURFURACEA*, thallo cinereo pulverulento subtus fusco nudo, scutellis lateralibus concavis rubris. *Hofm. t. 9. f. 2. Dill. t. 21. f. 52.*

n campis rupestribus, am Ochsenberge bei Kröllwitz copiose.

5. *P. CILIARIS*, thallo virescenti-glaucobrunneo subtus nudo albicante, laciniis apice fibrillosis, scutellis nigro-caesiis. *Hofm. t. 3. f. 4. Fl. dan. 711. Sturm II. 3.*

n rupibus et ad corticem arborum.

14. *P. PRUNASTRI*, thallo molli rugoso-lacunoso exalbido, laciniis divaricatis attenuatis, scutellis concavis badiis. *Dill. t. 21. f. 54.*

In cortice arborum ubique.

7. *Thallus cartilagineus subfoliaceus, laciniis planis lacunosis attenuatis glabris.*

15. *P. FRAXINEA*, thallo caespitoso albo-cinerascente rugoso-lacunoso, laciniis laciniatis, scutellis planis concoloribus. *Hofm. t. 18. f. 1.*

2. *Dill. t. 21. f. 55. A. Fl. dan. 1187.*

In cortice arborum copiose.

16. *P. FASTIGIATA*, thallo caespitoso cinerascente, laciniis fastigiatis sursum incrassatis, scutellis concoloribus. *Dill. t. 21. f. 55. B.*

In cortice arborum.

8. *P. calycaris, laciniis linearibus subcanaliculatis, scutellis subtus calcaratis.* *Dill. t. 23. f. 62. A. B. Fl. dan. 959.*

Ibidem rarius.

CLASS. XX. ATELIA.

1407. *P. FARINACEA*, thallo caespitoso cinereo, foliis confertis marginalibus scutellisque pedicatis concoloribus. *Dill. t. 23. f. 63.*

Ibidem copiose. (*Huius rudimentum: Var. laria faginea Achar.?*)

1408. *P. POLLINARIA*, thallo caespitoso cinereo, ciliis pulverulentis, scutellis terminalibus bis subtus virefcentibus.

Ad rupes copiose. (*Pulvis pollinarius microscopio delineatus Spreng. Atl. t. 10. f. 10. Huc Byssus incana Leyfs.*)

8. *Thallus filamentosus.*

1409. *P. JUBATA*, thallo cartilagineo tereti laevi cinereo, lorulis filiformibus ramosis, axillis compressis, scutellis concoloribus. *Dill. t. 12. f. 7. Schrad. Journ. 1799. 1. t. 3. f. 4.*

In cortice pinuum.

- ♂. chalybiformis, lorulis pendulis vagis implexis nigris. *Dill. t. 13. f. 10. Fl. dan. 205.*

Ibidem, sed rarius.

443. PELTIDEA.

1410. *P. VENOSA*, thallo coriaceo cinereo-virefcente subtus fusco-venoso, lobis rotundatis, peltis anticis marginalibus rotundis badio-rufis. *Hofm. t. 6. f. 2. Fl. dan. 1125. f. 1. Sturm II. 3.*

In sylvaticis umbrosis.

1411. *P. CANINA*, thallo coriaceo expanso cinereofuscescente, subtus albidiori, venis fibrillisque lobiscescentibus, lobis oblongis, peltis verticalibus anticis revolutis badio-rufis. *Fl. dan. 709. f. 2. (Color non satis quadrat.)*

In umbrosis frequentissime.

1412. *P. APHTHOSA*, thallo coriaceo expanso laevi

viridi, sorediis sparsis glaucis fuscis, subtus
avenio nigro-fibrilloso, peltis anticis rotundis
rubris. *Hofm. t. 6. f. 1. Fl. dan. 767. f. 1.*
Engl. bot. 1119.

In umbrosis pinetis.

444. CETRARIA.

- *1413. *C. FALLAX*, thallo membranaceo cinereo sub-
tus albo nigro-maculato inciso-lobato, laci-
niis complicatis lacero-crispis, peltis spadiceis.
Dill. t. 22. f. 58.

In truncis arborum acerofarum, sine peltis.

- *1414. *C. GLAUCA*, thallo membranaceo glauco sub-
tus nigro sinuato-lobato, laciniis complicatis
brevioribus, peltis rufo-fuscis. *Mich. t. 50.*
f. 1. Fl. dan. 598. f. 1.

In truncis arborum, sine peltis.

- *1415. *C. SEPINCOLA*, thallo membranaceo castaneo
subtus dilutiori vage lobato, laciniis adscen-
dentibus subcrenatis, peltis elevatis concolori-
bus margine ruguloso. *Hedw. stirp. II. 2.*

In sepibus, virgultis.

8. *C. ulophylla*, thallo membranaceo orbiculari
cinereo-fuscescente subtus pallidiori sinua-
to-lobato, laciniis adscendentibus lacero-
laciniatis margine pallido-pulverulentis,
peltis badiis. *Hofm. t. 14. f. 1. Lich.*
chlorophyllus Humboldt frib.

Ad truncos arborum sine peltis.

- *1416. *C. JUNIPERINA*, thallo membranaceo pallide
flavo subtus flavissimo lacero-laciniato, laciniis
adscendentibus complicatis eroso-crispis, pel-
tis elevatis badiis. *Hofm. t. 7. f. 2. Fl.*
dan. 1004.

Ad truncos juniperi.

β. *C. Pinastris*, laciniis margine pulverulentis flavissimis. *Hofm. t. 7. f. 1.*

In cortice pinuum. *Granula gemmifera spadicea fusca in superficie.*

VIII. A L G A E.

445. CONFERVA.

1. *Oscillatoriae* *Vauch. Annulatae continuae subiculo inhaerentes.*

*1417. *C. RONTINALIS*, filamentis simplicissimis aequalibus brevissimis lubricis viridi-ferrugineis capitosis. *Fl. dan. 651. f. 3. Michel. t. 89. f. 8. 11.*

In rivulis umbrosis ad lapides.

*1418. *C. LIMOSA*, filamentis glaucis tenuissimisissime compactis lubricis. *Dillw. conf. Vauch. t. 15. f. 4.*

In alveis aquariis (Röhrkästen) urbis nostrae. (*Huc et C. decorticata Dillw. t. 26.*)

*1419. *C. MURALIS*, filamentis viridi-sericeis curvato-implexis capillaribus. *Dillw. t. 7. Oscillatoria parietina Vauch. t. 15. f. 8. C. frigida Roth. cat. 1. p. 166.*

In muris vetustis, parietibus domuum septentrionem versus. Subiculum *subgranulosum*, ut *Monilium botryoidem* mentiatur.

*1420. *C. OCHRACEA*, filamentis ochraceis gelatinoso-flocculosis ramosis capillaribus compactis. *Roth. catal. 1. t. 5. f. 2.*

In palude ad Dölau, ubi ad latera rivulorum mariali aqua scatentium provenit.

*1421. *C. VAGINATA*, filamentis nigricantibus vaginatis, ramulis subsimplicibus divergentibus.

Vauch. t. 15. f. 13. *Conf. amphibia* γ. *atra*
Roth. germ. III. 1. p. 491. *C. velutina* β.
atra Roth. cat. 3. p. 200.

In muris vetustis pluvia humectatis.

2. *Ectospermae Vauch. Ceramia quae-*
dā Roth.

1422. *C. FRIGIDA*, filamentis viridibus repentibus
 dichotomo-ramosis granulosis continuis, glo-
 bulis gemmiferis sessilibus. *Dillw.* t. 16.

In agris limosis hinter der Heide. *Ferd. Fi-*
scher, botan. Moscov.

1423. *C. DICHOTOMA*, filamentis viridibus rectis
 fasciculatis dichotomis, globulis gemmiferis acu-
 minatis sessilibus. *Dillw.* t. 15. (excl. synon.
fl. dan.) *Dill.* t. 3. f. 9.

In fossis pratorum salforum prope Dieskau, Köl-
 nisch et ad lacum salsum.

1424. *C. FURCATA*, filamentis viridibus geniculatis
 divaricato-ramosis, articulis cylindricis, glo-
 bulis gemmiferis atropurpureis tuberculato-
 arillatis. *Hudf. Ceramium caespitosum*
Roth.

In fossis, aquis segnibus vulgatissima. (*Globuli*
insignem adfinitatem cum Charae flexilis globu-
lis habent. Cf. Conf. nidifica fl. dan. 761.)

1425. *C. FRACTA*, filamentis viridibus geniculatis
 divaricato-ramosis, geniculis annularibus, ar-
 ticulis subinflatis moniliformibus, globulis gem-
 miferis ellipticis. *Dillw.* t. 14. *Fl. dan.* 946.
Roth. catal. 1. t. 3. f. 1. 3. p. 230.

In rivulis et aquis segnibus. (*Forte subest C.*
bullosa L. et Leyss., forte etiam C. rivularis Leyss.,
saltem varietas.) Wohlleben hanc mihi C.
rivularem reliquit. In hac praesertim patet, glo-
bulos esse articulos rotundatos protrusos.

3. *Geniculatae nudaе.*

- *1426. *C. COMPACTA*, filamentis atro-viridibus geniculatis simplicibus crispatis, geniculis annularibus ventricosis, articulis obscuris. *Roth catal. 1. 1. f. 4.*

Ad lacum salsum copiose. (*C. Aegagropilum mentitur.*)

- *1427. *C. FUGACISSIMA*, filamentis sordide-flavescentibus geniculatis simplicibus rectis, siccatis fragilissimis, geniculis obscuris, articulis centro-diaphanis. *Roth catal. 1. 1. 2. f. 3.*

Ad paludem Dölav. *Fischer. Moscov.*

- *1428. *C. SORDIDA*, filamentis flavicantibus geniculatis simplicibus inflexis, geniculis linearibus parum contractis, articulis oblongis. *Roth catal. 1. 1. 2. f. 4.*

In aquis stagnantibus praesertim ad Nijmegen. (*Porte Ectosperma. Subest etiam C. mentitur. Leyfs.*)

- *1429. *C. ARENARIA*, filamentis laete viridibus geniculatis ramosis infractis dense implexis, articulis cylindricis, geniculis subcontractis. *Roth catal. 2. p. 217.*

In locis umbrosis, muscosis horti botanici. (*Forte parasitica infans muscis infantibus adhaeret. Cf. Sprengel Anl. 3. p. 255.*)

- *1430. *C. VELUTINA*, filamentis viridibus erectiusculis subramosis hinc inde hyalinis, geniculis fasciatis contractis. *Byssus velutina Leyfs.*

In ollis horti botanici vulgaris. *Michel. 1. 8. f. 5. Ectosperme terrestre Vauch. Ectosperma sum figura; sed ipse globulos gemmiformes, quos Vaucherus vidisse testatur, nusquam exspectari. C. varia Roth. catal. 3. p. 301. optimas Trentepohlii observationes adlegavit.*

- *1431. *C. UMBROSA*, filamentis viridibus geniculatis

ramosissimis dense inflexis, articulis inflatis, geniculis subcontractis. *Roth. catal. v. t. 4. f. 3.*

In puteis, ad loca umbrosa irrigua.

- *1432. *C. muscicola*, filamentis ochraceo-ferrugineis geniculatis ramosissimis, ramis divaricatis dense implexis, articulis brevibus aequalibus, geniculis subcontractis. *Roth. cat. 3. p. 297.*

Ad muscos in ericetis passim.

- *1433. *C. aurea*, filamentis aureis erectis rigidiusculis flexuoso-ramosis spurie geniculatis, ramulis subsecundis, articulis subquadratis. *Dillw. t. 35. Byssus aurea Leyss. fl. dan. 718. f. 1. Dematium aureum Pers.*

Ad rupes calcareas iuxta fl. Unstrut.

4. *Conjugatae* *Vauch.*

- *1434. ? *C. ericetorum*, filamentis subspadiceis intricatis subramosis geniculatis, articulis subquadratis. *Dillw. t. 1.*

In ericetis umbrosis subhumidis.

- *1435. *C. decimina*, filamentis nitide virentibus geniculatis simplicibus laxè intricatis, articulis elliptico-cylindricis, granulorum numerosorum linea spirali duplici decussante, filamentis parallelis demum conjugatis. *Müller nov. act. petrop. 3. t. 2. f. 2. 3. C. nitida Dillw. t. 4. A. B. fl. dan. 819. C. jugalis Dillw. t. 5. (fl. dan. 883. ?) C. setiformis et scalaris Roth. Conjugace majeure Vauch. t. 4. f. 1. C. adhaerente f. 4. C. bullosa Hedw. theor. gen. t. 37.*

In puteis, fossis et rivulis non raro.

- *1436. *C. quinina*, filamentis viridibus geniculatis simplicibus laxè intricatis, articulis cylindricis, granulorum pauciorum maiorum linea spirali simplici, filamentis parallelis demum conjugatis. *Müller l. c. f. 4. 5. C. spiralis Dillw. t. 3.*

Roth. catal. 2. p. 202. Conjuguée à portiques Vauch. t. 5. f. 1. renflée f. 3. allongée t. 6. f. 1.

In aquis segnibus passim.

5. *Polyspermae Vauch.*

- *1437. *C. GLOMERATA*, filamentis viridibus ramosis rectis geniculatis, ramis fasciculatis, articulis cylindricis granulosis. *Dillw. t. 13. Fl. dan. 651. f. 2. Vauch. t. 10. f. 4. 5. Cristata Roth. Dill. t. 5. f. 31.*

Ad cataractas Salae. (*Subest C. sericea Leyf. Cf. Wulffen crypt. aquat. p. 21.*)

- *1438. *C. TORULOSA*, filamentis fusco, viridibus torulosis, articulis ovalibus inflatis, geniculis contractis. *Roth. Dill. t. 7. f. 48.*

Ad cataractas Salae.

- *1439. *C. FLUVIATILIS*, ramosa viridis filamentis nodulosis, articulis angulatis, geniculis dilatatis. *Dillw. t. 29. Vauch. t. 10. f. 11.*

Ad ligna vetusta in fluviis.

6. *Batrachospermae Vauch.*

- *1440. *C. MUTABILIS*, filamentis viridibus ramosis geniculatis, ramis verticillatis, articulis brevibus medio punctatis. *Dill. t. 12. Roth. catal. t. 4. f. 6. t. 5. f. 1. Dill. t. 6. f. 34. t. 7. f. 44. Vauch. t. 11. f. 2.*

In rivulis paludosis ad Seeben et pone dem Fanenhaufe.

- *1441. *C. GELATINOSA*, trunco gelatinoso viridi ramosissimo, ramulis fasciculatis dichotomis articulatis, articulis ellipticis, geniculis setis contractis. *Chara gelatinosa Weis crypt. gallic. Dillw. t. 32. Vauch. t. 11. f. 1. Dill. t. 7. f. 42. Engl. bot. 689.*

In rivulis prope Schmon. *Fischer.*

7. *Hydrodictya* Roth. *Vauch.*

C. RETICULATA, filamentis reticulato-anastomosantibus. *Dill.* t. 4. f. 14. *Vauch.* t. 9. fossis et rivulis paludosis.

8. *Bacillariae* Draparnaud.

C. BRONCHIALIS, filamentis simplicibus attenuatis articulatis ochraceo-viridibus pellucidis, reticulis tandem refractis. *Roth.* *C. floeculosa*. *Roth. catal.* t. 5. f. 6. *Dillw.* t. 28. fossis et rivulis non rarq.

446. ULVA.

* *Tubulosae.*

U. INTESTINALIS, tubulis simplicibus continuis inflatis aufractuosis. *Dill.* t. 9. f. 7.

Sala copiose.

U. COMPRESSA, tubulis simplicibus ramosisque compressis geniculatis, geniculis remotissimis anubus siccitate contractis. *Dill.* t. 9. f. 8. A. B.

lacu falso et ad ripas der Salzke.

** *Membranacea.*

6. *U. LUBRICA*, frondibus confertis caespitosis oblongis lubricis undulato-rugosis. *Roth.* *U. Lactuca* B. *Huds.*

fossis ad Passendorf, *Fischer Moscov.*

447. RIVULARIA.

7. *R. ENDIVIAEFOLIA*, fronde suborbiculata planiuscula lacunosa palmato-multifida, ramulis teretibus truncatis crinitis, filamentis geniculatis brevibus crystallinis. *Roth.*

l culmos graminum in aquis segnibus putrescentiam. *Fischer Moscov.*

- * 1448. *R. dura*, globosa solida dura, filamentis subdichotomis, articulis ovalibus. *R. n. Beytr.* t. p. 273.

Ad caules Myriophylli spicati et Potamogetoni.

- * 1449. *R. verrucosa*, subrotunda solida atre-viridula verrucosa, filamentis simplicibus intricato-regularibus. *Tremella globulosa Hedw. Zool. t. 36. Tr. verrucosa Leyss. Fl. Geo. f. 2.*

In siccis cum Conserua reticulata.

448. LINKIA.

- * 1450. *L. Nostoc*, subrotunda difformis plicatodulata virefcens, demum membracea et gax. *Rotb. n. Beytr.* t. 304. *Tremella flos Leyss. Dill. t. 10. f. 14. Michx. 67. f. 1. Fl. dan. 885. f. 1.*

In horto botanico et campis post pluviam coe.

449. TREMELLA.

- * 1451. *Tr. uticulata*, vesiculosa fusco-albidiflexuoso-fulcata.

In fructibus et ramis putrescentibus.

- * 1452. *Tr. abietina*, gregaria subrotunda aurata subplicata.

Ad ligna abietina.

- * 1453. *Tr. lacrymalis*, rotunda nitida lutea, *Pict. fung. t. 10. f. 3.*

In lignis putridis.

- * 1454. *Tr. cinnabarina*, minima subcarnosa subgranulosa miniata.

In muscis ad terram.

- * 1455. *Tr. spiculosa*, crassiuscula nigra papillis nigris aspera. *Dill. t. 10. f. 15. Tr. Nyl. Leyss. Fl. dan. 884.*

In arborum truncis frequens.

1456. TR. VIOLACEA, parva compacta plicata violacea margine pallidiori.

In cortice pinuum.

1457. TR. LITHOPHILA, subrotundo-oblonga convexa viridis, disco fuscescente. *Willd. in bot. Mag.* 4. t. 4. f. 16. (? *Tr. hemisphaerica* *Leyfs.*)

Ad lapides lacus salii.

1458. TR. ANNULATA, oblonga fusco-viridia, demum annulata fusca. *Willd. in bot. Mag.* 4. t. 4. f. 15.

In lacu salso.

1459. TR. AURICULA, caespitosa tenuis nigrescens, subtus cinerea tomentosa. *Peziza Auricala* *Leyfs. Bolt* t. 107.

Ad truncos Sambuci nigrae.

1460. TR. FIMBRIATA, umbrino-fuliginea suberecta inciso-undulata.

In ramis et truncis putrescentibus.

1461. TR. UNDULATA, adscendens nigrescenti-purpurea sinuato-undulata.

Ad terram udam.

1462. TR. FRAGIFORMIS, subglobosa incarnata plicato-gyrota gregaria. *Pers. ic. pict. fungi* t. 10. f. 3.

In cortice pinuum.

1463. TR. CANDIDA, rotundata mollis alba.

In cortice Mespidi Oxyacanthae.

1464. TR. RUFA, gregaria dimidiato-infundibuliformis glabra rufa. *Jacq. misc.* 1. t. 14.

In ligno putrido, *Schulzmorlin.*

IX. GASTROMYCI.

450. SPHAERIA.

1. *Caulescentés.*

- *1465. SPH. OPHIOGLOSSOIDES, clavula turgida papillofa nigrescente, stipite basi intusque sordide flavo. *Clavaria ophioglossoides* Bolt. t. III. f. 2.

In udis umbrosis hinter dem Fasanenhaufe.

- *1466. SPH. BULBOSA, clavula subrotunda glaberrima tuberculo nigro-cinerea, radice tuberofa, stipite rimoso. *Pers. obs. mycol.* 2. t. I. f. I.

- *1467. SPH. HYPOXYLON, gregaria ramosa compressa basi atra hirta, clavula demum albida sphaerula destituta. *Holmskiöld coryph.* p. 81. *Clavaria Hypoxylon* Lays. *Sph. digitata* Bolt. t. 129.

Ad truncos arborum copiose.

- *1468. SPH. POLYMORPHA, gregaria polymorpha, clavula ventricosa fusco-atra. *Fl. dan.* 90. *Pers. obs. mycol.* 2. t. 2. f. 2. *Sph. Carchariae* Weigel *obs.* t. 3. f. 6. ? *Sph. aspera* *Fl. dan.* 1250. f. 4. *Clavaria digitata* *Holmskiöld* p. 75.

Ad truncos quercuum annosarum.

2. *Receptaculum acaule subrotundum sphaerulis asperum.*

- *1469. SPH. MORIFORMIS, gregaria simplex obovata tuberculosa atra intus cava. *Pers. ic. pict. fung.* t. II. f. 1. *Tode fung. mekl.* t. II. f. 30.

Ad truncos pinuum.

- *1470. SPH. RUBIFORMIS, gregaria subeffusa subrotunda tuberculosa solida atra. *Pers. bot. ann.* II. t. 2. f. 1.

Ad truncos aridos.

71. SPH. FRAGIFORMIS, gregaria subconfluens papilloso extus fusco-rufa intus atra. *Perf. bot. ann. 11. t. 2. f. 5. syn. t. 1. f. 1. 2.*

Ad truncos quercuum annosarum.

72. SPH. FUSCA, gregaria subconfluens fusco-rufa papilloso, intus solida concolor. *Perf. bot. ann. 11. t. 2. f. 3.*

Ad ramos liccos corylorum et alnorum.

73. SPH. RIBESIA, erumpens mollis elliptica granulosa, sphaerulis albicanibus. *Rebentisch neom. t. 1. f. 5.*

in cortice Ribis rubri.

74. SPH. DECOLORANS, caespitosa cinnabarina expallescent, sphaerulis globosis tuberculato-rugosis.

Ad ramos liccos acerum.

75. SPH. SPERMIOIDES, congesta opaca rigida atra sphaerulis globosis papillatis. *Batsch. el. fung. t. 30. f. 180.*

Ad truncos aridos.

3. Effusae, ostiolis prominulis.

76. SPH. DRUSTA, lata effusa crassa irregularis rugoso-undulata pustulata, primum cinereo-pulverulenta, demum atra rigida. *Tode fung. mekl. t. 17. f. 129.*

Ad terram in sylvis. (*Ostiola unco terminata.*)

77. SPH. ROSEA, effusa rosea, sphaerulis coccineis, margine byssaceo albicante.

In terra uda hinter dem Fasanenhauste semel.

78. SPH. OCHRACEA, effusa ochracea tuberculosa, margine subtomentoso.

Ad terram et ramos humi putrescentes.

1479. SPH. ATROPURPUREA, aggregata subeffusa,

Roth. catal. 2. p. 202. Conjugue à portiques Vauch. t. 5. f. 1. renflée f. 3. allongée t. 6. f. 1.

In aquis legnibus passim.

5. *Polysermae Vauch.*

1437. *C. GLOMERATA*, filamentis viridibus ramissimis rectis geniculatis, ramis fasciculatis, articulis cylindricis granulosis. *Dillw. t. 13. Fl. dan. 651. f. 2. Vauch. t. 10. f. 4. 5. C. cristata Roth. Dill. t. 5. f. 31.*

Ad cataractas Salae. (*Subest C. sericea Leyss. Cf. Wulffen crypt. aquat. p. 21.*)

- * 1438. *C. TORULOSA*, filamentis fusco, viridibus torulosis, articulis ovalibus inflatis, geniculis contractis. *Roth. Dill. t. 7. f. 48.*

Ad cataractas Salae.

1439. *C. FLUVIATILIS*, ramosa viridis filamentis subnodulosis, articulis angulatis, geniculis dilatatis. *Dillw. t. 29. Vauch. t. 10. f. 1-3.*

Ad ligna vetusta in fluviis.

6. *Batrachospermae Vauch.*

- * 1440. *C. MUTABILIS*, filamentis viridibus ramosis geniculatis, ramis verticillatis, articulis brevibus medio punctatis. *Dill. t. 12. Roth. catal. 1. t. 4. f. 6. t. 5. f. 1. Dill. t. 6. f. 34. t. 7. f. 44. Vauch. t. 11. f. 2.*

In rivulis paludosis ad Seeben et pone dem Fasanenhaufe.

1441. *C. GELATINOSA*, trunco gelatinoso viridi ramosissimo, ramulis fasciculatis dichotomis articulatis, articulis ellipticis, geniculis fetis contractis. *Chara gelatinosa Weis crypt. gött. ic. Dillw. t. 32. Vauch. t. 11. f. 1. 3. Dill. t. 7. f. 42. Engl. bot. 689.*

In rivulis prope Schmon. *Fischer.*

7. *Hydrodictya* Roth. Vauch.

1442. *C. RETICULATA*, filamentis reticulato-anastomosantibus. *Dill. t. 4. f. 14. Vauch. t. 9.*

In fossis et rivulis paludosis.

8. *Bacillaria* Draparnaud.

- * 1443. *C. BRONCHIALIS*, filamentis simplicibus attenuatis articulatis ochraceo-viridibus pellucidis, articulis tandem refractis. *Roth. C. fasciculosa. Roth. catal. t. 5. f. 6. Dillw. t. 28.*

In fossis et rivulis non rarq.

446. ULVA.

* *Tubulosa*.

1444. *U. INTESTINALIS*, tubulis simplicibus continuis inflatis aufractuosis. *Dill. t. 9. f. 7.*

In Sala copiose.

1445. *U. COMPRESSA*, tubulis simplicibus ramosisque compressis geniculatis, geniculis remotissimis tenuibus siccitate contractis. *Dill. t. 9. f. 8. A. B.*

In lacu salso et ad ripas der Salzke.

** *Membranacea*.

- † 1446. *U. LUBRICA*, frondibus confertis caespitosis oblongis lubricis undulato-rugosis. *Roth. U. Lactuca B. Huds.*

In fossis ad Passendorf, *Fischer Moscov.*

447. RIVULARIA.

- † 1447. *R. ENDIVIAEFOLIA*, fronde suborbiculata planiuscula lacunosa palmato-multifida, ramulis teretibus truncatis crinitis, filamentis geniculatis brevibus crystallinis. *Roth.*

Ad culmos graminum in aquis seignibus putrescentium. *Fischer Moscov.*

Ad truncos Pruni domesticæ et Cerasi.

- *1497. SPH. MICROSTOMA, subrotunda planiuscula
nereo-brunea, ostiolis minutissimis granulatis
mibus.

Cum priore.

- *1498. SPH. TUMIDA, turgida planiuscula atra,
tus olivacea, ostiolo nullo.

Ad ramos quercuum aridos.

- *1499. SPH. HERBARUM, sparsa subdepressa
ostiolis papillatis. *Tode t. II. f. 88.*

Ad caules herbarum.

- *1500. SPH. OPERCULATA, sparsa-immerisa livida
ostiolis prominulis angulatis.

Ad ramos aridos populorum.

- *1501. SPH. SANGUINEA, sparsa ovata sanguinea
ce perforata.

Ad ramos corylorum.

5. *Subsolitariae basi tomentosae aut hirsutae.*

- *1502. SPH. PEZIZA, gregaria sordide rubella mollis
globosa, collabescens cava basi pilosa. *Tode
t. 15. f. 122. Hofm. germ. t. 12. f. 1.*

In truncis aridis.

- *1503. SPH. BYSSISEDA, gregaria globosa fusca, basi
dense tomentosa. *Tode t. 9. f. 70.*

In truncis aridis.

- *1504. SPH. OVINA, sparsa albida globosa, ostiolo
nigricante, basi albo-tomentosa.

Ad truncos putridos.

- *1505. SPH. PILOSA, simplex ovata undique pilosa
fusco-atra, ostiolo simplici. *Perf. ic. et des.
scr. fung. t. 10. f. 9. 10.*

Ad truncos aridos. (*Huc forte Sph. hispida Tode
t. 10. f. 84.*)

6. *SPH. RACIDIUM*, conferta rugulosa hirta tomento denso infidens. ? *Sph. obducta* Bolt. t. 125.

truncos pinuum.

6. *Ostiola spinulosa aut elongata*.

7. *SPH. SPINOSA*, effusa atra rugulosa, ostiolis pinosis quadrangulis. *Pers. syn. t. 2. f. 9.*

truncos aridos.

SPH. CILIATA, solitaria subrotunda pallida cum epidermide prorumpens, ostiolis longissimis divaricatis flavidis. *Pers. obs. myc. 2. t. 5. f. 3.*

foliis ulmorum.

9. *SPH. RADULA*, solitaria pustulata brunea cum epidermide prorumpens, ostiolis angulato-asperis.

truncos arborum.

9. *SPH. ROSTRATA*, solitaria globulosa atra extus rugulosa, ostiolo longissimo spinuloso subsalato. *Tode t. 10. f. 79.*

truncos arborum.

1. *SPH. TUBAEFORMIS*, solitaria ovata fulva cum epidermide prorumpens, demum collapsa scutellata, ostiolo teretirecto. *Tode t. 16. f. 125.* foliis betulae et coryli deciduis. (*Huc et Sph. eum Tode. Pers.*)

1. *SPH. RUBELLA*, subaggregata ovata nigra erusta violacea erumpens, ostiolo conico elongato. *Pers. Tode t. 9. f. 72.*

caule putrescenti Solani tuberosi.

3. *SPH. TENTACULATA*, composita verrucosa atra prorumpens, ostiolis aggregatis teretibus subdivaricatis. *Batsch. el. fung. t. 30. f. 183.*

ramos arborum aridos.

- * 1514. *SPH. BOMBARDA*, subaggregata oblonga fulcens mollis; ostiolo elongato papillaeformi.
Batsch. l.c. f. 181. Bolt. t. 122. f. 1.

451. * STILBOSPORA.

- * 1515. *ST. MICROSPERMA*, sporulis minutissimis sphaerulatis rotundis.

Erumpens e ramis ficcis. *Schwie.*

452. NEMASPORA.

- * 1516. *N. POPULINA*, pustulata erumpens nigrescens cirrhis flavis. *Pers. obs. myc. 1. t. 5. f. 10.*
(*N. chrysosperma.*)

In cortice Populi nigrae, Alni et Betulae.

- * 1517. *N. INQUINANS*, sparsa erumpens papilliformis, cirrhis fulco-nigris. *Sphaeria Pers. To de t. 16. f. 85.*

In ramis pyrorum, malorum, acerum.

453. XYLOMA.

- * 1518. *X. SALICINUM*, crassum tuberculosum nigrum intus basi cartilagineum album.

In foliis Salicis capreae.

- * 1519. *X. ACERINUM*, maculaeforme tenue rugulosum nigrum.

In foliis acerum deciduis.

- * 1520. *X. ARUNDINIS*, solitarium impressum ovale granulatum fulco-ferrugineum. *Rebent. Hysterium arundinaceum Schrad. journ. 1792. t. 3. f. 3.*

In foliis Arundinis Phragmitis.

- * 1521. *X. PUNCTATUM*, simplex maculaeforme rugulosum.

In foliis acerum.

- * 1522. *X. PEZIZOIDES*, confertum orbiculare nigrum.

dernum apertum, margine erecto subcrenato, disco pallido.

In foliis quercuum.

- *1523. *X. HYSTERIOIDES*, solitarium ellipticum nitidum atrum. *Pers. ic. et descr. t. 10. f. 3. 4.*

In foliis Mespili Oxyacanthae.

- *1524. *X. POPULINUM*, gregarium forma varium applanatum laeve nigrum.

In foliis Populi tremulae.

- *1525. *X. SALIGNUM*, gregarium subconfertum orbiculare tenue, disco subconvexum.

In foliis Salicis capreae, quorum totam fere faciem occupat.

454. HYSTERIUM.

- *1526. *H. PULICARE*, gregarium ellipticum striatum nigrum. *Pers. ic. pict. t. 9. f. 2. Lichen scriptus* *β. pulicaris auct.*

In cortice quercuum et ulmorum.

- *1527. *H. CRISPUM*, elongatum erumpens opacum nigrescens subventricosum, labiis tenuibus crispis. *Pers. ic. pict. t. 9. f. 1.*

Satis frequens ad ramos pinuum et corylorum.

- *1528. *H. CONIGENUM*, striaeforme rugulosum ovatum nigrum.

In squamis strobilorum pini.

- *1529. *H. PINASTRI*, erumpens ovale nigrum nitidum. *Schr. ad. Journ. 1799. 2. t. 3. f. 4.*

In foliis pinum.

455. SCLEROTIUM.

- *1530. *SCL. BRASSICAE*, oblongum depressum, primo albidum dein nigrum, intus nigro punctatum. *Bolt. fung. t. 119. f. 2.*

In foliis brassicae putrescentibus.

346 CLASSIS XX. ATELIA.

- *1531. *SCL. POPULNEUM*, congestum subimmersum rufum, deinde nigrescens maculaeforme.

In foliis populorum vulgarissimum.

456. SPHAROBOLUS.

- *1532. *SPH. STELLATUS*. *Carpobolus albicans Michel. t. 101. Lycoperdon Carpopolus Fl. dan. 895.*

In ramis sambucorum semiputridis. Subiculum ovatum, cavum ferrugineo-luteum pubescens, peridium clausum, dein apice rupens margine 7-dentato aurantiaco, explodens vesiculam candidam cum seminibus nigris.

457. PILOBOLUS.

- *1533. *P. CRYSTALLINUS*, receptaculo obovato, vesicula hemisphaerica lurida. *Perf. obs. t. 4. f. 10. Fl. dan. 1080. Mucor urticariae Bolt. t. 133. f. 1.*

In fimo equino.

458. TULOSTOMA.

1534. *T. BRUMALE*, sordide ochraceum, stipite cylindrico, peridio globoso papillato. *Perf. Batsch. el. fung. t. 29. f. 167. Lycoperdon pedunculatum Leyfs.*

In rupibus ad Kröllwitz rarius.

459. BOVISTA.

1535. *B. NIGRESCENS*, maior nigrescente - umbrina subtus plicata. *Lycoperdon Bovista Leyfs. Lycoperdon arrhizon. Batsch. t. 29. f. 116. L. globosum Bolt. t. 118.*

In nemoribus umbrosis.

1536. *B. PLUMBEA*, minor globosa plumbea. *Gleditsch. fung. t. 5. Lycoperdon Bovista Leyfs. β. γ. δ.*

In pratis frequens.

460. LYCOPERDON.

537. *L. BOVISTA*, magnum obconicum molle sordide albidum subtus plicatum squamis latiusculis. *Fl. dan.* 1139. *Bolt.* t. 117.

In collibus herbidis.

538. *L. PRATENSE*, brevissime stipitatum candidum molle, peridio hemisphaerico laeviusculo verruculoso.

Cum priori.

539. *L. HYEMALE*, stipite longo subtereti, peridio subglobofo laeviusculo furfuraceo albedo.

In nemoribus, e. g. ad Seeben.

540. *L. UMBRINUM*, clavatum verrucosum cinereo-umbrinum. *Bolt.* t. 117. f. f.

In nemoribus, pinetis gregarie.

541. *L. PYRIFORME*, pyriforme squamulosum sordide fuliginium, radiculis fibrosis longis. *Schüff.* t. 185.

In sylvis umbrosis.

461. GEASTRUM.

541. *G. QUADRIFIDUM*, peridio subglobofo pedicellato, ore pectinato, radiis subquadrifidis fornicatis. *Schmidel* t. 37. *Batsch* t. 29. f. 168. *Lycoperdon basi quadrifida* *Buxb.* 203. c. 10. *L. stellatum* β . *Leyfs.*

Im Galgthörschen Schiefsgraben invenit *Hübner*, cel. entomologus. Dum haec scribo, adfert *Funcckius hortulanus ex horto suo.*

543. *G. CORONATUM*, peridio globofo pedicellato, disco planiusculo, ore conico, radiis multifidis umbrinis externe granulosis subexpansis. *Schmidel* t. 46. *Michel* t. 100. f. 1. *Fl. dan.* 360. *L. stellatum* α . *Leyfs.*

In pinetis rarius. *Hübner*,

462. LYCOGALA.

- *1544. L. MINIATUM, gregarium globosum, primum
 miniatum, dein fuscescens, pulvere roseo. *Michel. t. 95. f. 2. Lycoperdon Epidendrum*
Leyf. Fl. dan. 720. Bolt. t. 119. f. 1.

In truncis arborum.

- *1545. L. ATRUM, pulvinato-effusum, fusco-atrum,
 pulvere filis ramosis arbusculiformibus radiatis
 intertexto. *Albertini et Schweinitz*
t. 3. f. 3.

In truncis pinuum demortuis.

463. FULIGO.

- *1546. F. RUFa, pulvinata fulva, pulvere nigro, cor-
 tice subrugoso fragili subcompacto. *Perf. syn.*
t. 4. f. 1. Fl. dan. 778. Mucor septicus Leyf.
Bolt. t. 134. f. 1.

In lignis putrescentibus.

- *1547. F. VIOLACEA, dilatata fusco-violacea, cor-
 tice tenui laeviusculo sordido deciduo, pulvere
 compacto atro. *Perf. ic. pict. t. 1.*

In truncis annosarum pinuum frequens.

- *1548. F. FLAVA, effusa flava aut sulfurea, cortice
 celluloso-reticulato.

Ad truncos putrescentes frequens. (F. vaporaria
 ad superficiem corticis quercini, quo coriarii
 utuntur, huc etiam pertinet.)

464. PHYSARUM.

- *1549. PH. CINEREUM, sessile ovato-globosum cin-
 ereum intus filis albis reticulatum. *Batsch*
t. 29. f. 169.

Ad truncos.

- *1550. PH. FARINACEUM, stipitatum, peridii cortice
 tenuissimo farinoso-villoso cinereo.

Ad truncos inv. *Schw. ic.*

465. TRICHIA.

- *1551. TR. RUBIFORMIS, stipitata fasciculata chalybea nitida, capillitio pulvereque puniceis, stipitiibus connatis, peridio turbinato. *Lycoperdon vesparium* Batsch t. 30. f. 172.

In truncis subputrescentibus.

- *1552. TR. FALLAX, simplex stipitata, primo rubra dein argillacea, peridio subgloboso. *Clathrus Schmidel* t. 33. f. 1. *Clathrus fulvus* Bolt. fung. t. 93. f. 3.

Ibidem.

- *1553. TR. NIGRIPES, sparsa, peridio pyriformi flavo vel sordide albido, stipite exiguo nigrescente. *Perf. ic. et descr. fung.* t. 14. f. 3.

In muscis.

- *1554. TR. NITENS, sessilis congesta rotunda flava. *Lycoperdon favogineum* Batsch. t. 30. f. 173.
Ad truncos, in nemusculo Seebenfi copiose.

466. ARCYRIA.

- *1555. A. CINEREA, gregaria albido-cinerea. *Fl. dan.* 655. f. 1.

In sylvis ad truncos.

- *1556. A. PUNICEA, gregaria croceo-punicea, capillitio subcinereo. *Clathrus denudatus* Bolt. fung. t. 93. f. 2.

Ibidem.

467. STEMONITIS.

- *1557. ST. TYPHINA, sparsa, capillitio cylindrico obtuso subincurvo. *Embolus pertusus*. Batsch t. 30. f. 176.

Ad truncos.

468. CRIBRARIA.

- *1558. C. VULGARIS, gregaria, peridio globoso subcernuo flavo, stipite longo purpurascente.

Ad truncos.

469. DIDERMA.

- * 1559. D. VERNICOSUM, stipitatum congestum ovatum flavido-nitens, stipite brevi filisque albidis, pulvere atro. *Dickf. t. 3. f. 5.*

In muscis, Erica vulgari et Vaccinio Myrtillo parasiticum copiosissime im Zörgs.

- * 1560. D. DIFFORME, sessile laeve difforme candidum, cortice interiori coerulescente, pulvere fulco. *Perf. ic. pict. t. 12. f. 3—5.*

In caulibus Solani tuberosi.

470. SPUMARIA.

- * 1561. SP. MUCILAGO, alba intus caesia, peridiis interne ramoso-cornutis, pulvere nigro. *Michx. t. 96. f. 2.*

Folia et muscos investit.

471. MUCOR.

1562. M. MUCEDO, stipite simplici, peridio inflato griseo-nigrescente, ore rotundo circa stipitem densilcente. *Tode t. 3. f. 21. Fl. dan. 491. f. 4. Bolt. t. 132. f. 1.*

In fructibus putridis.

- * 1563. M. HERBARIORUM, sessilis flavescens, peridiis globosis tomento insidentibus.

In plantis non probe exsiccatis.

472. TUBULINA.

- * 1564. T. FRAGIFORMIS, suborbicularis rubro-spadiacea, tubulis incrassatis apice distinctis. *Batsch t. 30. f. 175. Tubulifera Ceratum Fl. dan. 659. f. 2.*

Ad truncos post pluvias.

473. CHAENOCARPUS.

1565. CH. SETOSUS, filamentis capillaribus atris sub-

ramosis, peridio laterali et terminali fusco.
Rebent. t. 3. f. 12. Lichen setosus Leyss.
Rhizomorpha setiformis Persf.

In foliis acerosis delectis copiosissime. (*Peridia pri-
 mus vidit Humboldtius δ πάλιν. frib. p. 33.*)

473. RÖSTELIA.

- * 1566. R. CANCELLATA, stromate tuberculato spadiceo. *Rebent. t. 2. f. 9. Lycoperdon cancellatum fl. dan. 704. Aecidium Persf.*

In foliorum Pyri communis averfa parte vulgaris.

474. AECIDIUM.

* *Peridium stromati insidens.*

- * 1567. AEC. CORNUTUM, flavescens, peridiis longissimis curvatis olivaceo - griseis. *Persf. obs. myc. 2. t. 4. f. 2. 3. Lycoperdon fl. dan. 838.*

In foliis Pyri aucupariae vulgare.

- * 1568. AEC. RUMICIS, confertum maculaeforme sanguineum, peridiis pulvereque pallidis. *Hofm. germ. 2. t. 11. f. 2.*

In foliis Rumicum et Ribis Grossulariae.

- * 1569. AEC. CRASSUM, crassum effusum aurantium, peridiis congestis. *Persf. ic. et descr. fung. t. 10. f. 1. 2.*

In ramulis Rhamni cathartici et Frangulae, Ranunculorum, Calthae et Aquilegiae.

- * 1570. AEC. BERBERIDIS, caespitosum orbiculare, peridiis subelongatis flavis. *Jacqu. collect. 1. t. 4. f. 1. Rebent. t. 3. f. 11.*

In foliis Berberidis vulgaris.

** *Peridium solitarium stromate destitutum.*

- * 1571. AEC. EUPHORBIAE, simplex confertum, peridiis cylindricis pallidis, ore reflexo, pulvere aurantiaco. *Schk. t. 129. s. 1.*

In averſa parte foliorum Euph. Cypariſſiae vulg. tiſſimum.

*1572. AEC. TRAGOPOGONIS, ſparſum, peridiis ſubellipticis albis, margine lacero, pulvere flavo.

In caule et foliis Tragopogonis pratensis.

*1573. AEC. FALCARIAE, ſimplex ſubconfertum flavum, peridii dentibus latiusculis ſuberectis.

In foliis Sii Falcariae.

*1574. AEC. COLUMNARIE, ſimplex tenue cylindrico-elongatum flavum, apice lacero albedo, pulvere aurantiaco. *Albert. et Schwein. t. 5. f. 44*

In foliis iunioribus Pinus piceae horti botanici.

476. PUCCINIA.

*1575. P. ANEMONES, ſpadicea, ſparſa, in quinquecem diſpoſita, inquinans. *Perſ. obſ. myc. 2. t. 6. f. 5.*

In foliis iunioribus Anemones nemorofae.

*1576. P. POLYGONI, ſpadicea, ſporulis caudatis.

In foliis Polygoni amphibii et Convolvuli arvenſis.

*1577. P. GRAMINIS, ſtriata linearis flavo-fufceſcens, ſporulis ſubturbinatis. *Banks account c. ic. (Uredo linearis iunior ſere haec eſt.)*

In culmo Secalis et Triticici vulgatiffima.

*1578. P. JUNIPERI, magna caeſpitofa ſubgelatinofa conica fulva, ſporulis obovatis longiſſime caudatis. *Michel. t. 92. Schmidel t. 66. Tremella juniperina Leyfs. Tremella clavariiformis Wulf., Perſ.*

In truncis juniperorum.

*1579. P. POTENTILLAE, puſtulata nigra, ſporulis cylindricis obtuſis.

In foliis aridis Pot. argenteae.

*1580. P. MUCRONATA, conferta nigra, ſporulis ſtipitatis cylindricis mucronatis.

In foliis Rosarum et Ruborum.

477. UREDO.

1. *Rubigo.*

- * 1581. U. HELIOSCOPIAE, sparsa subglobosa flava.

In foliis Euph. helioscopiae.

- * 1582. U. ROSAE, orbicularis flavescens, demum nigrescens.

In foliis Rosae centifoliae.

- * 1583. U. FARINOSA, confluens farinosa ochracea.

In foliis Salicis capreae.

- * 1584. U. GYROSA, sparsa flava, margine duplici undulato erecto. *Rebent. t. 3. f. 13.* U. *Rubi idaei* Persf.

In foliis Rubi idaei.

2. *Albugo.*

- * 1585. U. CANDIDA, effusa candida.

In caule Thlaspeos Bursae et Alyssi calycini.

3. *Ustilago.*

- * 1586. U. SEGETUM, fusco-nigricans intus filamentosa.

In spicis Tritici, Hordei et Avenae. Cf. Kirby in Linn. transact. 5. p. 112. f. Tessier des moulad. des grains, p. 306. f. 2 — 4.

- * 1587. U. CARICIS, fusco-nigricans nuda.

In fructibus caricum variarum.

478. CYATHUS.

- * 1588. C. STRIATUS, hirsutus spadiceus interne striatus. Michel. t. 102. f. 2. *Peziza lentifera* B. Leyss. Bolt. fung. t. 102. f. 2.

Inter folia putrida, locis umbrosis humidis.

- * 1589. C. OLLA, externe cinereo-flavescens submentosus, interne laevis plumbeo-lividus.

Michel. t. 102. f. 1. Fl. dan. (469. f. 1. 2.)
 780. f. 1. *Peziza lentifera* α. *Leyss. Bolt.*
t. 102. f. 1.

Ad asseres et ligna arida.

- * 1590. *C. CRUCIBULUM*, subcylindricus induratus
 subtomentosus ochraceo-albidus. *Michel.*
t. 102. f. 3. Fl. dan. 105.

Ad asseres vetustos horti botanici.

X. FUNGI.

479. PHALLUS.

- * 1591. *PH. IMPUDICUS*, stipite cribroso subobliquo
 pileo celluloso pervio. *Fl. dan. 175. Trst-*
cinick fung. austr. t. 9. f. 18. Curt. m.
Bolt. t. 92.

In sylvis frondosis rarior.

480. TUBERCULARIA.

1592. *T. VULGARIS*, gregaria amoene rubra sulcata-
 rugosa, stipite brevissimo pallido. *Sphaeria*
tremelloides Weigel obs. t. 3. f. 1. Tremel-
la purpurea Leyss. Sph. miniata Bolt.
t. 127. f. 1.

In ramis emortuis plerisque.

1593. *T. ROSA*, sparsa sessilis subdifformis glebulosa
 rosea. *Lecidea rosella Achar.*

In ramis quercuum cum *Parmelia stellari* et aliis.

481. AMANITA.

- * 1594. *A. LIVIDA*, pileo planiusculo umbonato striato,
 plumbeo-livido, lamellis stipiteque longe
 albidis. *Fl. dan. 1014. Schöff. t. 85. 86.*

In sylvis frequens.

- * 1595. *A. MUSCARIA*, pileo aurantiaco-rubro planiusculo
 nitido subverrucoso, verrucis lamellis s.

piteque candidis. *Agaricus Leyfs. Fl. dan.*
 1129. *Bolt. t. 27. 46. Cf. icunculam in*
Bolt. introd.

In sylvis vulgarissima.

482. AGARICUS.

1. *Lamellis arescentibus, stipite annulato.*
Lepiota Pers.

* 1596. *A. PROCRUS*, magnus, pileo oblongo squa-
 moso umbonato cinereo-fusco, lamellis remo-
 tissimis albidis, stipite bulboso longissimo, an-
 nulo mobili. *Fl. dan. 772. Curt. n. 39.*
Bolt. t. 23.

In campis sylvaticis.

* 1597. *A. SQUARROSUS*, caespitosus, pileo carnosio
 stipiteque squamoso ochraceis, lamellis confer-
 tis. *Fl. dan. 1191.*

Ad caudices quercuum frequens.

* 1598. *A. POLYMYCES*, caespitosus congestus, pileo
 umbonato piloso-squamoso ochraceo-fuligi-
 neo subfarinaceo, lamellis subdecurrentibus
 exalbidis, stipite annulato conico olivaceo-ci-
 nereo. *Fl. dan. 1013. Bolt. t. 140. 141.*

Ad radices arborum.

* 1599. *A. CAUDICINUS*, caespitosus, pileo subcarno-
 so umbonato glabro cinnamomeo, lamellis sub-
 decurrentibus pallide ferrugineis, stipite squa-
 moso cylindrico. *Trattinick fung. austr.*
e. 7. f. 14. Fl. dan. 1008. f. 2.

In sylvis rarior.

2. *Lamellis demum cinnamomeis, stipite*
cortinato f. velo in fila araneosa so-
luto. Cortinaria Pers.

* 1600. *A. VIOLACEO-CINEREUS*, pileo carnosio hemi-
 sphaerico punctato-squamuloso violaceo-cine-
 reo, lamellis subumbrinis, stipite bulboso, cor-
 tina ferruginea. *A. violaceus Leyfs.*

In nemoribus quercuum paullo rarior.

1601. *A. SANGUINEUS*, pileo sanguineo carnoso convexo, stipite longo, cortina aurantiaca. *Wulff. in Jacqu. misc. 2. t. 15. f. 3.*

In sylvis, pinetis haud rarus.

1602. *A. VACCINUS*, gregarius, pileo carnoso hemisphaerico piloso-squamoso fusco-rufo, lamellis pallidis rubro-maculatis, stipite cavo fibrilloso. *Pers. ic. et descr. t. 2. f. 1-4.*

In pinetis frequens.

1603. *A. CROCEUS*, gregarius, pileo subcarnoso imbricato subtomentoso fulvo-cinnamomeo, lamellis flavo-croceis, stipite subtenui fibrilloso, cortina fugaci. *Batsch t. 23. f. 117. Fl. dan. 1015. f. 2. ? A. castaneus Bolt. t. 10. A. cinnamomeus Leyfs.*

In pinetis.

3. *Lamellis unicoloribus arescentibus, stipite nudo.* *Gymnopus Pers.*

1604. *A. PRATENSIS*, fulvo-rufescens subdurus, pileo glabro, lamellis crassis decurrentibus, stipite brevi. *Fl. dan. 715.*

In collibus herbidis vulgaris.

1605. *A. FLAVO-VIRENS*, pileo carnoso flexuoso flavescente, squamis minutis subobsoletis nigricantibus, lamellis citrinis.

In pinetis.

1606. *A. FASTIDIOSUS*, caespitosus, pileo carnoso glabro subviscido lateritio-spadiceo flexuoso, lamellis aquote cinnamomeis, stipite albido. *Batsch t. 33. f. 195.*

In pinetis.

1607. *A. ELATUS*, pileo plano sordide ochraceo, lamellis convexis bruneis, stipite longissimo albido. *Batsch t. 32. f. 188.*

In pinetis.

1608. *A. coccineus*, gregarius coccineus, pileo submembranaceo subviloso, lamellis distantibus dentatum convexis, stipite cavo subcompresso.

In pascuis, pratis.

1609. *A. roseus*, gregarius roseus, pileo submembranaceo nitido, lamellis stipiteque basi villoso dilutionibus.

In quercetis.

1610. *A. fumosus*, subgregarius rigidus fuliginosus, pileo convexo glabro, lamellis stipite dilutionibus. *Perf. ic. pict. t. 1. f. 3. (Nonne huc et A. nebularis Batsch t. 33. f. 193. ?)*

In sylvis.

1611. *A. discoideus*, subcaespitosus, pileo carnoso viscido planiusculo albido, disco flavescens, lamellis subdecurrentibus stipiteque albidis, *A. carnosus Curt. n. 53. ?*

Sentol legi ad Nietleben.

1612. *A. vitellum*, pileo carnoso viscoso planiusculo umbonato olivaceo-umbrino, lamellis decurrentibus stipiteque vitellinis. *Albert. et Schwein. t. 10. f. 4.*

Ad margines pinetorum.

1613. *A. tuberosus*, gregarius parvus albidus, pileo convexo papillato, stipite brevi rufescente tuberibus innato. *Batsch t. 18. f. 93. Bolt. t. 48.*

Aliis agaricis putrescentibus innascitur.

4. *Tenelli*, pileo striato subpellucido, lamellis unicoloribus, stipite elongato fistuloso. *Mycena Perf.*

1614. *A. alliaceus*, solitarius graveolens, pileo campanulato fuscescente, lamellis albidis, sti-

pite nigrescente - glauco basi strigoso. *Fl. dan.* 1251.

In umbrosis udis.

- *1615. *A. GALOPUS*, subfolitarius, pileo campanulato nigrescente - glauco, lamellis albidocinereis, stipite lactescente. *Fl. dan.* 1071. f. 3.

Muscis paludosis adnascitur, in palude Dölav.

- *1616. *A. HYPNORUM*, tenerrimus ochraceo - ferrugineus, pileo campanulato sulcato. *Batsch* t. 19. f. 96.

Vulgatissimus, muscis innascitur.

1617. *A. CLAVUS*, gregarius exilis, pileo papillato aurantiaco, lamellis stipiteque albidis. *Bolt.* t. 39. f. B.

Inter folia dejecta in sylvaticis umbrosis.

- *1618. *A. VULGARIS*, gregarius exilis, pileo papillato griseo - rufescente, lamellis stipiteque viscoso albidis. *Fl. dan.* 830. f. 2. ?

In pinetis vulgaris.

- *1619. *A. CORTICOLA*, sparsus fuscescens, pileo hemisphaerico subplicato, lamellis uncinato - annexis albidis, stipite breviusculo incurvo. (*Fl. dan.* 1015. f. 1. ?) *A. tortilis Bolt.* t. 41. f. B.

Ad cortices arborum annosarum inter muscos.

5. *Pileus membranaceus fugax*, lamella nigrescenti - liquescentes, stipes subalbidus. *Coprinus*.

1620. *A. COMATUS*, gregarius, pileo conico squamuloso sordide albedo, lamellis dein purpurascensibus. *Fl. dan.* 834. *Curt.* n. 16. *Bolt.* t. 44. *Schmidel* t. 70. *A. fimetarius Leyf. subest.*

In locis graminosis, ad sepes.

- *1621. *A. Plicatus*, caespitosus, pileo subcampanulato

mulato fuligineo apice squamuloso, lamellis purpurascenscentibus, demum nigris. *Chr. t. n. 11.*

In locis stercoreatis.

1622. *A. CINEREUS*, pileo subtomentoso cinereo, lamellis punctatis subflexuosis. *Fl. dan. 1195.*

Ad margines sylvarum.

623. *A. FERRUGINEUS*, caespitosus, pileo sulcato campanulato ferrugineo sursum squamuloso, lamellis caesio-nigrescentibus. *Fl. dan. 1070. Bolt. t. 54.*

In hortis et sylvis.

1624. *A. EQUAMOSUS*, subcaespitosus, pileo umbonato ochraceo, margine squamoso, lamellis fuscis, stipite longo squamoso annulato.

In hortis et campis stercoreatis.

6. *Pileus persistens; lamellae nebulosae aquosae, pulvere seminali demum obscuriores.* Pratella.

625. *A. CAMPESTRIS*, pileo planiusculo rufescente squamoso, annulo incompleto. *Trat. kinick fung. austr. t. 1. Fl. dan. 714. Bolt. t. 45.*

In cultis stercoreatis, simetis vulgaris.

626. *A. GRACILIS*, pileo membranaceo campanulato acuto mollissimo incarnato ochraceo, lamellis nigrescenti-cinereis, stipite longissimo glabro.

In sylvaticis ad folia.

7. *Pileus subdepressus; lamellae lactescentes.* Lactifluus.

627. *A. PIPERATUS*, pileo infundibuliformi, margine expanso glabro albido, lamellis congestis furcatis pallidis. *Batfch t. 13. f. 59. Fl. dan. 1132. Bolt. t. 21.*

In sylvis umbrosis.

- * 1628. *A. DELICIOSUS*, pileo umbilicato zonato aurantiaco variegato, lamellis succoque aurantico-lateritiis. *Fl. dan.* 1131. *Bolt.* t. 9.

In pinetis arenosis.

- * 1629. *A. NIGRATON*, pileo olivaceo umbrino, lamellis subcarneis, margine tomentoso involuto.

In pinetis nostris non rarus.

8. *Pileus carnosus subdepressus; lamellae arcuantes; stipes nudus subalbida*
Russula. (A. integer Leyfs.)

- * 1630. *A. ROSACEUS*, pileo planiusculo roseo, lamellis stipiteque candidis. *Fl. dan.* 1009. *Bolt.* t. 1.

In sylvis nostris frequens.

- * 1631. *A. OCHROLEUCUS*, pileo planiusculo flavo-terre, margine laevi, lamellis stipiteque albis. *Fl. dan.* 830. f. 1.

In sylvis abietinis.

9. *Pileus umbilicatus infundibuliformis; lamellae exsuccae subdecurrentes; stipes nudus. Omphalia.*

- * 1632. *A. OLIVUS*, gregarius flavo-ferrugineus nitens, margine reflexo, stipite crasso lubruberulo. *Fl. dan.* 1011.

In der Heide.

- * 1633. *A. SQUAMULOSUS*, pileo infundibuliformi squamuloso cinnamomeo fulcescente, lamellis aquose albidis, stipite conico.

Ibidem.

- * 1634. *A. TARDUS*, elasticus fusco-umbrinus, pileo infundibuliformi, margine inflexo laevi, stipite conico. *Dicks.* t. 3. f. 1. *A. Infundibuliformis Leyfs. (Fl. dan. 891. ?)*

In ripibus ad Giebichenstein.

635. *A. ROTULA*, caespitosus sordide cinereus, pileo profunde sulcato, lamellis tubo stipitem nigrescentem ambeunti adnexis. *Fl. dan.* 1134.
A. androsaceus *Leyss. Bolt. t.* 32.

In foliis delectis copiose.

1636. *A. EPIPHYLLUS*, gregarius minutus albidus, pileo primum convexo, demum umbilicato, lamellis raris ramosis, stipite nigrescente.
Batsch. t. 17. f. 85. 84. *Bolt. t.* 57. 39. *A.*

In foliis deciduis. *Varietas occurrit lamellis obliquis*; *A. rugatus fl. dan.* 1194.

10. *Pileus dimidiatus*; *stipes lateralis aut nullus*. *Pleuropus*.

1637. *A. OSTREATUS*, gregarius substipitatus, pileo convexo cinereo, lamellis albidis decurrentibus basi confluentibus. *Curt. n.* 36.

Ad truncos arborum.

1638. *A. MOLLIS*, gregarius molliusculus, pileo glabro gibboso pallido, lamellis aquole cinnamomeis. *Fl. dan.* 832. f. 1. ?

In truncis putrescentibus.

1639. *A. STYPTICUS*, caespitosus, pileo subcoriaceo emarginato alutaceo subfarinaceo, lamellis tenuissimis venis connexis cinnamomeis, stipite compresso ascendente apice dilatato. *Trat. timick fung. austr. t.* 1.

Ad truncos aridos frequens.

1640. *A. NIDULANS*, gregarius, pileo dimidiato reniformi tomentoso flavo, lamellis confertis croceo-cinnamomeis. *Pers. ic. et descr. fung. t.* 6. f. 4.

Ad truncos hinter dem Fasanenhaufe.

1641. *A. VARIABILIS*, gregarius acaulis, pileo subtomentoso candido, lamellis ex albo demum rubiginosis. *Fl. dan.* 1073. ? *A. fulvus* *Leyss.*

Ad truncos et ramos delectos in nemore Seebent.

- *1642. *A. EPICAEUS*, pileo reniformi fragili griseo rufescente basi villoso albedo, lamellis ramosis aquose cinnamomeis aut caesio-cinereis. *Batschk* t. 24. f. 122. 123.

Ad terram, et ad arborum truncos, margine limbo inflexo tumido.

- *1643. *A. ALNEUS*, coriaceus tomentosus albidogriseus, lamellis fissis margine revolutis subcaerulis. *Batschk* t. 24. f. 126. *Wetzel* t. 2. f. 6.

Ad truncos populorum, alnorum.

- *1644. *A. CORIACEUS*, coriaceus tomentosus zosteropalescens subresupinatus, lamellis subcaerulis pallide luteis: *A. berulinus* *Leyss.* *Bolt.* t. 72. f. 1. *A. resupinatus* *St. dan.* 1072.

Ad truncos betulinos, *Boletum versicolorum* *St. dan.* titur.

- *1645. *A. SEPIARIUS*, coriaceus utrinque planus, pileo strigoso-tomentoso spadiceo, lamellis caespitis ramosis lutescentibus.

Frequens in truncis et sepibus. *Transitum facit ad sequens genus.*

483. MERULIUS.

- *1646. *M. CANTHARELLUS*, gregarius viridellinus, pileo carnoso glabro depresso. *Trattinick fung. austri.* t. 8. f. 15. *Fl. dan.* 264. *Agaricus* *L.* *Bolt.* t. 62.

In nemoribus nostris frequens.

- *1647. *M. LOBATUS*, acaulis difformis membranaceo rubro-fulcus, margine lobato crispato, vasa ramosis anastomosantibus.

Muscis subputridis insidet in sylvis umbrosis.

- *1648. *M. CORNUCOPIONIDES*, caespitosus nigrescens

pileo membranaceo squamuloso, venis obsoletis rugulosis. *Peziza fl. dan.* 384. *Bolt.* t. 103.

In sylvis nostris.

- *1649. *M. MUSCORUM*, solitarius sessilis auriformis gelatinosus sordide rufescens extus glaber intus venosus margine crispus. *Roth. in bot. ann.* t. 1. f. 4.

Muscis adhaeret in sylvis umbrosis.

- *1650. *M. CRISPUS*, dimidiatus subimbricatus rufo-tomentosus, margine plicisque crispis albidis. *Pers. ic. et descr. fung.* t. 8. f. 7.

In ramis delectis variarum arborum.

- *1651. *M. TREMELLOSUS*, acaulis subresupinatus carnoso-gelatinosus, plicis subporiformibus rubicundis, subtus hirsutus. *Fl. dan.* 776. f. 1.

Ad truncos quercines.

- *1652. *M. VASTATOR*, orbicularis adultus aureus, venis crispis versus centrum in plicas abeuntibus, tuberculis intus albis subaggregatis caulescentibus intermediis. *Tode in Abh. d. hall. nat. Ges.* t. 2.

In aedificiis, ligno humido, alburno.

- *1653. *M. GREGARIUS*, resupinatus sessilis ochraceo-cinnamomeus orbicularis aggregatus, plicis sublaceris. *n. sp.*

In carpini cortice semel lectus.

484. DAEDALEA.

- *1654. *D. QUERCINA*, lignea duritie et colore, sessilis laminis ramulo-sinuatis, sinibus magnis. *Trattin.* t. 2. f. 3. *Agaricus L. Bolt.* t. 73.

Ad truncos quercuum, praesertim ad Erdeborn.

- *1655. *D. SUAVEOLENS*, coriaceo-suberosa sessilis disco albo, margine ferrugineo-ochraceo, sinibus angustis flavescentibus

Ad Salices annosas: unten am Jägerberge.

- * 1656. D. GIBBOSA, subseffilis dimidiata pileo subto-
mentoso albido undulato subzonato basi gibbo-
so, sinubus angustis rectis.

In betularum truncis ad Erdeborn *Schulz-
morlin*.

485. BOLETUS.

1. Suilli: pileo pulvinato carnosio, et tubi
elongatis facile discedente.

- * 1657. B. SUBTUMENTOSUS, pileo convexiusculo sub-
tomentoso fordide ferrugineo, poris ingentibus
Bolt. t. 87.

In nemorosis frequens.

- * 1658. B. PIPERATUS, pileo flexuoso cinnamomo-
poris convexis ferrugineis, stipite basi rufo
flavo. *Batsch t. 25. f. 128. B. gran-
Fl. dan. 1013.*

In pinetis passim.

2. Pileus carnosio-suberosus; tubi breves
cum pileo cohaerentes.

- * 1659. B. PERENNIS, coriaceus tenax cinnamomum
pileo zonato velutino. *Fl. dan. 1075. f. 2.*

In sylvaticis vulgaris.

- * 1660. B. LEPTOCEPHALUS, pileo plano tenui supra
cervino subtus albo, stipite excentrico brevi
pallido. *Jacqu. misc. 1. t. 12.*

In truncis subputrescentibus.

- * 1661. B. UMBELLATUS, ramosissimus, pileo imbric-
atiformi fuligineo-pallido, subtus albo. *Fl.
dan. 1197.*

In der Heide inv. *Schwie.*

3. Stipite laterali.

- * 1662. B. GIGANTEUS, imbricatus latissimus, pileo
subzonato molli rivuloso squamuloso-fibrilloso

Spadiceo, disco demum nigricante, stipite crasso, poris pallidis. *Bolt. t. 77.*

Ad radices arborum.

663. *B. LUCIUS*, pileo coriaceo castaneo nitido concentricis sulcato, poris minutis albidis. *Fl. dan. 1253.*

Ad arborum truncos putrescentes.

664. *B. BADIUS*, subcaespitosus, pileo glabro castaneo, margine pallidiori, poris minutis pallidis, stipite crasso fusco. *Batsch t. 25. f. 129. Fl. dan. 1075. f. 1.*

In sylvaticis frequens,

4. *Pileo dimidiato acauli.*

665. *B. STYPTICUS*, caespitosus carnosus, pileo subrepando glabro albido, margine rufescente, poris albidis.

Ad truncos caesos.

666. *B. SUBEROSUS*, crassus suberosus supra tomentosus albus, poris majusculis pallidis. *Bolt. t. 162.*

Ad salices annosas. *Cum Daedalea suaveolente non confundendus.*

667. *B. HISPIDUS*, acaulis ferrugineus, pileo crasso villoso - strigoso subtus albido. *Fl. dan. 1158.*

Ad radices Pyri Mali.

668. *B. ALNEUS*, gregarius subimbricatus, pileo inaequal tomentoso ferrugineo subzonato, poris cervicis nitidis demum cinnamomeis exiguis.

Ad truncos betularum et alnorum,

669. *B. FUMOSUS*, imbricatus carnosus sordide fuliginosus, pileo glabro undulato basi crassiusculo, poris concoloribus. *Trattin. t. 3. f. 5.*

Ad Salices annosas.

- * 1670. *B. CARPINEUS*, caespitosus, pileo glabro pallido marginato, poris griseis.

Ad betulas. *Schulz morlin.*

- * 1671. *B. IGNIARIUS*, dilatatus laeviusculus rugulosus supra castaneo-aurantiacus, subtus pallidus. *Fl. dan.* 953. *Bolt.* t. 80.

Ad abietum truncos caesos.

- * 1672. *B. OCHRACEUS*, imbricatus suberosus, pileo subtomentoso ochraceo flavo zonato basi tuberculoso, poris minutis albicantibus.

Ad truncos. *Schwie.*

- * 1673. *B. VELUTINUS*, pileo depresso tenui pallido margine albidiori subtomentoso, poris minutis albidis.

Ad truncos. *Schulz morlin.*

- * 1674. *B. UNGULATUS*, durus cinereo-umbrinus fasciatus, poris albidis subferrugineis. *Trattin.* t. 3. f. 6. *B. fomentarius* *Leyss.*

Ad Salices annosas.

- * 1675. *B. CINNABARINUS*, gregarius cinnabarinus, pileo crassiusculo obsoleto zonato ruguloso subtomentoso.

Ad truncos betularum. *Abit in Sistotrema.*

5. *Resupinatus effusus*: *Poria.*

- * 1676. *B. SEBACEUS*, undulatus subrugosus albidospadiceus *Leyss.*

In cellis.

- * 1677. *B. CONTIGUUS*, crassus glaber ferrugineus, poris dilatatis aequalibus obliquis.

In ligno putrido.

- * 1678. *B. MEDULLA PANIS*, candidus limitatus crustaceus, poris minutis brevibus. *Bolt.* t. 166.

In truncis putridis. *Schulz morlin.*

- * 1679. *B. MUCIDUS*, candidus mollis margine byssaceo, poris congestis minutis. *Fl. dan.* 716.
f. 1.

Ad truncos caesos.

- * 1680. *B. INCARNATUS*, incarnatus laevis, poris obliquis inaequalibus.

Cum priori.

- * 1681. *B. RADULA*, pallidus, margine laevi, tomentosus crassiusculus lobatus, poris dentibusque inaequaliter prominulis centralibus alper.

In truncis pinuum, betularum. *Schwie.*

- * 1682. *B. MOLLUSCUS*, pallidus mollis, margine candido byssino, poris subobsoletis sublaceris.

In truncis arborum. *Cum B. fimbriata et byssino summa ad finitas.*

- * 1683. *B. NITIDUS*, angustatus elongatus incarnato-flavescens nitidus, poris minutis, margine glabro sublobato. *Pers. obs. myc.* 2. t. 4. f. 1.

In Prunis horti botanici.

486. SISTOTREMA.

- * 1684. *S. CONFLUENS*, gregarium stipitatum pallescens, pileo carnoso flexuoso confluyente, dentibus decurrentibus albidis.

Inter muscos in pinetis.

- * 1685. *S. SCHULZMORLINI*, dimidiatum acaule crassum sanguineo-luridum, superficie inaequali, dentibus ochraceo-ferrugineis. *n. sp.*

In palude Dölav. *Schulzmorlin.*

- * 1686. *S. VIOLACEUM*, dimidiatum imbricatum tomentosum albidum, subtus purpurascens-violaceum. *Hydnum decipiens* L. *Agaricus decipiens* Willd. in *bot. Magaz.* 4. t. 2. f. 5.

Ad truncos pinuum.

- * 1687. *S. VERSICOLOR*, caespitosum acaule coria-

ceum, pileo tenui zonato submarginato tomento-fericeo, dentibus albidis. *Trattin. t. 5. f. 10. Boletus Pers. Bolt. t. 81.*

Ad truncos aridos sat frequens. *Mire variat per aetate varia; mox enim zonarum vestigia pauca, mox pilei superficies tota cinereo-fuliginosa, mox dentes ipsi subcinerei. (v. cinereum Pers.)*

- * 1688. *ST. QUERCINUM*, resupinatum glabrum pallide subrufescens, dentibus crassis difformibus subappressis. *Hydnum candidum Willd. l. c. t. 3. f. 7.*

In ramis quercuum et pinuum aridis.

487. HYDNUM.

- * 1689. *H. IMBRICATUM*, pileo carnoso umbilicato umbrino squamoso, squamis erectiusculis crassius obscurioribus. *Batsch t. 10. f. 43. Fl. dan. 176. Bolt. t. 88.*

In sylvaticis montosis.

- * 1690. *H. REPANDUM*, pileo rugoso flexuoso sublobato glabro pallide incarnato seu flavido, stipite tuberoso subexcentrico. *Fl. dan. 310. Bolt. t. 89.*

In sylvaticis copiose.

- * 1691. *H. AURISCALPIUM*, stipitatum spadiceum, pileo dimidiato subhirsuto. *Fl. dan. 1020. Curt. n. 32. Bolt. t. 90.*

In strobilis pinuum ad terram.

- * 1692. *H. OBTUSUM*, albidum, aculeis teretibus obtusis apice villosis.

In ramis aridis. *Schulzmorlin.*

488. THELEPHORA.

- * 1693. *TH. TERRESTRIS*, subimbricata obscure fusca, pileo dimidiato applanato fibroso-strigoso.

In pinetis sabulosis.

- * 1694. TH. LACINIATA, imbricata obscure fusca, pileo dimidiato laciniato crispo papilloso.

Ad radices arborum passim.

- * 1695. TH. FERRUGINEA, effusa fusco-ferruginea, pileo subtomentoso laeviusculo subtus piloso.
Fl. dan. 1198.

Ad ramos detectos, colore pulveris sternutatorii.

- * 1696. TH. RUBIGINOSA, imbricata rigida supra rubiginoso-spadicea papillosa, infra zonata fusca, utrinque glabra.

In pinetis non raro.

- * 1697. TH. HIRSUTA, caespitosa coriacea lutescens subfasciata strigoso-hirsuta subtus glabra. *Fl. dan.* 950.

Ad truncos arborum vulgarissima.

- * 1698. TH. LUTEA, imbricata lutea zonata supra glabra, subtus fusco-hirsuta. *n. sp.*

In sylva ad Erdeborn. *Schulzmorlin.*

- * 1699. TH. MESENTERICA, coriaceo-gelatinosa tomentosa cinereo-fusca, plicis longitudinalibus sparlis, subtus purpurascens. *Fl. dan.* 1197.

Ad truncos quercinos et betulinos.

- * 1700. TH. QUERCINA, resupinata effusa coriacea rugulosa rimulosa carnea, margine subinvoluta subtusque umbrina.

Ad ramos quercuum aridos vulgaris.

- * 1701. TH. ABIETINA, resupinata effusa coriacea sublibera supra purpurascens nitens, subtus tomentosa umbrina.

Ad ramos pinuum non rara. *Schwie.*

- * 1702. TH. CALCEA, subeffusa tenuis dura subrimosa pallida, papillis manifestis.

Ad truncos varios.

- *1703. TH. CORIUM, resupinata crassa pallida molliuscula, superficie obsolete reticulata.

Ad truncos putrescentes in nemusculo Seebeni.

- *1704. TH. DISPERSA, effusa incrustans sordide flava mollis subgranulosa, subtus fusca, n. sp.

In cortice pinuum.

- *1705. TH. POLYGONA, resupinata effusa incarnata, papillis maiusculis polygonis.

Ad ramos populorum aridos. Abit in Th. fallacem colore alutaceo.

- *1706. TH. LAEVIS, resupinata albido-carnea late effusa laevissima, margine byssino.

Ad ramos varios aridos.

- *1707. TH. GRANULOSA, glabra alutacea effusa, papillis minutis albidis, granulata subtus fusca.

In trunco decrepito. Schulzmorlin.

- *1708. TH. CRUENTA, resupinata glabra coriacea tuberculata sanguinea,

Ad ramos pinuum. Schwie.

- *1709. TH. BUCREAS, resupinata carnosa sanguinea crassa, papillis confluentibus, intus fibrosa, n. sp. *Boletus Buglossum fl. dan.* 1156.

In pinetis, der Heide, ad ramos.

- *1710. TH. INCRUSTANS, resupinata subcarnosa rugoso-tuberculosa effusa pallida, subtus ferruginea tomentosa,

Ad terram in locis sylvaticis.

- *1711. TH. VINOSA, resupinata subrugosa mollis violaceo-fusca, margine subtomentosa.

Ad ligna abietina.

- *1712. TH. ACERINA, resupinata tenuis compacta subinterrupta albido-caesia.

Ad ramos quercuum aridos.

- *1713. *TH. SCHWIRANA*, resupinata gregaria pallide flava lupra laevis, subtus tomentosa albida subzonata. *n. sp.*

Ad ramos pinuum a *Schwileo* pharmacopola lecta.

489. CLAVARIA.

- *1714. *CL. FOETIDA*, ramoso fusco-purpurascens, ramis subdivisis approximatis, apice albicantibus nitidis. *Merisina Pers.*

In pinetis.

- *1715. *CL. CORNICULATA*, subramosa flava, caule gracili elongato furcatim subdiviso, ramulis acutis. *Fl. dan.* 775. *f.* 3. 836. *f.* 2. *Bolt.* t. 114.

In sylvaticis ad terram.

- *1716. *CL. CORNEA*, simplex aut subramosa flavescens viscosa obtusa cylindrica, primum gelatiposa, dein cornea. *Batsch* t. 28. *f.* 161.

In ligno pineo.

- *1717. *CL. PISTILLARIS*, simplex clavata aurantiaca aut cinnamomea. *Fl. dan.* 1255. *Batsch* t. 11. *f.* 46. *Bolt.* t. 110.

In sylvaticis, faginetis rarius.

490. GEOGLOSSUM.

- *1718. *G. HIRSUTUM*, subfasciculatum hirsutum nigrum. *Schmidel* t. 25.

In sylvis et pratis raro.

491. SPATHULARIA.

- *1719. *SP. FLAVIDA*. *Fl. dan.* 658. *Bolt.* t. 95.

Semel in der Heide legi, foliis putridis innatum.

492. LEOTIA.

- *1720. *L. CIRGINANS*, pileo orbiculari spadiceo livido cum stipite confluyente. *Pers. ic. et descr.* t. 5. *f.* 5.

Semel hinter dem Fasanenhaufe legi.

493. HELVELLA.

- * 1721. H. MITRA, pileo inflato lobato demum sublibero livido-nigrescente, stipite sulcato lacunoso. *Fl. dan.* 116. *Bolt.* t. 95.

In pinetis rarissime.

494. MORCHELLA.

- * 1722. M. ESCULENTA, pileo basi contracto bruno-fuligineo, stipite fistuloso albo-pulverulento. *Trattin.* t. 6. f. 11. *Phallus esculentus* L. *Fl. dan.* 53. *Bolt.* t. 94.

In sylvis rarius: Maio.

495. PEZIZA.

1. *Tremelloideae.*

- * 1723. P. SARCOIDES, caespitosa subcarnosa carneorubra, externe subvenosa. *Fl. dan.* 1017.

Ad ramos aridos frequens.

- * 1724. P. UDA, subtremellosa applanata livido-fuscescens orbicularis.

Ad ramos deiectos.

- * 1725. P. AUREA, congesta minuta subfissilis planiuscula fulva nitida. *Helvella aurea* Bolt. *fung.* t. 98. f. 1.

Cum priori frequens.

- * 1726. P. RUSA, parva substipitata glabra convexa rufa, margine flexuoso.

In cortice pinuum. *Schulzmorlin.*

- * 1727. P. VINOSA, planiuscula minuta rosea.

In ramis quercuum.

2. *Cupula hirsuta.*

- * 1728. P. HEMISPHERICA, gregaria maiuscula hemisphaerica, margine repando, intus fusca extus

umbrina, pilis fasciculatis. *Batsch* t. 28. f. 154.

In nemorosis udis.

- 1729. *P. CERINA*, gregaria sessilis lutescens globosa, extus strigoso-paleacea.

In lignis putridis. *Schulzmorlin*.

- 1730. *P. GRANULIFORMIS*, gregaria conferta sessilis nivea hirta.

Ad ramos deiectos.

- 1731. *P. CORTICALIS*, gregaria sessilis erumpens strigoso-hirta cinereo-lurida.

In cortice arborum. *Schwie*.

- 1732. *P. VIRGINEA*, gregaria candida, stipite longiusculo, cupula hemisphaerica, patula villosa. *Michel* t. 86. f. 15.

Cum priore.

3. *Cupula glabra.*

- 1733. *P. RADIATA*, parva stipitata exalbida, margine fetaceo-radiata. *Fl. dan.* 1016. *Bolt.* t. 106. f. 2.

Ad caules herbarum aridos.

- 1734. *P. CYATHOIDEA*, sparsa albida, cupula nuda tenui, stipite subuliformi. *Batsch* t. 27. f. 151. *Octospora Hedw. stirp.* II. 9. f. B.

Ad caules herbarum copiose.

- 1735. *P. FAGINEA*, cupula planiuscula albida, stipite brevissimo crasso.

Ad ramos fagineos legi.

- 1736. *P. DISCOLOR*, *β. byssifeda*, sessilis ochracea planiuscula subpapillata, tomento albo insidens.

In truncis putridis ad Erdeborn, *Schulzmorlin*.

- *1737. *P. SANGUINEA*, sessilis plana, primum fusca margine nigro flexuoso, demum tota atra, tomento sanguineo insidens.

In truncis putridis populorum ad Erdeborn.
Schulzmorlin.

- *1738. *P. LENTICULARIS*, conferta, cupulis subsessilibus convexiusculis laete flavis.

Ad ramos ulmorum deiectos.

- *1739. *P. PATELLARIA*, gregaria nigra applanata subcoriacea distincte marginata. *Lichen atratus Hedw. stirp. II. t. 21. A.*

In ramis tiliarum aridis.

- *1740. *P. PINASTRI*, caespitosa subsessilis rugulosa lobata atra nitida.

Ad corticem Pinus. *Num eadem cum P. Abietis?*

- *1741. *P. LEUCOMELAEANA*, gregaria sessilis, cupulis concavis glabriusculis extus nigris intus caesio albidis.

Ad ramos siccos.

- *1742. *P. CARPINEA*, caespitosa incarnato-pallescenterumpens, cupulis in subiculo aggregatis subdifformibus planiusculis. *Tode t. 1. f. 32.*

In ramis aridis carpini.

- *1743. *P. LURIDA*, gregaria sessilis alba subirregularis, margine fulco. *Batsch t. 26. f. 140.*

In truncis putridis. *Schwie.*

- *1744. *P. FULVA*, sparsa sessilis aureo-fulva glaberrima, margine tumidulo integerrimo subinflexo. *n. sp.*

In truncis putridis, cum Calicio claviculati.
Schulzmorlin.

- *1745. *P. AERUGINOSA*, gregaria substipitata aeruginosa, disco pallidiori. *Fl. dan. 1200. f. 1.*

In truncis putridis. *Schulzmorlin.*

496. STILBUM.

- * 1746. ST. RIGIDUM, gregarium, stipite rigido atro, capitulo primum aquoso lacteo, demum griseo compacto. *Perf. in bot. ann. 11. t. 2. f. 2.*

In truncis putridis. (*Subiculum adest, quod Calicio proximum reddit.*)

XI. B Y S S I.

497. RHIZOMORPHA.

- * 1747. RH. SUBCORTICALIS, compressa ramosa fusconigricans. *Michel. t. 66. f. 3. Fl. dan. 713.*

Ad truncos exsiccatos frequens inter corticem et lignum.

1748. RH. SCANDENS, longa ramosa teretiuscula hinc inde verrucosa nigra. *Rebent.*

Ad truncos annosos caelos copiose. *Lichen radiiformis Leyfs.*

498. HIMANTIA.

1749. H. CANDIDA, tenera candida, apice subplumoso. *Byssus candida Leyfs. Dill. t. 1. f. 15.*

Inter folia putrescentia ubique.

- * 1750. H. UMBRINA, tenera fibroso-caespitosa umbrina.

Ad ramos exsiccatos.

499. RACODIUM.

1751. R. RUPESTRIS, compactum nigrum erectiusculum subramosum. *Dill. t. 1. f. 18. Byssus antiquitatis Leyfs.*

In muris et saxis arenariis.

1752. R. CELLARE, late expansum mollissimum nigrum simplex. *Byssus cellaris L. Cf. Humboldt fr. 66. Michel. t. 89. f. 9.*

In cryptis fodinarum, cellis.

CLASS. XX. ATELIA.

- * 1755. R. XYLOSTROMA, latissimum molle alutaceum ochroleucum. *Tode t. 6. f. 51.*

In quercuum ramis aridis.

500. MONILIA.

1754. M. GLAUCA, caespitosa cinereo-glauca. *Michel. t. 91. f. 1. Fl. dan. 777. f. 2. 840. f. 3. Mucor glaucus Leyfs.*

In fructibus putrescentibus.

1755. M. VIRIDIS, late effusa acaulis granuloso-articulata viridis. *Byssus botryoides Linn. Lichen viridis Schreb. Lepraria botryoides Achar. Sprengels Anl. t. 8. f. 79. Fl. dan. 840. f. 3. 899. f. 3.*

Ad septentrionales parietes, in truncis arborum. (Cf. de dubio hoc organismo *Weis gött. 16. Link gött. 15.*)

56. M. CINNABARINA, acaulis effusa cinnabarina. *Lepraria rubens Achar. Lichen rubens Hofm.*

In cortice arborum vetustarum versus septentrionem.

- * 1757. M. ANTENNATA, effusa atra, filamentorum articulis ovatis. *Dematium Hofm. germ. t. 13. f. 4.*

In truncis putridis *Schwie.*

501. DEMATIUM.

- * 1758. D. EPIPHYLLUM, erectum fasciculatum olivaceum, dein pulveraceum filis intertextis.

In foliis populorum; ad caules herbarum. (*Di herbarum Pers: mihi idem videtur.*)

- * 1759. D. OLLARE, effusum sericeo-fulvum molissimum. *Michel. t. 90. f. 4.*

In ollis vaporariorum.

1760. D. VIOLACEUM, caespitosum violaceo-caesium phosphoreum. *Byssus phosphorea Leyfs.*

In lignis putrescentibus.

- * 1761. D. ABIETINUM, effusum tenue cinnamomeo-pallidum pulverulentum.

Ad truncos pinuum et abietum.

- * 1762. D. ERYSIPEMA, granulis aggregatis fusco-nigris tomento albo insidentibus. *Mucor Leyfs. Sclerotium Pers.*

In foliis corylorum et aliarum plantarum.

502. ERINEUM.

- * 1763. E. ACERINUM, depressum latiusculum rufofulcum.

Ad folia acerum delecta.

- * 1764. E. BETULINUM, depressum effusum, primo sulfureo-purpureum, dein rufofulcum. *Albert. et Schwein. Rebert.*

Ad folia betularum vulgare.

- * 1765. E. TILIACRUM, gregarium pulvinatum primo sublivacinum, dein fulcum pallidumve.

Ad folia tiliarum.

- * 1766. E. POPULINUM, cupulare immersum subgrumosum spadiceum.

Ad folia populorum.

- * 1767. E. ALNEUM, pulvinatum grumosum fulvo-ferugineum.

Ad folia alnorum.

503. ISARIA.

- * 1768. I. TRUNCATA, ramosissima, ramis truncatis crenulatis.

Inter folia decidua et ad truncos caesos.

- * 1769. I. MUCIDA, caespitosa effusa, ramulis subdepressis furcatis pruinatis. *Byssus fruticulosa Fl. dan. 718. f. 2.*

Ad ligna putrescentia.

AUCTORES CITATI.

Abhandlungen der hallischen naturforschenden Gesellschaft. B. 1. Dessau 1783. 8.

E. Acharii methodus lichenum. Holm. 1803. 8.

*de Albertini et L. D. de Schweinitz
conspectus fungorum in agro Niskiensi cre-
scentium. Lips. 1805. 8.*

*llionii flora Pedemontana, tom. 1—3.
Aug. Taur. 1785. fol. Ej. auctarium ad fl.
Pedem. Aug. Taur. 1789. 4.*

*Annalen der Botanik, herausgeb. von P. Usteri,
St. 1—24. Zürich. 1791—1800. 8.*

*Is of botany: editors Ch. König and J.
Sims. Lond. n. 1—4. 1804. 1805. 8.*

*J. Banks account of the blight in corn. Lond.
1805. 4.*

*Iac. Barrelier plantae per Galliam, Hispaniam
et Italiam observatae, iconibus exhibitae
Paris 1714. fol.*

*A. I. G. C. Batsch elenchus fungorum. Hal.
1780—1789. 4. t. 1—3.*

C. Bauhini πινὰς theatri botanici. Basil. 1671. 4.

*J. Bauhini historia plantarum, tom. 1—3.
Ebrodun. 1650. 51. fol.*

*Blackwellianum herbarium emendatum et auctum,
cent. 1—6. Norib. 1750—1772. fol.*

*I. Bolton's history of the british proper ferns.
Lond. 1791. 4.*

*Deffen Geschichte der merkwürdigsten Pilze, über-
setzt von Willdenow, Th. 1. 2. 3. Berlin
1794. 1799. 8.*

- S. E. Bridel muscologia recentiorum, vol. 1—3. Goth. 1797—1803. 4.*
- I. C. Buxbaum enumeratio plantarum in agro Halensi crescentium. Hal. 1721. 8.*
- Ej. plantarum minus cognitarum cent. 1—5. Pestrop. 1728. 4.*
- A. Cavanilles anales de ciencias naturales, n. 1—20. Madr. 1799—1804. 8.*
- Ej. icones et descriptiones plantarum cent. 1—6. Madr. 1791—1802. fol.*
- Ej. Monadelphia classis, diff. 1—10. Madr. 1785—1790. 4.*
- C. Clusii rariorum plantarum historia. Antverp. 1601. fol.*
- H. I. N. Crantz stirpium austriacarum, P. 1, 2. Vienn. 1769. 4.*
- W. Curtis flora Londinensis, n. 1—70. Lond. 1777—1785. fol.*
- A. P. Deoandolle astragalogia. Par. 1802. fol.*
- Iac. Dickson fasc. 1—4. plantarum cryptogamicarum Britanniae. Lond. 1785—1801. 4.*
- I. I. Dillenii hortus Elthamensis, vol. 1, 2. Lond. 1732. fol.*
- historia muscorum. Oxon. 1745. 4.*
- L. W. Dillwyn's synopsis of the british conser-vae, fasc. 1—4. Lond. 1800—1802. 4.*
- übersetzt von Weber und Mohr. Gött. 1803—1805. 8.*
- R. Dodonaei stirpium historiae pemptades VI. Antv. 1616. fol.*
- F. Ehrhart's Beiträge zur Naturkunde, B. 1—7. Hannov. 1787—1792. 8.*
- English botany, or coloured figures of british plants, by I. E. Smith and Sowerby, vol. 1—16. Lond. 1790—1805. 8.*

Flora danica, ed. C. Oeder, O. F. Muller et M. Vahl. vol. 1—7. Havn. 1764—1799. fol.

I. Gärtner *de fructibus et seminibus plantarum*, vol. 1. 2. Stuttg. 1788. 1791. 4.

C. F. Gärtner *carpologia*, fasc. 1. Tübing. 1805. 4.

L. Gerardi *flora gallo-provincialis*. Paris 1761. 8.

I. E. Gleditsch *methodus fungorum*. Berol. 1753. 8.

I. G. Gmelin *flora sibirica*, vol. 1—4. Petrop. 1747—1769. 4.

A. Gouan *flora Monspeliana*. Lugd. 1765. 8.
— *illustrationes et observationes botanicae*. Turgur. 1773. fol.

Guettard *observations sur les plantes*, vol. 1. 2. Paris 1747. 12.

A. Haller *de Allii genere naturali libellus*. Gött. f. a. 4.

— *historia stirpium indigenarum Helvetiae*. Bern 1768. fol.

F. G. Hayne und Dreves *botanisches Bilderbuch*, B. 1—4. 1800—1806. 4.

I. Hedwig *theoria generationis plantarum cryptogamicarum*. Lips. 1797. 4.

— *descriptio et adumbratio stirpium cryptogamicarum*, vol. 1—4. Lips. 1787—1797. fol.

— *species muscerum frondosorum* (posthumae, ed. Schwägrichen.) Lips. 1801. 4.

G. F. Hofmann *Deutschlands flora, oder botanisches Taschenbuch für das Jahr 1795—1800—1804*. Erlang. 12.

— *historia salicum*, vol. 1. 2. Lips. 1787. fol.

- G. F. Hofmann** *descriptio et adumbratio lichenum*, vol. 1—3. Lips. 1790—1801. fol.
- N. T. Host** *icones et descriptiones graminum austriacorum*, vol. 1—3. Vienn. 1802—1805. fol.
- W. Hudson** *flora anglica*, vol. 1. 2. Lond. 1778. 8.
- A. Humboldt** *florae fribergensis specimen*. Berol. 1793. 4.
- N. I. Jacquin** *flora austriaca*, cent. 1—5. Vienn. 1773—1776. fol.
- *icones plantarum rariorum*. 1—3. Vienn. 1780—1793. fol.
- *collectanea ad botanicam, chemiam et historiam naturalem spectantia*, vol. 1—4. Vienn. 1786—1793. 4.
- *observationum botanicarum*, P. 1—4. Vienn. 1764. 8.
- *enumeratio stirpium, quae in agro Vindobonensi crescunt*. Vienn. 1762. 8.
- *miscellanea austriaca*. 1. 2. Vienn. 1778—1781. 4.
- Jaume S. Hilaire** *exposition des familles naturelles*, vol. 1. 2. Paris 1805. 4.
- J. S. Kerner's** *Beschreibung und Abbildung der Bäume und Gesträuche, welche im Herzogth. Wirtemberg wild wachsen*. H. 1—6. Stuttg. 1788. 4.
- P. Kitaibel et Fr. Waldstein** *icones et descriptiones plantarum rariorum Hungariae*. Vienn. 1802. f. fol.
- C. Knauth** *enumeratio plantarum circa Halam Saxonum sponte provenientium*. Lips. 1687. 12.
- J. B. Lamarck** *Encyclopédie méthodique. Botanique*, vol. 1—4. Paris 1789—1796. 4.

AUCTORES CITATI.

- A. B. Lambert** *description of the genus Pinus.* Lond. 1803. fol.
L. Leers *flora Herborensis.* Herb. 1775. 8.
W. Leysser *flora Halensis.* Hal. 1783. 8.
iljebblad utkast til en svensk flora. Upsal. 1798. 8.
F. Link *florae Göttingensis specimen.* Göt. 1789. 8.
C. Linnaei *supplementum plantarum.* Brunsv. 1781. 8.
 — *hortus Cliffortianus.* Amst. 1737. fol.
 — *flora lapponica, ed. I. E. Smith.* Lond. 1792. 8.
M. Lobellii *stirpium icones, vol. 1. 2.* Antv. 1581 — 1591. 4.
I. Loeselii *flora Prussica. Region.* 1703. 4.
Magazin für die Botanik, herausg. von P. Usteri, St. 1 — 12. Zürich 1787 — 1790. 8.
P. A. Matthioli *commentaria in Dioscoridem.* Venet. 1560. fol.
P. A. Michellii *nova plantarum genera.* Flor. 1729. 4.
R. Morison *plantarum historia universalis, vol. 1 — 3.* Oxon. 1680 — 1699. fol.
S. P. Pallas *species Astragalorum.* Lipsf. 1800. fol.
 — *haloph. illustrationes plantarum imperfecte vel nondum cognitarum, fasc. 1 — 4.* Lipsf. 1803 — 1805. fol.
C. H. Persoon *observationes mycologicae, vol. 1. 2.* Lipsf. 1796. 1797. 8.
 — *icones et descriptiones fungorum minus cognitorum. 1. 2.* Lipsf. 1800. 4.
 — *icones pictae rariorum fungorum. 1. 2.* Paris 1804. 4.

- H. *Perfoon synopsis methodica fungorum.* Gott. 1801. 8.
- J. *Petiver herbarii britannici Raii catalogus cum ic. in Opp. vol. 2.* Lond. 1764. fol.
- pn. *Plukenet opera omnia, vol. 1—3.* Lond. 1696. 4.
- J. M. *Poiret Encyclopédie méthodique. Botanique, vol. 5. 6.* Paris 1804. 1805. 4.
1. *Follich historia plantarum in Palatinatu sponte crescentium, vol. 1—3.* Mannh. 1776—1778. 8.
- J. *Rafn Danmarks og Holsten's flora, D. 1. 2.* Kiobenh. 1796. 1800. 8.
- Raji synopsis stirpium britannicarum.* Lond. 1690. 8.
- J. *Rebentisch prodromus florae neumarchicae.* Berol. 1804. 8.
- Rehfeldt hodegus botanicus menstruus.* Hal. 1717. 8.
- I. *Retzii florae Scandinaviae prodromus.* Lipsf. 1795. 8.
- *fasciculi observationum 1—6.* Lipsf. 1774—1791. fol.
- Q. *Rivini introductio generalis in rem herbariam, c. ic.* Lipsf. 1690. fol.
- I. *Rümers Archiv für die Botanik, Th. 1—3.* Leipz. 1796—1805. 4.
- W. T. *Rostkøvi diff. de Iunco.* Hal. 1801. 8.
- W. *Roth tentamen florae germanicae, vol. 1—3.* Lipsf. 1788—1800. 8.
- *catalecta botanica, vol. 1—3.* Lipsf. 1797—1806. 8.
- *neue Beiträge zur Botanik, Th. 1.* Frkf. 1802. 8.
- R. *Rudbek campi elysii, lib. 2.* Upsal. 1702. fol.

M.B. *Ruppil flora lenensis*, ed. A. Haller.
Ien. 1745. 8.

J.C. *Schaeffer fungorum Ratisbonensium icones*, t. 1—4. Ratisb. 1762—1770. 4.

C. *Schkuhr's botanisches Handbuch*, Th. 1—5.
Lipsb. 1791—1803. 8.

— *Kryptogamische Gewächse*. H. 1. 2. Leipz.
1804. 1805. 4.

C.C. *Schmiedel icones plantarum et analysis partium*. Norib. 1762. fol.

F.W. *Schmidt flora boëmica*, cent. 1—4. Prag.
1793. 1794. fol.

H.A. *Schrader spicilegium florum germaniarum*
Hannov. 1794. 8.

— *commentatio super Veronicis spicatis* L. Gott.
1803. 8.

— *Journal für die Botanik*, 1799—1807. Göt. 8.

— *neues Journal für die Botanik*. 1. 2. Erf.
1805. 1806. 8.

F. de Paula *Schrank primitiae florum Salisburgensis*. Fref. 1792. 8.

— *Reise nach den südlichen Gebirgen von Bayern*. München 1793. 8.

I.C.D. *Schreibers Beschreibung und Abbildung der Gräser*. Leipz. 1769. fol.

— *observationes de Phasco*. Lips. 1770. 8.

C.F. *Schultz prodromus florum Stargardensis*. Berol. 1806. 8.

C.F. *Schumacher enumeratio plantarum in partibus Saellandiae septentrionalis*. Havn.
1801. 8.

I.A. *Scopoli flora Carniolica*, tom. 1. 2. Vienn.
1772. 8.

I. *Sibthorp flora Oxoniensis*. Oxon. 1794. 8.

- J. E. Smith** *flora britannica*, ed. I. I. Römer, vol. 1—3. Turic. 1804. 1805. 8.
- *plantarum icones hactenus ineditae*, fasc. 1—3. Lond. 1789—1791. fol.
- W. Solz** *Menthæ britannicæ*. Bath. 1798. fol.
- C. K. Sprengels** *entdecktes Geheimniß der Befruchtung*. Berl. 1793. 4.
- K. Sprengels** *Anleitung zur Kenntniß der Gewächse*. Th. 1—3. Halle 1802—1804. 8.
- I. Sturm**, *Deutschlands Flora in Abbildungen nach der Natur*. Abth. I. Hef. 1—18. Abth. II. H. 1—8. Nurnb. 1798—1806. 12.
- Svensk botanik**, utgifven af I. W. Palmstruch, med Text författad af C. Quensel, B. 1—4. Stockh. 1800—1806. 8.
- O. Swartz** *dispositio methodica muscorum frondosorum Sueciæ*. Erl. 1799. 8.
- I. Tabernaemontani** *new vollkommentlich Kreuterbuch*. Frcf. 1613. fol.
- I. L. Thuillier** *la flore des environs de Paris*. 1799. 8.
- H. I. Tode** *fungi meklenburgenses selecti*. Luncb. 1790. 4.
- I. P. Tournefort** *institutiones rei herbariæ*, vol. 1—3. Paris 1719. 4.
- Transactions of the Linnean society*, vol. 1—7. Lond. 1791—1805. 4.
- L. Trattinick** *fungi austriaci*. Vienn. 1805. 4.
- D. Turner** *muscologiae Hiberniæ spicilegium*. Yermouth 1804. 8.
- S. Vaillant** *botanicon Parisiense*. LB. 1726. fol.
- I. P. Vaucher** *histoire des conserves d'eau douce*. Genève 1803. 4.
- Villars** *histoire des plantes de Dauphiné*, vol. 1—3. Grenoble 1786. 1788. 8.

C. E. Weigal observationes botanicae. Crypt.
1772. 4.

F. G. Weiss plantae cryptogamicae florum güttingensis. Gott. 1770. 8.

C. L. Willdenow species plantarum, vol. 1—2.
Berol. 1797—1806. 8.

— prodromus florum berolinensis. Berol. 1788. 8.

W. Withering's arrangement of british plants,
vol. 1—4. Birmingh. 1796. 8.

J. F. Wöhlehen supplementum ad Cryssert floram halensem. Hal. 1796. 8.

I. F. Wolff commentatio de Lemna. Alton.
1801. 4.

INDEX GENERUM.

-445	Anthoceros 1254 1255
14—987	Anthoxanthum 40
598 599	Anthyllis 797
	Antirrhinum 713 714
	Apargia, 893 894
5—635	Apium, 360
	Aquilegia 601
1567—1574	Arabis 746
m 364	Arctium 922 923
35	Arcyria 1555 1556
5	Arenaria 502—506
596—1645	Aristolochia 1024
484	Arnica 953
a. 525	Artemisia 931—935
1—86	Arum 1074
96	Arundo 143—145
—639	Afarum 473
191	Asclepias 283
1—434	Asparagus 394
1—387	Asperugo 209
	Asperula 167—169
72—74	Aspidium 1126—1128
5	Asplenium 1131—1134
11	Aster 976—978
594 1595	Astragalus 822—826
1067	Astrantia 319
120	Athamanta 331
06	Athyrium 1129 1130
n 89	Atriplex 291—297
227	Avena 138—142
610—615	Baeomyces 1331—1347
358	Ballota 673
981—983	

- Barbula** 1184—1187
Bartramia 1203—1205
Bellis 946
Berberis 378
Betonica 667
Betula 1082
Bidens 929 930
Biscutella 737
Blechnum 1137
Boletus 1651—1685
Borago 212
Botrychium 1139
Bovista 1531 1532
Brafica 749 750
Briza 120 121
Bromus 129—137
Bryonia 1089
Bryum 1205—1210
Bupleurum 315—318
Butomus 463
Buxbaumia 1252

Calendula 995 998
Calicium 1315—1318
Calla 419
Callitriche 3—5
Caltha 616
Campanula 247—256
Cardamine 751—754
Carduus 909—914
Carex 1026—1064
Carlina 924 925
Carpinus 1085
Caryum 359
Caucalis 321—328
Centaurea 988—984
Centunculus 187
Geraanium 530—534
Ceratophyllum 1077 1078
Cetraria 1413—1416

Chaenocarpus 1565
Chaerophyllum 350—354
Chara 1112—1114
Cheiranthus 744 745
Chelidonium 536
Chenopodium 298—308
Chironia 236—238
Chondrilla 886
Chrysanthemum 948 949
Chrysocoma 927
Chrysosplenium 487 488
Cichorium 907
Cicuta 344
Cineraria 963—965
Circaea 34
Clavaria 1714—1717
Clematis 609
Climacium 1195
Clinopodium 681
Cnicus 915—921
Cochlearia 723
Colchicum 420
Colutea 800
Comarum 578 579
Conserva 1418—1442
Conium 324
Convallaria 390—395
Convolvulus 241 242
Conyza 915
Cornicularia 1351 1352
Cornus 188 189
Coronilla 849 850
Coronopus 720
Corylus 1073
Crepis 882—885
Cribraria 1558
Cucubalus 489 490
Cuscuta 281 282
Cyathus 1588—1590
Cymbidium 1022

INDEX GENERUM

399

- um 207 208
- i 149
- ia 53
- um 1023
- 64
- 1654—1656
- 30
- 9
- 10
- n 600
- 1758—1762
- 479—483
- 1158—1172
- 465
- 1559 1560
- n 1175 1176
- 07
- 160 161
- 727
- 75—375
- 9
- 2
- 1152
- n 1329
- 436—441
- 1015—1021
- 1115—1120
- 60 961
- 763—1767
- n 63—65
- 65 766
- 821
- 312
- 739—743
- 1 928
- 507—516
- 701—703
- Evonymus 264
- Fagus 1081
- Fedia 43 44
- Festuca 122—128
- Fontinalis 1251
- Fragaria 569
- Fraxinus 35
- Fuligo 1546—1548
- Fumaria 786—789
- Funaria 1253
- Galanthus 381
- Galeopsis 663—666
- Galium 170—181
- Geastrum 1542
- Geoglossum 1718
- Gemista 792—796
- Gentiana 285—290
- Geranium 707—778
- Geum 580 581
- Gladiolus 50
- Glaucium 587
- Glaux 279
- Glechoma 658
- Globularia 159
- Gnaphalium 936—943
- Gratiola 28
- Grimmia 1153—1156
- Gymnostomum 1146 →
- 1149
- Gypsophila 476
- Gyrophora 1319—1321
- Hedera 278
- Hedysarum 848
- Helianthemum 589—590
- Helvella 1722
- Heracleum 336
- Herniaria 309

- Hieracium** 868—877
Himantia 1749 1750
Hippocrepis 852
Hippuris 1
Holcus 101—103
Holosteum 158
Hordeum 153 154
Hottonia 228
Humulus 1104
Hyacinthus 388 389
Hydnum 1689—1692
Hydrocharis 1111
Hydrocotyle 313
Hyoscyamus 240
Hypericum 859—864
Hypnum 1220—1250
Hypochoeris 904—906
Hypoxis 645
Hysterium 1522—1525

Jasione 259
Iberis 735 736
Impatiens 265
Imperatoria 346 347
Inula 954—959
Iris 45—49
Isaria 1768 1769
Isatis 719
Juncus 404—418
Juniperus 1103
Jungermannia 1256—1278

Lactuca 887—890
Lamium 659—662
Lapfana 865 866
Laserpitium 334 335
Lathraea 694
Lathyrus 805—810
Lavatera 780

Lecidea 1292—1310
Lemna 36—39
Leontodon 891 892
Leonurus 677—679
Leotia 1721
Lepidium 729
Leskea 1196—1202
Leucium 380
Ligustrum 6
Lilium 401
Limofella 704
Linaria 708—712
Linkia 1449
Linum 372
Litholpermum 214—216
Lolium 146—148
Lonicera 258
Lotus 857 858
Lychnis 526—529
Lycogala 1544
Lycoperdon 1532—1539
Lycophis 210 211
Lycopodium 1121 1121
Lycopus 30
Lyfimachia 221—223
Lythrum 466 467

Malva 781—784
Marchantia 1279 1280
Marrubium 674—676
Maschalocarpus 1157
Matricaria 947
Medicago 853—856
Melampyrum 696—700
Melica 97—100
Melittis 684
Mentha 648—656
Menyanthes 229
Mercurialis 1109 1110
Merulius 1646—1653

INDEX GENERUM.

401

145—548	Panicum 67—71
11—1219	Papaver 582—585
754—1757	Parietaria 190
464	Paris 261
7	Parnelia 1354—1409
1723	Parnassia 370
52 1563	Pastinaca 357
717 718	Pedicularis 715 716
104 205	Peltidea 1410—1412
376	Peplis 379
1071 1072	Peucedanum 332 333
192—1194	Peziza 1724—1745
1512 1513	Phalangium 399 400
14	Phalaris 77
6	Phallus 1591
2—604	Phascum 1141—1143
694 595	Phellandrium 343
341 342	Phleum 75 76
442	Phyllis 245
136	Phylarum 1549 1550
8 799	Phyteuma 260 261
n 908	Picris 902
1285—1291	Pilobolus 1528
lum 1140	Pimpinella 361—363
112 1013	Pinus 1083 1084
7—1011	Pisum 804
680	Plantago 182—186
lum 395—397	Poa 105—118
8 851	Polycnemum 56
6 689—693	Polyzala 790—791
11—803	Polygonum 451—459
lum 1188 —	Polypodium 1123—1125
1138	Polytrichum 1177—1183
3 524	Populus 1105—1108
827 828	Portulaca 779
	Potamogeton 195—203
	Potentilla 570—577
	Poterium 1076
	Prenanthes 867
	Primula 224—226

- Prunella 687 688
 Prunus 539—544
 Pteris 1135
 Puccinia 1575—1580
 Pulmonaria 217 218
 Pyrethrum 950—952
 Pyrola 468—472
 Pyrus 549—552

 Quercus 1079 1080

 Racodium 1751—1753
 Radiola 195
 Ranunculus 618—632
 Raphanus 738
 Releda 596 597
 Rhamnus 262 263
 Rhinanthus 695
 Rhizomorpha 1747 1748
 Ribes 273—277
 Riccia 1282 1284
 Rivularia 1446—1448
 Rosa 557—563
 Röstelia 1566
 Rubus 564—568
 Rumex 424—431

 Sagina 193 194
 Sagittaria 1075
 Salicornia 2
 Salix 1091—1102
 Salvia 31—33
 Sambucus 367—369
 Samolus 257
 Sanguisorba 165
 Sanicula 314
 Saponaria 477 478
 Saxifraga 474 475
 Scabiola 162—164
 Scandix 348 349

 Schoenus 51
 Scilla 398
 Scirpus 54—62
 Scleranthus 485 486
 Sclerotium 1525 1526
 Scorzonera 898—901
 Scrofularia 705 706
 Scutellaria 685 686
 Sedum 517—522
 Selinum 325—330
 Sempervivum 537
 Senecio 966—975
 Serratula 926
 Sefeli 355 356
 Sessleria 119
 Sherardia 166
 Sideritis 657
 Silene 491—495
 Sinapis 762—764
 Siltotrema 1684—1688
 Silymbrium 755—761
 Sium 337—340
 Solanum 243 244
 Solidago 962
 Sonchus 878—881
 Sparganium 1065 1066
 Spathularia 1719
 Spergula 535 536
 Sphaeria 1462—1511
 Sphaerobolus 1527
 Shaerophoron 1330
 Sphagnum 1144 1145
 Spiraea 553
 Splachnum 1151
 Spumaria 1561
 Stachys 668—672
 Statice 371
 Stellaria 496—501
 Stemonitis 1557
 Stilbospora 1512

INDEX GENERUM.

403

im 1746	Tulipa 402
87 88	Tulostoma 1529
hytūm 213	Turritis 747 748
ga 7	Tussilago 979 980
	Typha 1086 1087
cestāni' 944	Ulmus 310 311
onia 1281	Ulva 1443—1445
rium 640—644	Urceolaria 1311—1314
phis 1150	Uredo 1581—1587
cirum 605—608	Urtica 1068 1069
ephora 1693—1713	Usnea 1348—1350
otrema 1553	Utricularia 29
um 280	
pi 730—734	Vaccinium 446—448
icia 903	Valeriana 41 42
ius 682 683	Verbascum 230—235
592 593	Verbena 647
ldia 423	Veronica 8—27
entilla 556	Verrucaria 1322—1328
opogon 895—897	Viburnum 365 366
ella 1450—1462	Vicia 811—819
ia 1551—1554	Vinca 246
ostomum 1173 1174	Viola 266—272
italis 377	Viscum 1090
lium 829—848	
ochin 421 422	Xanthium 1088
cum 150—153	Xyloma 1514—1521
ius 617	
rcularia 1587 1588	Zannichellia 1025
dina 1564	

INDEX SYNONYMORUM.

ACROSTICHUM septentrionale *L.* 1131

ANCIDIUM cancellatum *Perf.* 1561

AGARICUS Cantharellus *L.* 1648

decipiens *Willd.* 1686

lividus *L.* 1594

muscarius *L.* 1598

ALSINE media *L.* 497

ANGELICA sylvestris *L.* 346

ANTHERICUM calyculatum *L.* 425

Liliago *L.* 400

ramosum *L.* 399

ANTIRRHINUM arvense *L.* 710

Elatine *L.* 708

Linaria *L.* 712

minus *L.* 711

spurium *L.* 709

APARGIA hirta *Schk.* 903

ARUNDO Calamagrostis *Leyfs.* 80

ASTRAGALUS montanus *L.* 828

pilosus *L.* 827

ATHAMANTA Cervaria *L.* 329

Oreoselinum *L.* 330

AVENA bulbosa *Willd.* } 103

elatio *L.*

BARBULA cirrhata *Brid.* 1154

BARTSIA Odontites *Smith* 702

BETULA Alnus *L.* 1070

BOLETUS Buglossum *flor. dan.* 1709

verlicolor *Perf.* 1687

BROMUS gracilis *Weig.* 150

pinnatus *flor. dan.* 150

pinnatus *L.* 151

sylvaticus *Hofst* 150

INDEX SYNONYMORUM.

405

- RYUM** capillaceum *Dickf.* 1176
 fissum *Leyfs.* 1261
 viridulum *Dickf.* 1158
- SSUS** antiquitatis *L.* 1751
 aurea *E.* 1431
 botryoides *L.* 1755
 candelaris *Leyfs.* 1372
 candida *L.* 1749
 cellaris *L.* 1752
 fruticulosa *flor. dan.* 1769
 incana *Leyfs.* 1408
 phosphorea *L.* 1760
 velutina *L.* 1430
- EDUUS** acaulis *L.* 921
 eriophorus *L.* 917
 lanceolatus *L.* 918
 palustris *L.* 915
 tuberosus *L.* 919
- AREX** uliginosa *L.* 59
- ARPOBOLUS** albicans *Michel.* 1527
- AUCALIS** *flor. dan.* 349
- BARA** gelatinosa *Weis.* 1440
- CRYSANTHEMUM** corymbosum *L.* 950
 inodorum *L.* 952
- ELIDONIUM** Glaucium *L.* 587
- STUS** alpestris *Crantz* 590
 ericoides *Cav.* 589
 Fumana *L.* 589
 Helianthemum *L.* 591
 marifolius *Wohl.*
 oelandicus *Roth*
 serpyllifolius *Roth* } 590
 vinealis *Willd.*
- LADONIA** *Hoffm.* v. **BAROMYCES**
- LATHERUS** denudatus *Bolt.* 1556
 fulvus *Bolt.* 1552
 stipitatus *Schmid.* 1547
- LAVARIA** digitata *Holmk.* 1465
 Hypoxylon *L.* 1464

INDEX SYNONYMORUM.

ACROSTICHUM septentrionale *L.* 1131

ACROSTICHUM cancellatum *Perf.* 1561

ACARICUS Cantharellus *L.* 1648

decipiens *Willd.* 1686

lividus *L.* 1594

muscarius *L.* 1598

ALANNE media *L.* 497

ANEMONE sylvestris *L.* 546

ANTHRACUM calyculatum *L.* 423

Liliago *L.* 400

ramosum *L.* 399

ANTIRRHINUM arvense *L.* 710

321 *Elatine* *L.* 708

Linaria *L.* 712

minus *L.* 711

spurium *L.* 709

APARGIA hirta *Schk.* 903

ARUNDO Calamagrostis *Leyfs.* 80

ASTRAGALUS montanus *L.* 828

pilosus *L.* 827

ATHAMANTA Cervaria *L.* 329

Oreoselinum *L.* 330

AVENA bulbosa *Willd.* } 103

elatior *L.* }

BARBULA cirrhata *Brid.* 1154

BARTSIA Odontites *Smith* 702

BETULA Alnus *L.* 1070

BOLETUS Buglossum *flor. dan.* 1709

vericolor *Perf.* 1687

BROMUS gracilis *Weig.* 150

pinnatus *flor. dan.* 150

pinnatus *L.* 151

sylvaticus *Hest* 150

fragile L. 1129
 Oreopteris L. 1126
 PTERIGYNANDRUM filiforme Hedw. 1157,

RHIZOMORPHA scutiformis Persf. 1565

SATYRIUM hircinum L. 1008
 SCANDIX Cerefolium L. 350
 SCHÖNUS compressus L. 59
 SCLEROTIUM Erysiphe Persf. 1762
 SERAPIAS v. EPIPACTIS.
 SERRATULA arvensis L. 920
 SESELI dubium Schk. 328
 SORBUS Aucuparia L. 552
 SPARTIUM Scoparium L. 792
 SPHARRIA foliacea Bolt. 1329
 inquinans Persf. 1513
 miniata Bolt. 1592
 nitida Weig. 1327
 pertusa Bolt. 1353

SWARTZIA capillacea Hedw. 1176

TRUCERIUM Chamaepitys L. 639
 TORDYLIUM Anthriscus L. 323
 TORTULA Hedw. 1186 1187
 TREMELLA clavariaeformis Wulff. 1578
 globulosa Hedw. 1448
 juniperina Leyss. 1578
 lichenoides Leyss. 1393
 Nostoc L. 1449
 purpurea Leyss. 1592
 verrucosa Leyss. 1448

TRENTEPORLLIA Hoffm. 1208
 TRICHIA gregaria flor. dan. 1550
 TRICHOSTOMUM capillaceum Turn. 1176
 TUBULIFERA Ceratum flor. dan. 1569

UMBILICARIA Hoffm. v. GYROPHORA.
 URDO linearis Persf. 1574

- COCHLEARIA** *Coronopus* L. 720
 Draba *Leyf.* 731
COLLEMA *Hoffm.* 1393—1398
CONFERRA *hypnoides* *flor. dan.* 1263
CORROPSIS *Bidens* L. 930
CRATAEGUS *monogyna* L. 546
 oxyacantha L. 543
 torminalis L. 551
CUCUBALUS *bacciferus* L. 491
CYNANTODIUM *capillaceum* *Hedw.* 1176
CYNOSURUS *coeruleus* L. 119
 durus L. 118

DEMATIUM *antennatum* *Hofm.* 1757
 aureum *Perf.* 1432

ELYMUS *caninus* L. 153
EMBOLUS *pertusus* *Batsch* 1557
 sepulchralis *Batsch* 1515
ENCALYPTA *lanceolata* *Hedw.* 1155
ERVUM *monanthos* L. 805

FESTUCA *decumbens* L. 117
 fluitans L. 106
FILAGO *arvensis* L. 943
 montana L. 942
 germanica L. 941
FISSIDENS *bryoides* *Hedw.* 1159
 exilis *Hedw.* 1158
 pulvinatus *Hedw.* 1162
 sciuroides *Hedw.* 1165
 strumifer *Hedw.* 1172
 taxifolius *Hedw.* 1160
FRAGARIA *sterilis* L. 578

GALEOBDOLO *luteum* *Smith.* 679
GALEOPSIS *Galeobdolon* L. 679
GENTIANA *Centaureum* L. 236 237
GERANIUM *chaerophyllum* *Roth.* 765
 cicutarium L. 766
GRIMMIA *striata* *Leyf.* 1188

- EDWIGIA** ciliata *Hedw.* 1149
EDYPSOIS autumnalis *Smith* 893
 hirta *Smith* 903
ELONIAS borealis *Willd.* 423
ELVELLA aurea *Bolt.* 1726
ERITERIA anthericoides *Schrank* 423
YDNUM candidum *Willd.* 1688
 decipiens *L.* 1686
EPNUM asplenoides *Dicks.* 1159
 dendroides *L.* 1195
 filiforme *L.* 1157
 serpens *Leyfs.* 1201
ROSERIS minima *L.* 865
ESTERIUM abietinum *Perf.* 1288

CIDEA rosella *Achar.* 1598
ERSIA cirrhata *Leyfs.* 1154
 extinctoria *Leyfs.* 1152
 lanceolata *Hedw.* 1155
ONTODON autumnale *L.* 893
 hirtum *L.* 903
 hispidum *L.* 894
FRARIA botryoides *Achar.* 1753
 rubens *Achar.* 1756
CHEN atratus *Hedw.* 1739
 centrifugus *Leyfs.* 1383
 chlorophyllus *Humb.* 1415B
 miniatus *L.* 1329
 radiciformis *Leyfs.* 1748
 rubens *Hoffm.* 1756
 scriptus *L.* 1522
 setosus *L.* 1565
 viridis *Schreb.* 1755
NUM Radiola *L.* 195
COPERDON Bovista *L.* 1530 1531
 cancellatum *flor. dan.* 1566
 Carpobolus *flor. dan.* 1527
 cornutum *flor. dan.* 1567
 Epidendrum *L.* 1544
 favogineum *Baerh* 1554

INDEX SYNONYMORUM.

globosum *Bolt.* 1531
 pedunculatum *L.* 1529
 stellatum *L.* 1542 1543
 vesparium *Batsch* 1551

MATRICARIA Parthenium *L.* 951

NERISMA foetidum *Perf.* 1714

MINIUM fontanum *L.* 1205

MUCOR Erythraeus *Leyf.* 1762

furfuraceus *L.* 1318

glaucus *L.* 1727

lepticus *L.* 1546

urceolatus *Bolt.* 1528

MYAGRUM lativum *L.* 721

NARTHECIUM iridifolium *Vill.* 423

OCTOSPORA *Hedw.* v. PREIZA.

OPHIOGRAPHIA epiphega }
 macularis } *Achar* 1524

OPHRYS Corallorrhiza *L.* 1022

Nidus avis *L.* 1020

ovata *L.* 1021

spiralis *L.* 1014

ORCHIS abortiva *Leyf.* 692

OSMUNDA Lunaria *L.* 1139

Spicant *L.* 1137

OXYCOCCUS palustris *Perf.* 458

PREIZA Auricula *L.* 1457

cornucopioides *Hor. dan.* 1648

lentifera *L.* 1588 1589

PHALARIS arundinacea *L.* 145

PHALLUS esculentus 1723

POA cristata *Leyf.* 90

POHLIA elongata *Hedw.* 1212

POLYPODIUM cristatum *L.* 1128

Filix femina *L.* 1130

Filix mas *L.* 1127

PLANTARUM RARIORUM TEMPORA ET LOCA.

Martio et Aprili.

- In rupibus ad Cröllwitz. *Targionia hypophyllas*.
 — nemusculo ad Seeben. *Marchantia conica*.
 — rivulis ad Bölberg. *Chrysosplenium oppositifolium*.
 — der Heide. *Fumaria sabacea*, *Halleri*.
 — vineis ad Bennstädt. *Sesleria coerulea*.
 — nemoribus humidis ad Schkeuditz et ad Schraplau. *Leucoium vernalis*.
 — palude ad Schmon. *Eriophorum vaginatum*.
 — montosis ad Leimbach. *Gentiana acaulis*.
 — sylvaticis ad Lodersleben. *Oxalis Acetosella*.
 — Bitterfeld. *Ribes nigrum*.

Maio.

- Auf dem Pfännerholzplatz. *Poa dura*.
 In rupibus ad Cröllwitz et Giebichenstein. *Draba muralis*. *Androsace elongata*.
 — nemusculo der Rabeninsel. *Cardamine amara*.
 — inundatis auf dem Dölauer Wege. *Montia fontana*.
 — campis sabulosis bei der Heide. *Spergula pentandra*.
 — pratis ad Seeben. *Eriophorum angustifolium*.
 — fossis ad Dieskau. *Carex Pseudo-Cyperus*.
 — palude Lieskau. *Salix repens*, *fusca*.
 — collibus calcareis ad Bennstädt, Kölm. *Hippocrepis comosa*. *Cineraria campestris*. *Thlaspi perfoliatum*.
 — agris ad Hohenthurm. *Veronica acinifolia*.
 — Wansleben, Gutenberg. *Veronica praecox*.

1. in toribus ad Erdeborn, Hornburg. *Cypripedium Calceolus*. *Tulipa sylvestris*. *Lathraea uamaria*. *Actaea spicata*. *Trientalis europaea*.
 2. is ad Lodersleben et Schmon. *Orchis palustris*. *Pyrus torminalis*. *Sambucus racemosa*.
 3. lix pentandra.
 4. e nemoroso ad Schochwitz. *Comarum frarioides*.

Iunio.

- In locis vadosis ad Bartha Weinberg. *Ranunculus reptans*.
 -- prato ad Nietleben. *Leontodon lividus*.
 Ad Giebichenstein. *Trifolium scabrum*. *Sisymbrium Löselii*.
 -- s fabulosis pons Kröllwitz. *Trifolium*
 1. *Carex elongata*, *Buxbaumii*. *Potamogeton amarus*.
 -- as Zorge et Lindberg. *Galium glaucum*. *Viola mirabilis*. *Mercurialis perennis*.
 -- nemoribus ad Gutenberg. *Ophrys myodes*.
 -- pratis ad Gutenberg. *Carex Davalliana*, *spicata*.
 -- Mittelholz. *Silene Armeria*. *Iuncus spadiceus*.
 -- der Abatissine. *Melittis Melissophyllum*.
 -- pratis ad Dölau. *Orchis coriophora*.
 -- palude ad Lieskau. *Carex paradoxa*.
 -- Dieskau. *Carex paniculata*.
 -- pratis ad Döllnitz et Liebenau. *Carex brizoides*. *Iris sibirica*. *Gladiolus communis*.
 -- *Cardamine Impatiens*, *hirsuta*. *Euphorbia amygdaloides*.
 -- campis fabulosis ad Merseburg. *Astragalus arenarius*.
 -- vineis ad Bennstädt. *Poa alpina*. *Galium scabrum*. *Rosa rubiginosa*.
 -- collibus calcareis ad Kölme. *Helianthemum Fumana*, *vineale*. *Hieracium florentinum*.

- 1 Querfurt. *Iris pumila*. *Thlaspi alpestre*.
- memoribus ad Erdeborn. *Poa sudetica*, *trinnervata*. *Melica uniflora*. *Iris sibirica*. *Orchis fusca*, *variegata*. *Rosa spinosissima*.
- agris ad Hornburg et Eisleben. *Arenaria cerna*. *Sisymbrium lrio*.
- pratis bei Rothenburg. *Ranunculus hirsutus*.
- sylvis ad Lodersleben. *Festuca sylvatica*. *Spiraea Aruncus*. *Rubus saxatilis*. *Epipactis Nidus avis*. *Cymbidium Corallorrhiza*.
- agris ad Mueheln. *Adonis aestivalis*.
- Hackenholz bei Branderode. *Tragopogon porrifolius*.
- collibus sabuloso - calcareis ad ripas der Unstrut. *Bupleurum longifolium*. *Astrantia maxima*. *Athamanta Libanotis*. *Isatis tinctoria*. *Sinapis nigra*.
- prato ad Benndorf et in sylva Sprödenli. *Artemisia montana*.
- memoribus paludosis ad Bitterfeld. *Comarum palustre*. *Genista sagittalis*.

Iunio et Iulio.

- ad ripas Salae. *Potentilla supina*.
- collibus ad Kröllwitz. *Trifolium strictum*.
- montosis, siccis. *Trifolium spadiceum*, *filiforme*.
- nemore, Mittelholz. *Scorzonera rosea*. *Orchis banche maior*.
- aquis stagnantibus ad Schkopa. *Nymphaea alba*.
- ————— Kölme. *Scirpus pauciflorus*.
- vineis ad Kölme et Müllerdorf. *Brassica orientalis*. *Plantago Wulffenii*.
- dumetis ad Wettin. *Rosa alba*.
- pratis ad Liebenau. *Euphorbia dulcis*. *Thalictrum angustifolium*.
- collibus ad Rolsdorf, Erdeborn. *Oxytropis pilosa*.

414 PLANTARUM RARIORUM

- In collibus ad Karsdorf. *Oxytropis montana*.
 — Schmon. *Prenanthes muralis*. *Scorzonera humilis*.
 — nemore Reulsen bei Möncherode. *Ophrys arachnites*.
 sepibus ad Trebnitz. *Lactuca virosa*, *saligna*.
 collibus ad Trebnitz. *Orchis ustulata*.
 — palude ad Löberbach. *Vaccinium Oxycoccus*.
 Ad lacum fallun. *Sedum Cepaea*.

Iulio.

- In pratis ad Passendorf. *Trifolium dentatum*.
 — dumetis pone Kröllwitz. *Campanula bononiensis*.
 — ruderalis ad Zscherben. *Verbascum pulverulentum*.
 — Nitleben. *Orchis palustris*.
 — Nitleben. *Astragalus*.
 — Vicia *castubica*.
 — nemore Zorgs. *Malva Alcea*. *Aira flexuosa*.
 Im Trothaischen Werder. *Malva moschata*.
 In pratis humidis ad Bennstädt. *Bromus erectus*.
 ad Seeben. *Hieracium paludosum*; ad Neukirchen, *Teucrium Scordium*; ad Radewell, *Gratiola officinalis*. *Polygonum minus*.
 — palude Lieskavienli. *Iuncus subverticillatus*.
 Ad stagna Dieskau. *Selinum palustre*. *Scirpus setaceus*, *caespitosus*, *acicularis*.
 In aquis lente fluentibus ad Kollenbey et Schkopa. *Senecio paludosus*. *Myriophyllum verticillatum*.
 — nemoribus pone Gutenberg. *Teucrium Scrodonia*. *Laserpitium latifolium*. *Aiuga pyramidalis*. *Dianthus plumarius*. *Agrostis arundinacea*. *Veronica foliosa*.
 Ad Löbejün. *Imperatoria Ostruthium*.
 In arvis arenosis ad Westewitz. *Gnaphalium leuco-album*; ad Wettin, *Nigella damascena*.

- ad lacus salfos. *Arénaria marina*. *Samolus Valerandi*.
 in collibus herbidis ad Alsleben. *Hieracium praemorsum*.
 — nemusculo prope Fienstädt. *Aconitum Lycoctonum*.
 — Sala prope Trebnitz. *Cicuta virosa*.
 — pratis ibidem. *Oenanthe peucedanifolia*.
 — collibus calcareis Mansfeldiae. *Salvia sylvestris*. *Climatis Vitalba*. *Teucrium montanum*. *Hypericum Kohlianum*. *Thrinicia hirta*. *Seseli Hippomarathrum*.
 ad Seeburg. *Orobanche coerulea*.
 — Erdeborn. *Marrubium peregrinum*, *creticum*.
Leonurus Marrubiasrum. *Orobanche elatior*.
 in Schmon. *Pyrola umbellata*, *uniflora*. *Sonchus alpinus*. *Centaurea montana*. *Epipactis pallens*. *Iuncus subverticillatus*.
 — Lodersleben. *Vicia dumetorum*, *sylvatica*.
 in agris ad Schraplau. *Teucrium Botrys*. *Gentiana Cruciata*.
 Ad montem Ierenum. *Cnicus eriophorus*.
 Inter segetes ad Mückeln et Lützen. *Iberis amara*.
 in sylvis ad Ebersrode. *Lathyrus sylvestris*.
 — collibus ad ripas der Unstrut. *Coronilla coronata*.
 Ad Holzweißig. *Silene baccifera*; ad Hornburg, *Sideritis montana*.
 in palude ad Benndorf. *Tofieldia palustris*.
Drosera intermedia. *Gentiana Pneumonanthe*.

Augusto.

- In pratis ad Schleuse. *Cyperus flavescens*, *fuscus*.
 — colle herbido prope Lettin. *Carduus cyanoides*.
 — agris sabulosis prope Lettin. *Galeopsis grandiflora*.

415 PLANT. RAR. TEMP. ET LOCA.

In monte patibuli ad Giebachenstein. *Campanula barbata*.

Ad ripas Salae. *Elatine Hydropiper*.

In pratis ad Nietleben. *Atriplex tatarica*. *Senecio tenuifolius*.

— pratis ad Liebenau. *Lathyrus palustris*.

— versuris prope der Heide. *Centaurea solstitialis*.

— palude ad Lieskau. *Alisma ranunculoides*.

— nemore, Mittelholz. *Veronica spuria*. *Aconitum neomontanum*.

— collibus calcareis Mansfeld. *Euphrasia lutea*. *Aster Amellus*. Freiburg. *Caucalis latifolia*. *Coryza squarrosa*. Prope Wallbed.

Glaucium luteum.

— pratis salis ad Kölme et Rolsdorf. *Chironia pulchella*, *inaperta*. *Tragopogon maior*.

— pratis ad Karsdorf. *Gentiana uliginosa*.

In Gotthardsteich bei Merleburg. *Alisma natans*.

In fossis ad Holzweißig et Bitterfeld. *Stellaria glauca*. *Senecio aquaticus*.

— sylva ad Lodersleben. *Carduus defloratus*. *Neottia spiralis*.

Ad Schmon. *Cineraria cordifolia*.

— Erdeborn. *Salvia nemorosa*.

Septembri.

In Pratis siccioribus ad Gerbstädt. *Gentiana Amarella*.

Octobri.

In vinea ad Rolsdorf. *Artemisia salina*.

OMISSA.

Ad

1. 380. *Leucium vernum*, frequens ad Schraplau.
 2. 1280. *Marchantia conica*, vere 1806 copiose fructifera in nemusculo Seebensi.

1. 1323.

- * 1770. *VERRUCARIA LEUCOCEPHALA*, crusta effusa tenui cinerea, tuberculis confertis prominentibus albo-pruinosis.

In cortice ulmorum annosarum in der sächsischen Lucke.

1. 1332.

- * 1771. *BAROMYCES PAPILLARIA*, crusta effusa granulata exalbida, podetiis brevissimis ventricosis fistulosis subsimplicibus glabris albidis, cephalodiis terminalibus minutis badiis. *Lichen madreporiformis Wulff. Jacqu. coll. 3. t. 3. f. 2. (sed podetia magis divisa, quam apud nos occurrunt.)*

In argilla sterili, e porphyrite orta, unico loco am Abhange des Bischofsberge, cum Hypno rugoso.

2. 1354.

- * 1772. *PARMELIA SOPHODES*, crusta suborbiculari granulata cinereo-virente, scutellis planis confertis nigris, margine tumidulo crustae concolori.

Ad truncos salicum annosarum, im Zwinger hinter der Schulkirche.

III. 1380.

- * 1773. *PARMELIA LEPTALEA*, thallo cinereo subtus albedo nigro-fibrilloso, laciniis linearibus multifidis ciliatis, scutellis nigris, margine subcrenulato albedo.

In saxis nostris.

Ad
n. 1412.

* 1774. PELTIDEA POLYDACTELA, thallo coriaces
expansio viridi subtus venoso fulco-fibrillo-
so, lobulis elongatis attenuatis, peltis an-
ticis oblongis fulcis. *Hofm. pl. lichen.*
t. 4, f. 1. *Sturm. II, 3.*

In rupibus ad Kröllwitz.

n. 1421.

* 1775. CONFERVA PECTINALIS, filamentis simpli-
cibus tenuissimis spurie geniculatis, confer-
tim striatis, articulis utrinque globuliferis.
Müller nov. act. petrop. vol. 3. t. 1.
f. 4—7. *Dillw. t. 24.*

In Sala fluvio ad ligna. — Nec C. fontinalis
nec C. bronchialis varietas; peculiaris certe
species.

n. 1422. *Conserva frigida*, vere 1806 copiose in
umbrosis horti botanici.

n. 1436.

* 1776. CONFERVA GENUFLEXA, filamentis viri-
dibus simplicibus aequalibus, demum ge-
nuflexis, articulis cylindricis, granulis ma-
culam irregularem linearem formantibus.
Dillw. t. 6.

Cum C. quinina et decimina satis frequens.

* 1777. CONFERVA BIPUNCTATA, filamentis hyali-
nis angustissimis simplicibus rectis genicula-
tis, articulis granulorum maculam subradia-
tam duplicem continentibus. *Vauch.*
b. 7. f. 2, 4. (opt.) *Dillw. t. 2.*

In aquis seignibus cum C. quinina, primo
adspectu distinguenda, quum semper fila sint
multo angustiora.

n. 1501.

* 1778. SPHAERIA EPISPHAERIA, sparsa pallida
parasitica, sphaerulis minutissimis subcom-

ad

501.

pressis cristatis flaccidis. *Tode fung. meckl. t. II. f. 89.*

In Sphaeria Stigmati et spermoide.

1511. *Sphaeria Gnomon Todii* (t. 16. f. 125.) omnino differt a *Sph. tubaeformis*. Illa apud nos in caulibus aridis Chaerophylli bulbosi, tota atra, semper collapsa. *Sph. tubaeformis* vero in foliis aridis, cum epidermide adsurgens, ochracea, quandoque collapsa.

- * 1779. SPHAERIA PULCHELLA, circinnata nuda, ostioliis longissimis flexuosis.

Inter corticem et liberum prunorum.

- * 1780. SPHAERIA POMIFORMIS, gregaria minuta atra, sphaerulis pomiformibus subrugulosis, ostiolo papillaeformi. *Perf. ic. pict. t. 5. f. 4. 5.*

In ramis aridis.

1557.

- * 1781. STEMONITIS OVATA, capillitio laxo subrotundo, stylidio ad medium fere penetrante.

Ad putrescentes truncos.

N. *Stemonitis elongata Willd. in Usteri's Mag. 4. t. 3. f. 10.* est hybernaculum insectorum.

1559.

- * 1782. LYCEA PSAMMITICA, sparsa, peridio albedo inciso, pulvere fusco. n. sp.

In psammite fatiscente martiali pone Nietleben.

- * 1574. *Accidium columnare*. Varietas huius in foliis Asclepiadis Vincetoxici occurrit.

Ad

n. 1645.

- * 1783. *AGARICUS TEPHROMELAS*, acaulis resupinatus ater, lamellis crassis cinereis. n. sp.

In truncis pinuum putrescentibus. Elegans fungillus lineolam latus, semel a me in der Heide lectus.

n. 1666.

- * 1784. *BOLETUS MOLLIS*, caespitosus mollis rugosus incarnato-pallidus, poris subflexuosis albidioribus.

In truncis pinuum,

n. 1737.

- * 1785. *PEZIZA ATOMARIA*, gregaria hemisphaerica glabra sessilis pallida minutissima n. sp.

Ad truncos abietum.

n. 1751.

- * *Racodium rupestre*, ex aqua de rupibus stillante et in gelatinam abeunte miro modo oritur. Dum senio exaruit, obtegitur gelatina lactea, sporulis pellucidis ovalibus condita; quae posset novam constituere *Scilbosperam parasiticam*?

n. 1756.

- * 1786. *MONILIA AUREA*, caespitosa aurea.


In ligno putrescenti. Media inter Confervam et Moniliam.

n. 1761.

- * 1787. *DEMATIUM CILIARE*, sparsum atrum erumpens, filis confertis subbulbosis simplicibus filiformibus.

In ramis siccis. Mentitur Sphaeriam ostioliis longissimis, sed fila multo molliora, quam solent ostiola Sphaeriarum esse.

Tab. I.



1. *Veronica spuria.*
 2. *foliosa.*
 3. *longifolia.*

J. Sturm fec.


Tab. II.



Seseli venosum Hoffm.
subvar. Schk.

J. Sturm fec.





1. *Euphorbia Gerardiana*.

2. *Euphorbia Esula*.

J. Sturm fec.



Tab. IV.



Euphorbia amygdaloides.

J. Sturm fsc.



Helianthemum vineale.

J. Sturm sc.

1. The first part of the paper is a review of the literature on the effects of the 1997 Asian financial crisis on the economies of the Asian countries. The second part of the paper is a review of the literature on the effects of the 1997 Asian financial crisis on the economies of the Asian countries.

2. The first part of the paper is a review of the literature on the effects of the 1997 Asian financial crisis on the economies of the Asian countries. The second part of the paper is a review of the literature on the effects of the 1997 Asian financial crisis on the economies of the Asian countries.

3. The first part of the paper is a review of the literature on the effects of the 1997 Asian financial crisis on the economies of the Asian countries. The second part of the paper is a review of the literature on the effects of the 1997 Asian financial crisis on the economies of the Asian countries.

4. The first part of the paper is a review of the literature on the effects of the 1997 Asian financial crisis on the economies of the Asian countries. The second part of the paper is a review of the literature on the effects of the 1997 Asian financial crisis on the economies of the Asian countries.

Tab. VI.



1. *Marrubium peregrinum.*
2. *Marrubium creticum.*

J. Sturm fec.

Tab. VII.



Vicia dumetorum.

Jas. Sturm pinx. et sc.





1. *Oxytropis montana*.

2. *Jungermannia dolaniensis*.

J. Sturm fec.



Tab. IX.



Hypericum kohlii.

J. Sturm fec.





1. *Hieracium florentinum.*
2. *cymosum.*

J. Sturm fec.






Carduus cyanoides.

Carduus mollis.

J. Saurm fec.





Artemisia salina.

J. Sturm fec.



CURTH SPRENGEL

MANTISSA PRIMA

FLORAE HALENSIS,

ADDITA

NOVARUM PLANTARUM

CENTURIA.

HALAE

APUD C. KÜMMELIUM,

1807.

EDITION SECONDE

ANTHESIA PRIMA

TOURNAI HALLANDIS

1851

MUSARUM PLANTARUM

EDITION


THE
LIBRARY
OF THE
MUSEUM
OF
COMPARATIVE ZOOLOGY
AND ANATOMY
HARVARD UNIVERSITY
CAMBRIDGE, MASS.

OBSERVATIONES

BOTANICAE

IN

FLORAM HALENSEM.




OBSERVATIONES

BOTANICAE

IN

FLORAM HALENSEM.



dia palustri et Gentiana Pneumonanthe. Optime autem sic definitur: Sch. *culmo tereti nudo, spiculis subgeminis, involucri valvula altera spiculas aequante*. Differentiam inter Sch. ferrugineum et nigricantem, cum quo saepius commutatur, *Linnaeus* primus (*flor. suec. 2. n. 40.*) hanc statuit: ferrugineum sexies fere breviorum esse et graciliorem: spicas solummodo geminas, quum Sch. nigricans habeat ad sex usque spiculas: involucri valvulam alteram esse longissimam, spiculas solummodo aequantem, non excedentem. His addidit *Schraderus* (*flor. germ. 1. p. 115.*); setis obvallatum esse semen in Sch. ferrugineo, destitutum autem in Sch. nigricante. Totus omnino habitus diversissimus est. Sesquipedalis est nigricans, foliis digitalibus: vix pedalis Sch. ferrugineus, foliis uncialibus: spiculae illius aggregatae crassiores, huius binae solummodo et graciliores: valva involucri in illo longissima, in hoc involucrium aequans.

- i. *Panicum verticillatum, glaucum et viride*, a *Linnaeo* eiusque sectatoribus non optime distinguuntur. Spica enim verticillata, quae *P. verticillatum* insignire dicitur, lubinde etiam in *P. viridi* adest. Involucella in omnibus modo uniflora, modo bi-, modo triflora. Nil itaque superest, nisi ad setarum, quae involucrium faciunt, indolem respicere. Setae enim deorsum hispidae in *P. verticillato*, sursum in glauco et viridi. Utrumque ultimum differt seminibus, quae in glauco transversim undulato-rugosa, in viridi vero nervosa sunt. (*Schrader. flor. germ. 1. p. 241.*)
2. *Phleum nodosum* nil nisi varietas *Phl. pratensis*, a quo differt solummodo culmis humilioribus adscendentibus, racemo spicato breviori. Bulbi ceteroquin culmo inferne adnati etiam in *Phl. pratensi* occurrunt; solum amat. siccius, ad

nemorum margines, in collibus apricis provenit: quum Phl. pratense sola pascua humida praeferat.

7. *Phalaris phleoides*, est, monente *Wibeli* (*flor. werthem. p. 125.*), *Phleum Bükmeri*, quum glumae sint truncatae mucronulatae. *Bükmerus* id primus (*flor. lips. n. 602.*) huic generi adiudicavit, sequente *Kölero* (*gram. europ. p. 52.*).
8. *Agrostis comoreffa* est varietas *A. albae*, quae a *vulgari* differt ligula oblonga, quae truncata est in *A. vulgari*. Aristula, quae infra apicem glumae internae obscura est, nullo modo differentiam speciei constituere potest.
9. *Agrostis stolonifera* ad eandem pertinet *A. albam*, a qua nullo modo differt.
10. *Holcus mollis* verus nusquam in flora halensi existat. In ipsis enim nemusculis ad Löbejün, ubi indicatur, nil nisi *H. lanatum* invenimus. Arista est semper brevissima incurva, glumam vix excedens, quum in *H. molli* multo longior et geniculata esse debeat.
- * 11. *HOLCUS AVENACEUS*, radice nodosa tuberosa, qui in nemusculis *Mittel-* et *Rockenholz* provenit, est vera species: *H. bulbosus Schrad.* Namque culmi genicula villosa in hoc, glabra in *H. avenaceo*, radix bulbifera in hoc, nodosa duntaxat in *H. avenaceo*. Gramen nodosum *lo. Bauhini* (*hist. 2. p. 456.*) quod ad saltuum margines et in agris siccioribus inveniri dicitur, omnino idem videtur. Huc etiam pertinet, licet male expressum, *Morisoni* gramen avenaceum elatius, radice tuberculosa (*hist. tom. 3. sect. 3. tab. 7. f. 38.*).
- * 12. *POA SEROTINA*, quam *Leysserus* et alii *Poa palustrem* habent, alii vero cum *P. pratensi* commutarunt, *Schradero* monente, omnino diversa est. *Poa palustris* Linn. vere non

exstat, sed eadem est cum *Leersia oryzoide*. A pratenſi autem differt ſerotina, culmo vaginisque ſcabris, quae glabræ ſunt in *P. pratenſi*, deinde ſpiculis lanceolatis, quae oblongo-ovatae ſunt in *P. pratenſi*: denique panicula ramiſſiſſima multo altiore, quae minus ramoſa in *P. pratenſi*. Floret a Iulio ad Septembrem, quum *P. pratenſis* a Maio ad Iulium reperiatur.

13. *Poa trinervata* eadem eſt ac *Festuca ſylvatica*.

14. *Festuca heterophylla* et *duriuscula*, quas *Schraderus* coniungit, omnino differunt. Illa enim habet folia radicalia triquetra pubeſcentia, haec filiformia glabra: illa paniculam ſubaequalem rariusculam, haec paniculam nuntantem ſecundam: illa glumas patulas, haec glumas contractas appreſſas.

In nemoribus noſtris, ubi utraque adest, optime differentiam diiudicare poſſumus.

15. *Galium ſpurium*, non eſt, ſed potius *G. uliginosum*.

Provenit autem copioſe ad nemorum margines pone Gutenberg.

16. *Parietaria officinalis* involucrum habet non ſeptemfidum triſlorum, ſed diphyllum.

* 17. *LYSIMACHIA THYRSIFLORA*, racemis lateralibus pedunculatis, caule ſimplici, foliis linearilanceolatis oppoſitis. *Fl. dan.* 517. *Engl. bot.* 176.

In ſoſſis ad Löberbach, hinter der Benndorfer Mühle, primum inventa a *Schwägrichen* nro III.

18. *Selinum ſylveſtre* omnino adest in flora halenſi, nempe im *Loderſlebenſchen Forſte bei den Teichen*, ubi creſcit non exigua copia. *Selinum paluſtri ſimillimum*, differt tamen caulibus numeroliſis ex una radice prodeuntibus,

nemorum margines, in collibus apricis provenit: quum Phl. pratense sola pascua humida praeferat.

7. *Phalaris phleoides*, est, monente *Wibelio* (*flor. werthem. p. 125.*), *Phleum Böhmeri*, quum glumae sint truncatae mucronulatae. *Böhmerus* id primus (*flor. lips. n. 603.*) huic generi adjudicavit, sequente *Köler* (*gram. europ. p. 52.*).
8. *Agrostis compressa* est varietas *A. albae*, quae a *vulgari* differt ligula oblonga, quae truncata est in *A. vulgari*. Aristula, quae infra apicem glumae internae obscura est, nullo modo differentiam specilioam constituere potest.
9. *Agrostis scolonifera* ad eandem pertinet *A. albam*, a qua nullo modo differt.
10. *Holcus mollis* verus nusquam in flora halensi existat. In ipsis enim nemusculis ad Löbejün, ubi indicatur, nil nisi *H. lanatum* invenimus. Arista est semper brevissima incurva, glumam vix excedens, quum in *H. molli* multo longior et geniculata esse debeat.
- * 11. *HOLCUS AVENACEUS*, radice nodosa tuberosa, qui in nemusculis *Mittel-* et *Rockenholz* provenit, est vera species: *H. bulbosus Schröd.* Namque culmi genicula villosa in hoc, glabra in *H. avenaceo*, radix bulbifera in hoc, nodosa dumtaxat in *H. avenaceo*. Gramen nodosum *la. Bauhini* (*hist. 2. p. 456.*) quod ad saltum margines et in agris siccioribus inveniri dicitur, omnino idem videtur. Huc etiam pertinet, licet male expressum, *Morisoni* gramen *avenaceum* elatius, radice tuberculosa (*hist. tam. sect. 8. tab. 7. f. 38.*).

* 12. *Holcus*, quum *Schröd.* *bulbosus* *la. Bauhini*

exstat, sed eadem est cum *Leersia oryzoides*. A *pratenis* autem differt serotina, culmo vaginisque scabris, quae glabrâ sunt in *P. pratenis*, deinde spiculis lanceolatis, quae oblongo-ovatae sunt in *P. pratenis*: denique panicula ramosissima multo altiore, quae minus ramosa in *P. pratenis*. Floret a Iulio ad Septembrem, quum *P. pratenis* a Maio ad Iulium reperitur.

13. *Poa trinervata* eadem est ac *Festuca sylvatica*.

14. *Festuca heterophylla* et *duriuscula*, quas Schraderus coniungit, omnino differunt. Illa enim habet folia radicalia triquetra pubescentia, haec filiformia glabra: illa paniculam subaequalem rariusculam, haec paniculam nutantem secundam: illa glumas patulas, haec glumas contractas appressas.

In nemoribus nostris, ubi utraque adest, *optime*
differentiam diiudicare possumus.

15. *Galium spurium*, non est, sed potius *G. uliginosum*.

Provenit autem copiose ad nemorum *margines*
pone Gutenberg.

16. *Parietaria officinalis* involucrium habet non septemfidum triflorum, sed diphyllum.

- * 17. *LYSIMACHIA THYRSIFLORA*, racemis lateralibus pedunculatis, caule simplici, foliis linear-lanceolatis oppositis. Fl. dan. 517. Engl. bot. 176.

In fossile a. b. 1. v. der Beandorfer
Mühle. druckliche
n. 10. III.

- 18 - 110
- hora ha-
sente dei
qua copia.
amen cau-
dentibus.
- tos,
a L.

quum illud caulem habeat solitarium; involucri universalis foliolis margine membranaceis, quum foliola *S. palustris* sint angustissima. Utrumque crescit ad orgyalem staturam.

19. *Laserpitium pruthenicum*, in pratis et paludibus sylvaticis copiosum, pilis orbatum, totum glabrum ut facile decipere possit. Ita in prato paludoso ad pinetum *Sandersdorf* bei Bitterfeld copiose occurrit cum *Arnica montana*, atque pro *Athamanta Libanotide* haberi potest, nisi foliorum forma alia fuerit: nulla enim foliorum decussatio, neque laciniae ovatae sed lanceolatae aut lineares.
20. *Cicuta virosa* copiose im Löberbach bei *Pau-pitzsch an der Mühle*, unicus fere locus, ubi certo invenienda.
21. *Allium angulosum*. in pratis ad Wörmnitz et Osendorf satis copiosum, omnino idem est cum *A. petraeo umbellifero* *I. Bauhin. hist. 2. p. 564.*
22. *Iuncus subverticillatus* habet culmum non procumbentem sed luberectum. Bene ceteroquin delineatur a *Morisonio vol. 3. sect. 8. tab. 9. fig. 3.*
Crescit ad paludem Dölaviensem.
23. *Epilobium parviflorum* caulem habet non lanatum, sed pubescentem.
24. *Acer Pseudoplatanus*, folia habet non inaequaliter ferrata, sed dentata, subtus pubescentia.
25. *Monotropa Hypopitys*, satis copiose in der *Dölauer Heide rechts vom Wege*, sub pinibus provenit.
- * 26. *TORMENTILLA REPTANS*, monente *Schwü-grickenio*, in nemoribus asperis omnino adest, facile dignoscenda caule repente foliisque petiolatis.

27. *Comarum fragarioides*, optime describitur a Io. Bauhino hist. 2. p. 395. Folia habet sub-
tus sericea, petala calyce maiora.

Crescit in aggere fossae vor der Breyhans-
schenke.

28. *Comarum palustre*, copiose crescit in paludi-
bus ad Sandersdorf et Benndorf, sed ob foe-
niscium aegerime florens invenitur.

29. *Helianthemum vineale*, sine dubio idem est cum
H. marifolio. Licet enim Willdenovius
diversissimum utrumque habeat, nullae tamen
certae adsunt differentiae, neque Cistum ma-
rifolium ipse vivum vidisse fatetur. Caulis
procumbens divaricatus, folia ovato-oblon-
ga petiolata pilosa subtus tomentosa in utro-
que. Figura Cavan. icon. 2. tab. 143.
paullo elegantior natura: melior est Barre-
lieri tab. 441. quae optime exprimit speciem
in vineis Kölmensibus obviam.

30. *Aconitum nemorosum*, haudquaquam ad Ker-
titz prope Delitzsch sponte crescit, sed in hor-
to colitur. Sponte autem et copiose qui-
dem provenit in sylva Loderslebeni bei den
Quellen.

31. *Thalictrum angustifolium* non rarum est in
pratibus humidis inter Kollenbey et Radewell, us-
que ad Döllnitz.

32. *Mentha gentilis*, optime discernitur foliis ova-
tis petiolatis, calycibus basi pedicellisque gla-
bris: *M. gracilis* enim habet folia lanceolata
subsessilia: *M. sativa* dentes calycinis hirsutos
et *M. arvensis* calyces undique hirsutos. *M.*
gentilis optime invenitur in fossis pratensibus
ad Ostrau et Wederthau.

33. *Linaria arvensis*, rarius habet flores spicatos,
non racemosos, quibus facile dignoscitur a *L.*
minore, satis vulgari.

- *34. *COCHLEARIA DRABA* vera crescit pone *Pfizenburg bei Eisdorf, wenn man nach Wanleben geh.* Folia habet oblonga dentata amplexicaulia, subtus pubescentia: quum *Thlaspi campestre* habeat fol. sagittata incana. *Cochleariae Drabae* siliculae sunt acutae stylo coronatae: Thl. campestris subrotundae emarginatae. Confuderunt autem et *Leysserus* et *Rothius* utramque plantam; ad nostram vero pertinet *Draba* multis flore albo. *Io. Bauhin. hist.* 2. 939. et *Dr. umbellata Morison sect. 3. tab. 21. fig. 1.* Sed apud *Clusium* non occurrit.
35. *Lathyrus monanthos* est varietas *Ervi tetraspermi*.
- *36. *LATHYRUS NISSOLIA*, rarissime crescit ad marginem australem nemoris humidi pone *Liebenau*, qua itur ad *Kollenbey*. Facillime dignoscitur cirrbis nullis, foliis simplicibus linearilanceolatis nervosis amplexicaulibus, stipulis subulatis, pedunculis subbifloris.
37. *Lathyrus sylvestris*, verus, orgyalı altitudine scandens, invenitur in *sylva Loderslebenfi*, qua itur ad fontes. Dignoscitur a *L. latifolio*, cui similis, fol. ensiformibus acuminatis, non obtulis mucronatis et florum colore obscure rubicundo, non roseo.
38. *Lathyrus palustris*, in *saliceto links von dem Fulssteige, der von Ofsendorf nach Döllnitz führt, gegen dem Dreierhause über*, satis frequens.
39. *Vicia sylvatica*, flores non habet purpurascens, sed albicantes striis violaceis.
40. *Ervum tetraspermum* foliola habet lanceolato-linearıa culpidata, non oblonga truncata. *E. hirsutum* folia retusa, non obtusa.
41. *Trifolium strictum*, copiosissime invenitur in

collibus apricis et rupibus an der Bergschenke in Kröllwitz und bis nach der Kreutzschäferei hin. Caules adscendentes, circinnati laeves, unciales, digitales, palmares. Huc referendum *Tr. parviflorum Ehrh. Beitr. 7. p. 165.* quod alii male referunt ad *Lagopodas*, maleque ab hoc distinguunt. *Tr. strictum Kitab.* vero a nostro discrepat. Maio floret.

42. *Trifolium medium* calyces habet glabriusculos, qui villosi in *Tr. alpestri*: illud optime in Löbejüner und Merbitzer Holze: hoc in omnibus nemoribus.
43. *Trifolium spadiceum*, copiosissime in margine occidentali nemoris *die Lude* prope *Holzweissig*.
44. *Medicago minima*, copiose in rupibus apricis zwischen Kröllwitz und der Kreutzschäferei.
45. *Hieracium dubium*, foliis spathulatis integris glaucescentibus glabris basi ciliatis undulatis et scapo 2-, 3-, 4-floro ab *H. Pilosella* differt. In pratis ad Lodersleben frequens. *Fl. dan.*
46. *Carduus cyanoides* et *C. polyclonos*, vix specie differunt. Caulis enim uni- aut multiflorus pro ratione loci: in clivulo aprico pone Lettin *C. cyanoides* pauciflorus est, non ramosus: ubi vero paullum progressus fueris in nemusculum betularum, ramosus evadit, multo altior, atque *C. polyclono* Sibiriae adeo similis ut nullo modo discriminari possit.
47. *Arnica montana* copiose in dem hallischen Holze bei Merbitz, links vom Wege nach Löbejün: dein in prato paludoso, dem Bruche zwischen Sandersdorf et Bitterfeld.
48. *Cineraria campestris*, umbella multiflora, foliis magis dentatis occurrit inter Leimbach et Lodersleben.
49. *Senecio paludosus* copiose zwischen Osendorf

et Döllnitz et ad Liebenau. *S. farraeensis* dubius.

- * 50. *CENTAUREA PHRYGIA*, calycibus recurvato-plumolis, foliis oblongis indivisis asperis mucronato-ferratis. *Fl. dan.* 520. *Schkuhr, tab.* 261.

In sylva Loderslebeni an den Quellen satis copiose.

- * 51. *CAREX VERNA*, spicis 2 tribus oblongis distantibus, infima pedunculata, fructibus subrotundo-ovatis brevissime rostratis, ore obliquo, squamam ovataem obtusam aequantibus. *Schk. tab. L. f.* 46. *Ppp f.* 156. *Efff f.* 189. *C. nitida Host gram. v. t.* 71.

In pratis ad Malslau, inter Merseburg et Schkenditz.

52. *Carex caespitosa*. Varietas adest in palude Lieskavienti, spicis 2 superne ♂, ut fere *C. thuringiacam* referat.

53. *Carex Pseudo-Cyperus*. Spica summa fere semper androgyna, ut masculae inferiorem eius locum obtineant.

- * 54. *SALIX AQUATICA*, foliis subserratis obovato-ellipticis pubescentibus subtus glaucescentibus, stipulis rotundatis dentatis. *Linn. fl. lappon. t.* 8. *f.* 9.

In prato paludoso inter Bitterfeld et Sandersdorf.

55. *Mercurialis annua*. Flores potius polygami: in 2 flores simul ♂.

56. *LYCOPodium inundatum*, monente *Schwägrichenio* III., in palude Dölaviensi vere invenitur.

- * 57. *ASPIDIUM THELYPTERIS*, fronde subbipinnata, pinnae pinnatifidis subcrenatis basi distinctis decussantibus, laciniis margine revolutis acutis, punctis confluentibus. *Io. Bauhin. hist.* 3. p. 731. *Fl. dan.* 700. *Engl. bot.* 1018. *Schmi-*

*del t. 11. Bolton t. 43. 44. Schkuhr
krypt. t. 52.*

Ad Benndorf beim Löberbach et ad Strengs rivu-
lum prope Holzweilig: sed fructiferum fere nun-
quam.

- * 58. *POLYTRICHUM FORMOSUM Hedw. spec. posih.
t. 19. operculi basi eleganter crocea in palude
ad Seeben, primum inventum ab Hübnero
pharmacopola.*

- * 59. *ORTHOTRICHUM CRISPUM, Hedw. ad Betulas
hinter dem Fasanenhaufe.*

- * 60. *HYPNUM MOLLE, Dickf. fasc. t. 5. f. 8. Hedw.
spec. posih. t. 70.*

In faxis im Schießgraben hinter der Schulkirche.

61. *Hypnum plumosum, Hedwigii non est, sed
Turneri, differt ab illo foliis non striatis,
ramulisque non bifariis.*

- * 62. *HYPNUM NITENS, trunco erecto, ramis brevif-
simis, foliis ovato-lanceolatis acuminatis striat-
is, perichaetialibus longissimis. Dill. t. 189
f. 37.*

Ad Benndorf beim Löberbach primus invenit
Schwügrichen.

63. *Conferia torulosa, genicula non contracta ha-
bet, sed articulos spurie geniculatos, tricturis
germina fasciata continentibus. Cf. Mohr in
Schrad. Journ. 1801. tab. 3. f. 1. 2.*

- * 64. *RIVULARIA ELEGANS, globosa subgelatinosa, fi-
lamentis intra substantiam sparsis dichotomis,
ramulis geniculatis fastigiatis subcurvatis. Ba-
trachospermum intricatum Vaucher. t. 12.
f. 2 3. Roth. catalect. 3. p. 337. Neue Bri-
träge 1. p. 269.*

Ad radices Hottoniae palustris in fossa quadam
pone Radewell.

*65. COCCOCHLORIDEM STAGNINAM nominare mallet organilimum, qui in lacubus ad Dieskau, praefertim versus Radewell copiosus, ab omnibus algis differt. Continet enim in massa granulosa corpuscula sparsa oblonga, quae forte speciem propagant. Similis est *Linkiae pruniformis*, sed desunt filamenta vel curvata vel recta, per substantiam sparsa. An aetate mutata Linkia?

*66. SPHAERIA CAPITATA, clavula ovata badia, stipite longiusculo crasso, radice tuberofa. *Fl. dan.* 540. *Bolt. fung. t.* 130.

Rarissima haec species a me in nemore paludoso pone dem Fasanenhaufe inventa, summo mycologo *Perfoonio* ignota est. *Oederus*, qui primus eam invenit, nominat *Fungum, difficulter ad ullum notorum generum referendum*. *Boltonius*, qui etiam rarissimum habet, vidit e poris capituli gelatinam exudantem, quae mox in pulverem album abiit: nigricans autem evaluit in pulvis, ubi in spiritu vini solvebatur. Basis fungi volva cingitur livido-atra; stipites sunt flavicantes, striatus, subtilitulosus; capitulum lurido-spadiceum, undique poris hiulcum, qui semper guttulis limpidis obtekti sunt. Sectum capitulum monstrat cavitates ovals cortici vicinas, radiatim dispositas. Ligno putrescenti innatus invenitur, altitudine unciali.

*67. SPHAERIA GRANULOSA, effusa lata nigra tenuis, sphaerulis globosis ad dimidium liberis, ostiolo minuto acuto. Cum *Sph. cohaerente* adeo congruit, ut vix differre videatur: fuscescit enim utraque, utraque subeffusa, sphaerulis turgidiusculis, ostioliis prominentibus.

*68. SCLERODERMA CERVINUM, α . granulatum (*Albertini et Schweinitz fungi Niesk. p.* 81.) Genus hoc facile a Lycoperdo, Bovista et Tubere distinguitur peridio suberolo indeterminatum rupto subteffellato. Haec spe-

cies est fere arrhiza pallescenti-citrina obsolete squamosa: sed varietas granulosa, quam *Albert. et Schwein.* primum memorant, in pineto *der Heide* inventa pallidiori colore, dum infans est, dignoscitur. Icon *Bolt. fung. tab. 116.* mediocris est, et magis ad verum *Scl. cervinum*, quam ad varietatem hanc trahenda.

- * 69. *GEASTRUM RUFESCENS*, stromate radiato-multifido rufescenti, peridio sessili glabro globoso pallidiori. *Schmidel tab. 43.*

Elegantissima haec species primum a *Schwies* pharmacopola in fossa quadam humida umbrosa *pone dem Fasanenhause* inventa, stromate crassiusculo, fere incarnato, diametri fere digitalis, dignoscitur. Insidet ii stromati globulus nucem iuglandem mole aequans, pallidior, pulvere refertus, apice rumpens.

- * 70. *LYCOCALA FLAVUM*, gregarium globosum sessile flavum, pulvere filisque concoloribus.

In ramis putridis, cum *Peziza hyalina*. Globuli segregati, nodulos acuum aequantes, flavi, initio pulposi, dein pulvere concolori filisque tenuissimis intertextis repleti.

- * 71. *AMANITA VIRIDIS*, pileo convexo obscure viridi nudo glabro; lamellis stipiteque albis.

Non raro invenitur haec species in sylva *der Heide*, inter folia deiecta: viridi colore volvae et pileo, lamellis autem stipiteque albidis statim dignoscenda.

- * 72. *AMANITA UMBRINA*, pileo planiusculo fuligineo verrucis lamellis stipiteque albis.

Ibidem cum prioribus sed rarior.

- * 73. *AMANITA BULBOSA*, tota candida, pileo convexo, stipite elongato basi bulboso.

Insigni copia crescit in pinetis nostris, praesertim der Heide, wenn man nach Lieskau geht.

- *74. AGARICUS COLUBRINUS (*Lepiota*), pileo campanulato squamoso palliescente, squamis minutiusculis subrufescentibus, lamellis albidis liberis, stipite floccoso - villoso molli, annulo fugaci.

In pinetis. *Bolt. fung. tab. 7.* varietatem exprimit.

- *75. AGARICUS ALUTARIUS (*Lepiota*), pileo carnoso obtuse umbonato alutaceo glabro, lamellis liberis albedo-incarnatis, stipite glabro, annulo laxo.

In agro ante Nietleben unico loco.

- *76. AGARICUS BICOLOR, (*Cortinaria*), pileo carnoso convexo violaceo, margine albedo tomentoso, lamellis dilute violaceis, stipite crasso tuberoso tomentoso concolore.

In pinetis der Heide.

- *77. AGARICUS CALLOCHROUS (*Cortinaria*), pileo latiusculo luteo, lamellis aeneo purpurascensibus, stipite pallido bulboso, bulbo marginato.

Huc sine dubio *Ag. decolorans* pertinet, qui sola viscositate pilei diversus videtur.

In sylvaticis umbrosis obviuus.

- *78. AGARICUS AENEUS (*Gymnopus*), subcaespitosus, pileo subcarnoso umbonato fusco-aeneo, lamellis latissimis cinereo-pallidis, stipite solido apice squamuloso.

In pinetis.

- *79. AGARICUS OVINUS (*Gymnopus*), gregarius, pileo carnoso subcampanulato rufescente glabro aut squamuloso, in margine saepius inciso, lamellis distantibus latere venosis albedo-cinereis, stipite cavo fuliginoso.

Ibidem rarior.

- *80. *AGARICUS AROMATICUS (Gymnopus)*, pileo carnoso lato obscure cinnamomeo glutinoso, lamellis iunioribus decurrentibus rufescentibus, stipite cavo. *Batsch fung. t. 32. f. 188.*

In pineto *der Heide* frequens.

- *81. *AGARICUS LUBRICUS (Gymnopus)*, pileo carnoso obtuse umbonato cinnamomeo viscido, lamellis confertis adnexis argillaceis, stipite fibrilloso albedo.

Ibidem.

- *82. *AGARICUS LEUCOPHYLLUS (Gymnopus)*, pileo umbonato plano rufo, lamellis confertis albis, stipite solido rufo basi incrassato apice albidiori.

Ibidem.

- *83. *AGARICUS LUBIDUS (Gymnopus)* subgregarius, pileo subcarnoso flexuoso glabro e virescenti cinereo, lamellis lutescentibus, stipite solido subquamuloso pallescente.

In sylvaticis frequens.

- *84. *AGARICUS CERINUS (Gymnopus)* gregarius, flavo-cerinus opacus, pileo carnoso plano subumbilicato, lamellis tenuibus concoloribus, stipite brevi glabro.

Ibidem.

- *85. *AGARICUS CHRYSENTERUS (Gymnopus)* subgregarius flavo-cerinus, pileo carnoso hemisphaerico, stipite solido subincurvo, basi albedo hirto, pilis erectis.

Elegans species, raro in pinetis obvia.

- *86. *AGARICUS ODORUS (Gymnopus)*, pileo carnoso planiusculo laevi virescente, lamellis confertis subdecurrentibus albidis, stipite solido subflexuoso virescente.

In sylvaticis rarior.

- *87. *AGARICUS VIRIDIS (Gymnopus)*, pileo car-

nofo glabro viridi, lamellis stipiteque siccis.
Bolt. fung. t. 12.

In sylva der Heide semel.

- *88. *AGARICUS COLLINUS (Gymnopus)* gregarius, pileo subcarnoso obtuse umbonato, pallascenti-rufo striato, lamellis stipiteque pallidis.

In collibus graminosis ad margines riuorum.

- *89. *AGARICUS CONICUS (Gymnopus)* pileo conico subviscoso fulvo, lamellis pallidioribus, stipite flavo. *Batsch fung. t. 7. f. 28. 29.*

In pratis sylvaticis.

- *90. *AGARICUS FUNUS (Gymnopus)* gregarius, pileo planiusculo incarnato aut roseo, lamellis latiusculis basi vicosis stipiteque fistuloso basi villosulo dilutioribus. *Batsch t. 6. f. 20.*

In sylva der Heide.

- *91. *AGARICUS EUMENIUS (Gymnopus)* pileo carnoso subhemisphaerico molli subcaescescente dilute fuligineo, lamellis tenuibus argillaceo-violaceis, stipite longiusculo violaceo-albido.

In horto botanico.

- *92. *AGARICUS EUCHROUS (Gymnopus)* caespitosus truncigenus, obscure violaceus, pileo campanulato subumbilicato squamuloso, lamellis ventricosis, stipite crassiusculo.

Ad truncos arborum.

- *93. *AGARICUS MYOMYCES (Gymnopus)* gregarius, pileo carnoso squamuloso umbonato cinereo, lamellis stipiteque albido-cinereis.

In pinetis frequens.

- *94. *AGARICUS ALBUS (Gymnopus)* totus albus glaber subsolitarius, pileo carnoso convexo, lamellis distinctis, stipite crasso brevi subadscendente concolore. *Batsch fung. t. 3. f. 12.*

In pinetis.

- *95. *AGARICUS EBURNEUS (Gymnopus)* gregarius candidus, pileo subcarnoso viscido convexo-plano, lamellis subdistantibus parum decurrentibus, stipite longo apice squamuloso.

In pinetis rarior.

- *96. *AGARICUS LEUCOCROCUS (Gymnopus)* pileo carnoso convexo albido, lamellis congestis dilute croceis, stipite utrinque subincrassato concolore.

In pineto *der Heide* rarissime.

- *97. *AGARICUS PARASITICUS (Gymnopus)* caespitosus parvus, pileo campanulato albido-farinaceo, lamellis distantibus crassiusculis fuscis, stipite incurvo piloso solido.

In Agaricis putrescentibus parasiticus.

- *98. *AGARICUS ARGILLACEUS (Gymnopus)* pileo conico umbonato pallido, lamellis primum albis demum argillaceis, stipite nudiusculo.

In sylvaticis.

- *99. *AGARICUS GALERICULATUS (Mycena)* caespitosus inodorus, pileo membranaceo umbonato livido-fulcescente, lamellis distinctis albis, stipite laevi radicato basi strigoso hirsuto.

Ad truncos frequens.

- *100. *AGARICUS LAEVIGATUS (Mycena)* subgregarius, pileo membranaceo campanulato laevi dealbato-cinereo, lamellis albidis, stipite basi piloso-fibrilloso.

In pinetis.

- *101. *AGARICUS PILOsus (Mycena)* pileo glabro membranaceo albido-cinereo subhemisphaerico papillato striato, lamellis distinctis stipiteque longo tenui basi villosio cinereis. *Batschk fung. tab. 1. f. 2.*

Ibidem.

- * 102. AGARICUS CITRINELLUS (*Mycena*) gregarius parvus, pileo striato hemisphaerico papillato citrino, stipite brevi basi piloso concolore, lamellis uncinatis albidis. *Pers. ic. rar. tab. 11. f. 3. Batsch tab. 18. f. 88.*

In acerofarum reiectamentis.

- * 103. AGARICUS ESCULENTUS (*Mycena*) pileo convexo argillaceo substriato, stipite gracili fistuloso sordide flavescenti, lamellis albidis.

In pinetis rarior.

- * 104. AGARICUS FOENISECII (*Coprinus*) gregarius fragilis, pileo campanulato fusco-fuliginoso, lamellis subventricosis nebulofo-umbrinis, stipite subincrassato glabro. *Pers. icon. rar. tab. 11. f. 1.*

In fimo vaccino post foenifecium.

- * 105. AGARICUS ERICAEUS (*Coprinus*) solitarius, pileo subcarnoso hemisphaerico obsolete papillato fulvo-ferrugineo, lamellis latiusculis nebulosis nigris, stipite nudo subtenaci.

In ericetis.

- * 106. AGARICUS LIGNVS mihi (*Coprinus*) caespitosus, pileo campanulato lurido-spadiceo, fumo atro obducto, lamellis fusco-cinereis, stipite nudo sulfureo elongato.

In der Heide frequens.

- * 107. AGARICUS UDUS (*Coprinus*) gregarius, pileo brevi ruguloso, primum pallide-ochraceo, lamellis ex albido purpurascentibus demum nigris, stipite longissimo basi villoso.

In locis humidis sylvaticis.

- * 108. AGARICUS STIPATUS (*Pratella*) caespitosus congestus fragilis, pileo glabro fuscescente livido, sicco ruguloso pallidente, lamellis con-

fertis incarnato-fuscis, stipite albicante ~~Ab-~~nudo.

Ad truncos.

- * 109. AGARICUS FULIGINEUS (*Pratella*) gregarius fragilis, pileo campanulato obtuso fuligineo-livido, papilla obsoleta, lamellis tenuibus cinereo-albido-incarnatis, stipite deorsum incrassato.

In pratis.

- * 110. AGARICUS SUBDULCIS (*Lactifluus*) pileo infundibuliformi rufescente, lamellis pallido-incarnatis, succo subdulci.

In pinetis frequens. *A. aromatico* similis.

- * 111. AGARICUS TORMINOSUS (*Lactifluus*) pileo umbilicato zonato dilute ochraceo, margine revolutum villoso.

In sylvaticis.

- * 112. AGARICUS NIVEUS (*Russula*) totus niveus, stipite breviusculo, pilei margine tuberculoso.

In der Heide rarius.

- * 113. AGARICUS OCHROLEUCUS (*Russula*) pileo flavescens planiusculo, margine laevi, lamellis stipiteque albis.

Auf dem Bischofsberge.

- * 114. AGARICUS ADUSTUS (*Omphalia*) pileo carnoso depresso olivaceo - cinereo, demum nigrescente adusto, lamellis crassis pallescenti-albis, stipite breviusculo cinereo.

In sylva der Heide.

- * 115. AGARICUS BYSSOIDEUS (*Pleuropus*) pileo subresupinato orbiculari fuligineo-canefcente, stipite subnullo byssis innascente. *Pers. ic. rar.* t. 14. f. 4. a.

In truncis putridis der Heide.

- * 116. MARULIUS TUBIFORMIS, pileo infundibulifer-

mi fusco ruguloso, plicis flavidis, stipite sub-
incrassato flavo. *Bolt. t. 105.*

In sylva der Heide.

- * 117. *MARULIUS UNDULATUS*, livido-pallens, pileo subcoriaceo undulato - crispo infundibuliformi subtus rugoso. *Craterella ambigua. Pers. obs. mycol. 1. tab. 6. f. 8—10.*

In sylva der Heide hinter dem Fasanenhause.

- * 118. *MARULIUS CRASSUS*, dimidiatus substipitatus, stipite incrassato, pileo coriaceo fulco, plicis teneris concoloribus. *n. spec.*

In trunco arboris invenit *Schwie.*

- * 119. *BOLETUS CORTINATUS*, stipitatus, pileo luteo medio aurantiaco, carne alba crispa, tubis luteis, cortina alba, stipite crasso concolori. *Bolt. tab. 84.*

In der Heide.

- * 120. *BOLETUS CIRCINANS*, gregarius, pileo viscoso subrepando crasso stramineo aut flavo-livido, poris acutis luteis, stipite tenui breviusculo flavido punctis subnigrescentibus aspero.

In colle sylvatico vor der Heide frequens.

- * 121. *BOLETUS EDULIS*, pileo pulvinato latissimo fuscescenti-vaccino, carne immutabili; poris primum faretis albidis, dein dilute flavis, stipite tuberoso subventricoso reticulato subrufescenti-cinereo.

Maxima haec species ingenti copia sylvas nostras occupat: pauperes ea vescuntur.

- * 122. *BOLETUS ERYTHROPUS*, pileo pulvinato rufescenti subumbrino, poris minutis aurantiaco-rubris, stipite laevi rubicundo.

In sylvaticis montosis.

- * 123. *BOLETUS CALOPUS*, pileo pulvinato subolivaceo, poris flavis, stipite reticulato coccineo.

In ericetis sylvaticis.

- * 124. *BOLETUS CITRINUS*, imbricatus dimidiatus acaulis carnosus glaber undulatus citrinus, poris sulfureis.

In corticibus prunorum.

- * 125. *BOLETUS SPONGIOSUS* (*Poria*) coriaceo-spongiosus sessilis ferrugineus, tubis longissimis erectis, poris minutis rotundis. *Bolt. t.* 165.

In cortice vetusto pinus.

- * 126. *BOLETUS FIRMUS* (*Poria*) ligneus albidus colliculofus subtus zonatus fuscus. *n. spec.*

In quercus trunco.

- * 127. *BOLETUS SANGUINOLENTUS* (*Poria*) suborbicularis effusus aquoso - albus subhyalinus ad tactum cruentatus, margine dense byssino demum evanido. *Albertini et Schweinitz n.* 764.

In cortice betulino. Mirum phaenomenon, quod intra scripulum horae totus fungus stillet sanguinem.

- * 128. *HYDNUM CONCRESCENS*, gregarium confluens, pileo suberoso subinfundibuliformi fasciato spadiceo, aut fusco, subulis tenuibus fusco-nitidis, stipite brevi subsuberoso difformi. *Batsch. t.* 40. *f.* 221.

In der Heide copiose.

- * 129. *THELEPHORA CARYOPHYLLEA*, pileo infundibuliformi fusco-purpurascente, margine ut plurimum inciso. *Pers. obs. mycol. i. t.* 6. *f.* 8. 10.

In sylvaticis siccis ubique.

- * 130. *THELEPHORA FALLIDA*, caespitosa infundiba-

liformis, externa pallida glabrinucula, interna
rufa strigosa. *Pez. tenn. var. t. 1. f. 3.*

Hinter dem Fasanenhaufe.

132. *Marasmius foetidus*, quod in Flora helvet. sub
Clavaria militat, minime eo pertinet, sed ve-
re distinctum genus est. Marasmata quidem
foliis habent Clavarias; sed compressa sunt,
pyrenio laevi obducta, more Thelophorarum.

133. CLAVARIA CRISTATA, polymorpha ramola aut
aut cinerascens, ramulis humeratis truncatis
obtusisque.

Copiose in umbrasis sylvaticis et in ipso horto bo-
tanico; *Ziegenb. n. 10.*

134. CLAVARIA ERIGITORUM, caespitosa pallido-fo-
vescens, clavulis incrassatis compressis pallidis.
Schmidel t. 5.

In der Heide.

135. CLAVARIA FUSIFORMIS, caespitosa congesta su-
rea, clavulis attenuatis subobtusis basi cohae-
rentibus. *Bolt t. 10.*

Hinter dem Fasanenhaufe.

136. CLAVARIA Eburnea, caespitosa congesta fra-
gilis nivea. *Fl. dan. 775. n. 2.*

In der Heide.

137. PEZIZA ORLATINOSA, mollissima truncato-pla-
na fulco-nitena gregaria. *n. spec.*

In reiectamentis horti cuiusdam mira abundan-
tia et mole invenit praecceptor.

138. *Peziza vinosa* manifesto in *P. rubellam*
subflexuosam transit, neque certi limites inter
utramque inveniuntur.

139. *Peziza hemisphaerica*, intus potius albido-
glauca est quam fusca: extus potius lurido-flava
quam umbra.

Ingenti copia crescit autumnio in fossa fungorum
feracissima *hinter dem Fasanenhaufe.*

- * 139. *PEZIZA MACROPUS*, magna stipitata extus aspera, cupula hemisphaerica intus murina extus cinerea, stipite longissimo. *Bols. tab. 96.*

Sat frequens in sylvaticis arenosis umbrosis.

- * 140. *PEZIZA CRATERELLA*, stipitata, cupula infundibuliformi connivente, intus fusca, extus stipiteque candido-tomentosa. *Hedw. stirp. cryptog. 2. tab. 19. f. 2.*

Ibidem rarissime.

- * 141. *PEZIZA RYALINA*, gregaria sessilis albo-hyalina extus subpilosa aut margine ferrata.

Ad truncos putrescentes.

- * 142. *PEZIZA LEPORINA*, flavida magna glabra auriformis sessilis, hinc hiulca. *Fl. dan. t. 1077. f. 2.*

Copiosissime *hinter dem Fasanenhaufe.* Tacta fumum spermatophorum exhalat, dein suscescit.

- * 143. *PEZIZA CONFLUENS*, aurantiaca sessilis glabra, cupulis confluentibus subimbricatis planiusculis tomento albo insidentibus. *Perf. obs. mycol. 2. t. 5. f. 6. 7.*

In muro humectato domus cuiusdam.

- * 144. *PEZIZA EPIPHYLLA*, subsessilis glabra brunea coriacea plana.

In foliis putridis.

- * 145. *PEZIZA POROSA*, mediocris sessilis gregaria fusca concava, margine subcrenato, disco demum foraminuloso.

Hinter dem Fasanenhaufe.

- * 146. *PEZIZA OLIVACEA*, stipitata glabra parva, cu-

cupula planiuscula intus olivacea, extus stipite-
que pallidioribus. *n. spec.*

In ramis delectis invenit *Schwie.*

- * 147. *PEZIZA FRUCTIGENA*, stipitata glabra pallens,
stipite longo flexuoso.

In glandibus quernis.

- * 148. *PEZIZA CLANDESTINA*, sessilis exilis globosa
umbrina hirta.

In truncis putridis.

- * 149. *PEZIZA LUTESCENS*, stipitata exilis glabra sub-
gregaria lutescens, cupula orbiculari, stipite
cylindrico. *Hedw. stirp. 2. tab. 9. fig. C.*

In truncis putridis pone dem Fasanenhaus. Si-
milis *lenticulari* et *fulvae*, sed hae sessiles planae.

- * 150. *CERATIUM PYRIDATUM*. *Albertini* et
Schweinitz fung. Niesk. tab. 12. fig. 9.

Byssoidaeum vegetabile. Massae facile adnume-
randum, differt tamen mollitie et hirsutie, filis spo-
rulas gestantibus. Truncum simplicem sistit 4 li-
neas longum, apice radiatim divisum, undique filis
pulverulentis albis tectum, substantia molli flavido-
cinerea.

Crescit in udis sylvaticis ad terram.

NOVARUM PLANTARUM

EX HERBARIO MEO

C E N T U R I A.



1. **FUIRENA RUBIGINOSA**, foliis subteretibus vaginantibus, spiculis racemosis axillaribus.

Schoenus rubiginosus Solandr. apud *Forst.*
prodr. n. 493.

Culmus cubitalis, teres, glaber, basi vaginis foliorum vestitus, supra ramulos. *Folia* è lata vagina teretiuscula, glabra, pedalia. *Bractae* pedicellos spicularum cingentes, scariosae, rubiginosae. *Pedicelli* ramosi, angulati. *Spiculae* ovatae, e squamulis aristatis ferrugineis undique imbricatis compositae. *Gluma* trivalvis aequalis, valvis cordato-mucronatis.

Habitat in nova Zeelandia.

2. **CYPERUS AITONI**, culmo tereti folioso, foliis planis glabris, spiculis glomeratis obtusis involucri polyphyllis brevioribus.

Culmus a basi inde foliis vestitus. *Folia* glaberrima, plana, dodrantalia. *Capitulum* sessile, congestum, spiculis bruneis obtusissimis. *Involucrum* polyphyllum, foliolis inaequalibus gracilibus capitulum multo excedentibus.

Ex horto Kewensi.

Accedit ad C. proliferum Thunb., sed spiculae non proliferae ovatae.

3. **ABILDGAARDIA POLYSTACHYA**, triandra, spicis confertis linearibus.

Culmus triqueter, aphyllus, pedalis. *Folia* non vidi. *Spiculae* terminales, confertae, 12—

20. *lineares, mucronatae, rubro-badiae, squamis laxiusculis. Semen trigono-acuminatum, stylo persistente coronatum. Setae nullae.*

Ex India orientali.

De Abildgaardias genere cf. Vahl. enum. 2, 297.

4. *SCIRPUS LUPULINUS*, culmo triquetro aphylo, corymbo terminali, spicularum squamis laxis obtusis, involucri triphylo longo.

Culmus triqueter nudus, apice subsetaceus. Corymbus terminalis, spiculis divaricatis. Squamae pallidae scariosae, obtusae, laxiusculae. Semen triquetrum. Involucrum capitulo multo longius, foliis canaliculatis margine scabris.

Ex Pennsylvania. *Muhlenberg.*

5. *CERESIA ELEGANS. Pers. syn. 1. 85.*

Paspalum membranaceum. Lam. ill. t. 43. f. 2.

Radix perennis, geniculata, fibrosa. Culmi adscendentes, teretes, foliosi, tripedales. Folia lanceolata, glabra, glauca, longe vaginantia, ligula ovali. Spicae plures in apice culmi pedicellatae, pedicellis in membranam latam cymbiformem margine scariosam dilatatis. Flosculi bifariam sub membrana latentes. Gluma calycina bivalvis, uniflora, villosissima. Gluma corollina fissa. Filamenta 3 capillaria: antherae bifurcae. Stigmata duo hispida badia. Semen oblongum corolla tectum.

Ex horto halensi.

6. *PASPALUM UNDULATUM*, spicis calycibusque alternis, rachi angulata, foliis vaginantibus undulatis.

Culmus teres, glaber, foliosus, cubitalis. Folia lata, longe vaginantia, glabra, margine undulata. Spica simpliciter ramosa, ramis angulatis. Caly-

aei alterni, laeves, nautici, naviculares, bivalves, uniflori. *Semina* glabra ovalia.

E nova Caledonia. *Forst.*

7. *Panicum pennsylvanicum*, paniculae patentis ramis simplicibus, axillis pilosis, rachi angulata, flosculis remotiusculis ovatis acuminatis.

Radix perennis, bulboso-fibrosa. *Culmi* erecti, caespitiosi, teretes, pedales, cubitales, foliosi. *Folia* longissima, margine scabra, vaginantia, vagina pubescente. *Panicula* terminalis patens, folia aequans, ramis simplicibus, axillis pilosis, bracteis ramentaceis ad singulos ramulos et pedicellos. *Calycum* valvulae binae maiores ovatae, acuminatae, 5 nerviae, glabrae.

E Pennsylvania.

Congruit quidem cum P. nemoreo Swartz. fl. ind. occid. v. 150., sed huius glumae aristatae et folia tenuissima.

8. *Panicum discolor*, panicula ramosa capillari patente, calycibus subrotundis, valvulis maioribus striatis, minima discolori, culmo stricto folioso.

Radix fibrosa horizontalis. *Culmus* strictus foliosus. *Folia* infima ovata, superiora lanceolata glabra, margine scabriuscula, vaginis pilosis. *Panicula* terminalis, parumper ex ultimo folio emergens, ramosa, ramis capillaribus patentibus flexuosis. *Calyx* subrotundus pubescens, valvulis maioribus 6-striatis obtusis, minima purpurea basilari.

E Pennsylvania.

Adfuit P. nitido et barbato Michauxii, sed illius folia linearia remota, huius culmus ramosus, nodis barbatis.

9. *Polypogon setosus*, panicula spicaeformi, glumis acuminatis aristatis scabris, foliis involutis rigidis. *Culmus* teres, glaber, foliosus, pedalis. *Folia*

glabra, vaginantis, involuta, rigida. *Panicula* terminalis, parumper ex ultimo folio emergens, fusca, dense spicaeformis, ramulis glomeratis contractis. *Gluma* calycina valvulis acuminatis scabris aristatis, uniflora, corolla paullo maior. *Gluma* corollina valvulis acuminatis muticis.

E Pennsylvania. *Mühlenb.*

10. *AGROSTIS FILIFORMIS*, panicula erecta ramulifera, ramis capillaribus tenuissimis, valvulis calycinis scabris, corollae valvula altera aristata.

Avena filiformis Forst. prodr. n. 46.

Culmus teres, glaber, foliosus, cubitalis. *Folia* linearia, involuta, flaccida. *Panicula* terminalis, ramulifera, erecta, ultimi folii longitudine, ramis capillaribus tenuissimis longissimis. *Gluma* calycina 1-flora, valvulis linearibus acuminatis, extrorsum scabris, corolla maior. *Gluma* corollina, valvulis linearibus minutissimis, altera aristata, arista recta calycem excedente.

Ex insula Paschatis oceani australis.

11. *AGROSTIS CLANDESTINA*, mutica, panicula contracta subspicaeformi, in foliorum vaginis occulta, vaginis ore pilosis.

Culmus teres erectus foliosus. *Folia* involuta setacea, glauca, vaginis ore pilosis. *Panicula* contracta pauciflora, in foliorum vaginis latens. *Gluma* calycina corolla minor, glabra, valvulis lanceolatis subaequalibus. *Gluma* corollina calycem multo excedens, glumis longe acuminatis muticis glabris aequalibus.

E Pennsylvania. *Mühlenb.*

12. *AIRA NITIDA*, mutica, panicula contracta cylindrica, glumis truncatis, flosculo altero pedicellato, valvulis hyalinis.

Folia pollicaria, ima pubescentia.

E Pennsylvania. *Mühlenb.*

13. *AIRA PALLENS*, aristata, panicula contracta, valvulis calycinis inaequalibus, flosculo altero aristato, altero mutico.

Folia linearia, glabra, rigida, subinvoluta, vaginis pubescentibus.

E Pennsylvania. *Muhlenb.*

14. *POA IMBECILLA*, panicula laxa diffusissima, spiculis quinquefloris linearibus, flosculis remotiusculis, foliis linearibus longissimis.

Radix fibrosa, geniculata, repens. *Culmus* adscendens, flaccidus, teres, glaber, foliosus, cubitalis. *Folia* linearia, glabra, flaccida. *Panicula* terminalis, laxa, diffusissima, ramis capillaribus subsecundis. *Spiculae* 5-florae, glabrae, lineares, apice truncatae. *Flosculi* remotiusculi, glabri, valvulis linearibus.

E nova Zelandia.

Cf. Soland. apud Forst. prodr. n. 499.

15. *POA CAESPITOSA*, panicula contracta stricta foliis setaceis brevior, spiculis trifloris ovatis nitidis.

Culmi caespitosi, e basi subtuberosa, stricti, foliosi, subcubitales. *Folia* involuta, setacea, glabra, culmum duplo superantia. *Panicula* terminalis, stricta, ramis appressis. *Spiculae* triflorae, ovatae, nitidae. *Glumarum* valvulae striatae, margine carinaque scabrae, acutae.

E nova Zelandia.

Cf. Soland. apud Forst. prodr. n. 498.

16. *POA CAROLINIANA*, panicula patentissima, ramis subverticillatis, spiculis lanceolatis acutis quinquefloris glabriusculis, foliis glabris.

Radix fibrosa, horizontalis, annua. *Culmi* adscendentes, caespitosi, teretes, glabri, foliosi. *Folia* lanceolata, glabra, dodrantalia, vagina glabra, ligula abbreviata obtusa. *Panicula* ramo-

Alissima patentissima, ramis tuberculatis. *Glu-*
merum valvulae nitidae acutae margine carinaeque
scabriusculae.

E Carolina boreali.

Similis P. cilianensi, quae vero differt tunc ha-
bent, tum spiculis distichis 4-floris. Cf. Allion.
pedem. t. 91. f. 2.

17. **Festuca hirtana**, panicula secunda erecta api-
ce mutante, spiculis quinquefloris obtusis mu-
ticis.

Radix fibrosa perennis. *Culmus* strigosus, gla-
ber, tripedalis, foliosus. *Folia* lanceolata, gla-
bra, dodrantalia, vaginis glabris, ligula subnulla.
Panicula patens, secunda, erecta, apice nutans,
ramis angulatis scabridis. *Spiculae* ovato-ob-
longae obtusae, glabrae, quinqueflorae. *Glum-*
arum valvulae oblongae muticae glabrae, apice lu-
sco. *Semina* oblonga.

E Pennsylvania. Muhlenb.

18. **Festuca obtusa**, panicula aequali flaccida,
spiculis oblongis trifloris muticis.

Culmus decumbens, geniculatus, debilis. *Fo-*
lia linearia, glauca, vaginantia, ligula subnulla,
vagina glabra. *Panicula* terminalis, aequalis,
erecta, flaccida; ramis erectis, angulatis, pauciflo-
ris. *Spiculae* pedicellatae, oblongae, glabrae. *Glum-*
inae calycinae valvulae inaequales, corollis multo
minores, striatae, glabrae. *Glumae* corollinae sub-
cartilagineae ovatae.

E Pennsylvania. Muhlenb.

19. **Bromus poaeformis**, panicula erecta stricta de-
composita, spiculis sexfloris subsecundis, fo-
liis longissimis involutis.

Radix fibrosa annua. *Culmi* adscendentes,
caespitosi, cubitales, glabri, subcompressi, foliosi.
Folia pedalia, glabra, striata, involuta, subulata,

longe vaginantia, vaginis glabris. *Panicula* erecta, stricta, decomposita, basi folio involuta, ramis erectis patentibus glabris. *Spiculae* lexfloerae lineari-lanceolatae, glabriusculae.

Ex America boreali.

20. *ARISTIDA RACEMOSA*, panicula contracta cylindrica spicaeformi, aristis aequalibus calyce triplo longioribus.

Folia glabra, involuta, longissima, linearia, ligula nulla, vagina glabra.

Ex insula St. Helenae.

21. *TRITICUM CAUCASICUM*, spica composita, spiculis distiche imbricatis subquinqüefloris, flosculis villo connexis.

Culmus cubitalis, strictus, foliosus. *Folia* setacea, linearia, vaginis ore pilosis. *Spica* composita terminalis cylindrica. *Glumae* lineares, villo connexae.

È Caucaso.

22. *SCARIOSA DICHOTOMA*, corollulis quadrifidis subaequalibus, calycibus foliaceis, foliis indivisis oblongis basi attenuatis.

Caulis cubitalis scaber, ramis dichotomis patentibus. *Folia* oblonga, sessilia, integerrima, scabra, obtusa, basi attenuata. *Flores* sessiles in dichotomia. *Calycis* squamae foliaceae. *Receptaculum* setaceum. *Pappus* membranaceus integer. *Flosculi* pallidi.

Ex horto halensi.

23. *OLDENLANDIA RAMOSISSIMA*, floribus axillaribus sessilibus subsolitariis, foliis oppositis lanceolatis obtusiusculis.

Caulis ramosissimus, decumbens, angulatus. *Folia* opposita, lanceolata, obtusiuscula, integerrima, glabra. *Flores* tetrandri, axillares, sessiles, bini aut solitarii.

Ex horto Razumoviano.

Hedyotis maritima *nimis adfinitis.*

24. *SYMPHYTUM ASPERRIMUM*, foliis infimis cordatis in petiolum decurrentibus, superioribus sessilibus integerrimis, caule muricato-strigoso.

Folia integerrima, acuminata, strigosa. *Caulis* mucronibus strigosis dense obsitus. *Flores* purpureo-coerulei. His notis differt a *S. orientali* et *pannonico*: *tauricum* differt fol. crenulatis.

E Sibiria. *Redowsky*.

25. *LYSIMACHIA VERTICILLARIS*, villosa, foliis ovatis petiolatis oppositis ternisve, cymis axillaribus terminalibusque.

Caulis strictus, simplex, villosus. *Folia* petiolata ovata obtusiuscula, ima opposita; summa ternata, subtus incano-villosa, supra pubescentia. *Cymae* subtriflorae axillares et terminales.

E Tauria. *Pallas*.

26. *CAMPANULA BETONICAEFOLIA*, capsula quinqueloculari calycis villosissimi sinubus reflexis tecta, foliis oblongo-lanceolatis in petiolum decurrentibus eroso-dentatis, floribus cernuis racemosis.

Caulis ramosus villosus cubitalis. *Folia* oblongo-lanceolata, in petiolum decurrentia, acuta, eroso-dentata, subtus inprimis pubescentia. *Racemi* axillares, floribus secundis cernuis. *Bractae* pedunculis breviores. *Calycis* basis villosissima, laciniae lanceolatae acutae. *Corolla* coerulea magna.

E Cuban. *Redowsky*.

27. *CAMPANULA GMELINI*, foliis laevibus linearibus, inferioribus argute dentatis, floribus paniculatis.

Caulis adscendens cubitalis, foliosus. *Folia* stricta linearia, infima remote et argute dentata,

superiora integerrima. *Panicula* patentissima, ramis alternis. *Stylus* clavatus longus.

E Mongolia.

Gmel. flor. sibir. 3. t. 33. eadem videtur.

28. *SOLANUM VIRIDE*, caule inermi fruticoso, foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis, pedunculis trifloris infra-petiolaribus.

E nova Zelandia. *Forst. plant. escul. 42.*

Satis adfines S. nudifloro: sed folia in hoc per petiolum decurrunt et pedunculi sunt umbelliferi.

29. *RHAMNUS ZIZYPHOIDES*, inermis, floribus hermaphroditis, capsulis baccatis tricoccis, foliis ovato-lanceolatis subtus incano-tomentosis.

Ramus fructifer exstat spithameus, petiolis subtomentosis. Folia ovato-lanceolata, basi rotundata, supra glabra, subtus incano-tomentosa, nervoso-venosa, acuta, integerrima. Panicula terminalis, laxa, pauciflora. Baccas atrae, glabrae, corticatae, tricoccae.

E Societatis insulis. *Forst.*

30. *MOLLIA MINUARTOIDES*, foliis subulatis confertis, cymis axillaribus paucifloris.

Caulis lignescens, ramosus: ramis foliosis incano-tomentosis. Folia acerola, glauca, subulata, conferta, subamplexicaulia, patentia, versus apicem rariora, remotissima. Flores albi pedunculati in cymis e quavis axilla foliorum superiorum prodeunt: in summitate caulis subcorymbosi. Stamina 5.

Ex Hispania australi.

Minuartae satis similis: differt tamen numero staminum et inflorescentia. De Molliæ genere es. Willd. hort. t. II.

31. *LIGUSTICUM DUBIUM*, foliis pinnatis, pinnis oblongis pinnatifidis basi cuneatis, laciniis incisae, involucri foliolis linearibus.

Ex horto Razumoviano.

Hedyotis maritima *nimis adfinitis*.

24. *SYMPHYTUM ASPERRIMUM*, foliis infimis cordatis in petiolum decurrentibus, superioribus sessilibus integerrimis, caule muricato-strigoso.

Folia integerrima, acuminata, strigosa. *Caulis* mucronibus strigosis dense obsitus. *Flores* purpureo-coerulei. His notis differt a *S. orientali* et *pannonico*: *tauricum* differt fol. crenulatis.

E Sibiria. *Redowsky*.

25. *LYSIMACHIA VERTICILLARIS*, villosa, foliis ovatis petiolatis oppositis ternisve, cymis axillaribus terminalibusque.

Caulis strictus, simplex, villosus. *Folia* petiolata ovata obtusiuscula, ima opposita, summa ternata, subtus incano-villosa, supra pubescentia. *Cymae* subtriflorae axillares et terminales.

E Tauria. *Pallas*.

26. *CAMPANULA BETONICAEFOLIA*, capsula quinqueloculari calycis villosissimi sinubus reflexis tecta, foliis oblongo-lanceolatis in petiolum decurrentibus eroso-dentatis, floribus cernuis racemosis.

Caulis ramosus villosus cubitalis. *Folia* oblongo-lanceolata, in petiolum decurrentia, acuta, eroso-dentata, subtus inprimis pubescentia. *Racemi* axillares. floribus secundis cernuis. *Bractae* pedunculis breviores. *Calycis* basis villosissima, laciniae lanceolatae acutae. *Corolla* coerulea magna.

E Cuban. *Redowsky*.

27. *CAMPANULA Gmelini*, foliis laevibus linearibus, inferioribus argute dentatis, floribus paniculatis.

Caulis adscendens cubitalis, foliosus. *Folia* stricta linearia, infima remote et argute dentata,

ce tantummodo dentata. *Capsulae* strictae teretiusculae, pubescentes.

E nova Zelandia.

Cf. Soland. apud Forst. prodr. n. 516. Simile E. glabello, quod vero foliis omnibus glabris obtusis dentatis distinguitur. Ad E. parviflorum *Schreb. propius accedit, quod autem folia omnia villosa ferrata habet.*

35. *EPILOBium COLONATUM*, foliis oppositis alternisque lanceolatis petiolatis glaberrimis argute inaequaliter ferratis, petalis subintegris, caule teretiusculo.

Caulis simplex, spithameus aut dodrantalis, teres, glaber, apice tantummodo pubescens. *Folia* lanceolata acuminata: sesquipollicaria, semiumguem lata, petiolata, petiolis flavido-rufis, argute et inaequaliter ferrata. *Rami* apice floriferi, foliosi, pubescentes. *Petala* parva subintegra aut emarginata, albido-purpureascentia. *Capsulae* teretiusculae, pubescentes, rubicundae.

E Pennsylvania. *Mühlenb.*

36. *POLYSCIAS UMBELLATA. Forst. gen. pl. n. 32.*

Locus est inter Mimulopa et Cupaniam.

Char. gener. essent. Cal. 8-dentatus superus, *Cor.* 8-petala. *Stigm.* 2. *Bacca* sicca 4-ocularis.

Arbor ingens, ramosa, cortice rimoso. *Folia* orbiculata, subspithamea latitudine et longitudine, integerrima, subcarnosa, nervoso-venosa, petiolata, petiolis supra canaliculatis. *Flores* umbellati in conspicui. Cetera habet *Forst. l. c.*

Habitat in insula Tanna.

37. *BAUHINIA SPICATA*, foliis subrotundis basi truncatis subtus nudis, lobis rotundatis subdivaricatis, floribus racemoso-spicatis nudis.

Rami teretes, cinerascetes, glabri. *Folia* petiolata, pollicem lata, semipollicem longa, basi trun-

Flores cum videntur. *Folia* submembrata, glabra, pinnata, pinnulae subulnatae glabrae; quatuor ultimae pinnatae, reliquae semina aut leprosae foliis pollicares et ultra, acutae, pinnatifidae, laciniis ovatis acutis, ultimis confluentibus. *Pedunculi* communis, nudi, teres, glabri. *Involuti* et involucelli semina linearia angustissima. *Flores* et alii, perala integra. *Fructus* coacti.

Patria speciosa.

34. *Alnus* *canadensis*, fructu modo accipiti, foliis lanceolatis canalicatis, ramis simplicibus.

Folia modo, linearia, obtusa, canaliculata, scapo folio duplo altior, apice praecipue ancipiti, basi cuneata. *Spinae* lanceolatae, bivalvis, scariosae, brevissima. *Umbella* multiradiata. *Petala* cuneata, lanceolata.

Ad *Danubii* *offia*.

35. *Rhus* *flexuosa*, floribus androgynis, foliis calycinis alternis involutis, foliis lanceolatis basi attenuatis margine subcrispis.

Caulis ramosus, dichotomus, angulatus. *Folia* lanceolata, digitalia, nervoso-venosa, margine crispato undulata, acutiuscula, glabra. *Flores* subverticillati, pedunculati, axillares, ♂ & ♀ mixti. *Axillae* membrana scariosa vestitae. *Calycis* foliola alterna involuta, alterna recta.

E nova *Zelandia*.

Cf. *Soland. apud Forst. prodr. n. 515.*

36. *Erigeron* *uncusum*, foliis sparsis lanceolatis acutis, inferioribus glabris serrato-denticulatis, superioribus, capsulis cauleque pubescentibus.

Caulis exacte teres, simplex, fistulosus, basi glaberrimus, apice pubescens. *Folia* sparsa, lanceolata, acuta, inferiora glabra serrato-denticulata; superiora et iuniora pubescentia, integra api-

ce tantummodo dentata. *Capsulae* strictae teretiusculae, pubescentes.

E nova Zelandia.

Cf. *Soland. apud Forst. prodr. n. 516. Simile* E. glabello, quod vero foliis omnibus glabris obtusis dentatis distinguitur. Ad E. parviflorum Schreb. propius accedit, quod autem folia omnia villosa ferrata habet.

35. *EPILOBIMUM COLORATUM*, foliis oppositis alternisque lanceolatis petiolatis glaberrimis argute inaequaliter ferratis, petalis subintegris, caule teretiusculo.

Caulis simplex, spithameus aut dodrantalis, teres, glaber, apice tantummodo pubescens. *Folia* lanceolata acuminata: sesquipollicaria, semiunguem lata, petiolata, petiolis flavido-rufis, argute et inaequaliter ferrata. *Rami* apice floriferi, foliosi, pubescentes. *Petala* parva subintegra aut emarginata, albido-purpurascencia. *Capsulae* teretiusculae, pubescentes, rubicundae.

E Pennsylvania. *Muhlenb.*

36. *POLYSCIAS UMBELLATA. Forst. gen. pl. n. 32.*

Locus est inter Mimufopa et Cupaniam.

Char. gener. essent. Cal. 8-dentatus superus. Cor. 8-petala. *Stigma* 2. *Bacca* sicca 4-locularis.

Arbor ingens, ramosa, cortice rimoso. *Folia* orbiculata, subspithamea latitudine et longitudine, integerrima, subcarnosa, nervoso-venosa, petiolata, petiolis supra canaliculatis. *Flores* umbellati in conspicui. Cetera habet *Forst. l. c.*

Habitat in insula Tanna.

37. *BAUHINIA SPICATA*, foliis subrotundis basi truncatis subtus nudis, lobis rotundatis subdivaricatis, floribus racemoso-spicatis nudis.

Rami teretes, cinerascetes, glabri. *Folia* petiolata, pollicem lata, semipollicem longa, basi trun-

cata, utrinque glabra, coriacea, integerrima, subtus novemnervia reticulata, subdiscolora; bileba, lobis obtusis rotundatis mucronulo exiguo divisus. *Racemi* spicaeformes axillares et terminales subnantes. *Petala* et *Stamina* omnino nuda.

Ex India orientali. *Rottler*.

Proxime accedit ad B. parvifloram Vahl synh. 3. 55. et B. Lunariam Cav. ic. t. 407. Utraque tamen differt petalis et staminibus basi villosis, quae in hac nuda sunt. B. parviflora etiam habet folia multo maiora, septemnervia, basi macula fusca notata, petiolos longiores apice inerassatos. B. Lunaria Cav. parviflorae duntaxat varietas videtur.

38. *SAXIFRAGA SEQUIERII*, foliis radicalibus spathulatis integerrimis pubescentibus, caule unifloro.

S. alpina minima, foliis ligulatis, in orbem circymactis, flore ochroleuco. Sequier. veron. 1. p. 450. t. 9. f. 3.

Ad S. ledoidem perperam numeratur, sub quae tres species diversae militant: 1. S. muscoides Allion. habet folia linearia, non spathulata, crassiuscula, in caespitem densum aggregata, caulem triflorum. Allion. n. 1528. t. 61. f. 2. et S. planifolia Picot-Lapeyrouse. pyren. t. 14. 2. S. trichodes Scop. carn. t. 15. n. 496. differt caule ramoso, foliis lanceolatis, laxis, acutis, non caespitosis: quorsum et S. ledoides Jacquem. misc. 2. t. 21. f. 22. . . 3. S. Sequieri, quae media fere est inter hanc et illam.

Habitat in monte Baldo et agro Veronenfi. *Gebhard*.

39. *RHIZOPHORA CORNICULATA*, foliis oblongis obtusis basi attenuatis, floribus subumbellatis hexandris, fructibus corniculatis.

Rami fusci, teretes, patentes. *Folia* oblonga, coriacea, utrinque glaberrima, integerrima, obtu-

stissima subretusa. *Pedunculi* oppositifolii, umbelliferi. *Calyx* imbricatus, exterior foliolis obtusissimis, interior foliolis membranaceis convolutis, *Corolla* monopetala quadripartita, laciniis acutis reflexis. *Stamina* sex, quandoque quinque. *Stylus* longus persistens.

E Zeylona. *Rottler*.

40. *TRIUMFETTA GLABRA*, floribus completis, foliis subcordatis trilobis crenatis utrinque nudis, racemis terminalibus.

Ex India orientali. *Rottler*.

Cum *Tr. semitriloba coniungenda*, ni haec, *Brown* eo teste, villosa esset.

41. *RESEDA CLUSII*, foliis linearibus glabris, floribus spicatis tetragynis.

Sesamoides parvum Salmantic. *Clus.* hist. 3. 295.

Caulis strictus, spithameus aut minor. *Folia* sparsa, linearia, obtusa, glabra, secunda. *Spica* terminalis glaberrima, floribus minutissimis albis vestita. *Capsula* 4-ocularis.

Ex Hispaniae collibus. *Höchst*.

Malè olim ad *R. canescentem* relatum fuit id synonymon *Clusii*: cuius icon perfecte exprimit plantulam nostram. *R. canescens* differt autem foliis lanceolatis pilosis undulatis, floribus hexagynis, caulibus hispidis. Cf. *Forsk. fl. arab.* p. 92. *Vahl. symb.* 2. 53, qui *Clusii* plantam a *R. canescenti* differre iam divinavit.

42. *EUPHORBIA LANCEOLATA*, herbacea inermis, foliis lineari-lanceolatis integerrimis, glabris, floribus axillaribus solitariis.

Caulis herbaceus, simplex, spithameus. *Folia* alterna, sessilia, lineari-lanceolata, glaucescentia, integerrima, glabra, obtusiuscula, patentia. *Flo-*

res in axillis superioribus cernui subsessiles. *Capsulae* glabrae.

Ex India orientali. *Rottler.*

43. EUPHORBIA DENTATA, dichotoma, foliis oblongis dentatis obtusis basi attenuatis, capsulis glaberrimis.

Caulis spithameus, ramosus, herbaceus, pilosulus. *Folia* opposita, oblonga, crenato-dentata obtusa, basi attenuata, subtus pilis raris mollissimis obrita. *Flores* pedicellati axillares et terminales, pedunculis bilidis. *Capsula* glaberrima.

Ex horto balensi.

Accedit ad E. brasiliensem, quae vero differt floribus racemosis et germine pubescenti.

44. EUPHORBIA CILIATA, umbella trifida dichotoma, involucris cordatis, foliis sessilibus lanceolatis parabolicis laevibus denticulato-ciliatis.

Caules suprapedales, adscendentes, glabri, fistulosi. *Folia* unguicularia sessilia, omnia denticulato-ciliata, alia lanceolata obtusa, alia parabolica. *Involucra* et involucella cordata denticulato-ciliata. *Umbellae* trifidae dichotomae. *Corolla* flava, petalis 4 denticulatis. *Capsula* fusca, glabra.

Ex herbario *Römeri Turic.*

45. EUPHORBIA TANNENSIS, dichotoma herbacea, foliis lanceolatis basi attenuatis obtusis mucronulatis, capsulis glabris.

Croton Clutoides. Forst. prodr. n. 55t.

Caulis striculus, herbaceus, fistulosus, superne ramosus. *Folia* oblongo-lanceolata, petiolata, opposita et alterna, basi attenuata, margine subrepanda, utrinque nuda, apice obtusa cum mucronulo. *Flores* in dichotomia ramorum pedicellati. *Capsulae* glabrae.

Ex insula Tauna.

46. *CAPPARIS BREVIS*, corymbis terminalibus, foliis oblongis subserratis, utrinque glaberrimis trinerviis.

Rami scabri pubescenti-stellati. *Folia* petiolata, petiolis pubescentibus, oblonga, utrinque attenuata, glaberrima, trinervia, subserrata. *Petala* lanceolato-lineariter flava. *Calyx* intus coloratus.

Ex horto Razumoviano.

47. *RANUNCULUS PLANTAGINEUS*, foliis lanceolatis obtusiusculis nervosis; radice bulbosa, caule subunifloro.

Ran. angustifolius bulbosus *I. Bauh. hist.* 3. 866.

Ran. plantagineus *Allien. pedem.* t. 76. f. 1.

Flores constanter albi; *caulis* fere semper uniflorus apice tomentosus.

48. *RANUNCULUS PYRENAEUS*, foliis lineari-lanceolatis, basi attenuatis enerviis, caule subbifloro.

R. pumilus gramineis foliis *I. Bauh. hist.* 3. 866.

Utramque speciem iam bene distinxit Bauhinus; Linnaeus et qui sequuntur, perperam coniunxerunt. Folia toto coelo diversa, huius magis accedunt ad R. gramineum, qui vero floribus luteis et foliis linearibus longissimis basi non attenuatis differt. Reinerus et Hohenwarch R. plantagineum potius describunt. (it. 187.) quam pyrenaicum. Hic enim in Gallia Narbonensi, ille in alpidibus helveticis, rhaeticis et austriacis.

49. *RANUNCULUS RIVULARIS*, foliis ternatis trilobis, caule repente, pedunculis filiformibus radicalibus.

Caules repentes, diffusi, procumbentes. *Petiololi pedunculique* erecti unciales filiformes. *Folia* ternata, foliolis minutis trilobis glabris.

E. nova Zelandia. *Soland.* apud *Forst.* *prodr.* n. 524.

Accedit ad R. trilobum Desfont. atlant. 1.
437. *sed huius caulis erectus, nec folia ternata.*

50. *RANUNCULUS HIRTUS*, caule diffuso, foliisque lobatis hirtis, pedunculis elongatis solitariis unifloris.

Indidem. Soland. apud *Forst. prodr.* n. 525.

Accedit ad R. lanuginosum, sed mollities huius, pedunculi multiflori et flores lutei distinguunt: namque nostri flores albi sunt.

51. *SCUTELLARIA INCANA*, foliis ovatis crenatis subtus racemisque incanis.

Sc. pubescens Mühlenb. lit.

Caulis quadrangulus, incano-pubescent. Folia opposita, petiolata, ovata, digitum fere longa, sesquipollicem lata, acuta, superiora basi parumper attenuata, crenata, subtus incana. Racemi terminales compositi, foliis paucis suffulti, incani. Pedunculi subheteromalli. Bractee sessiles, lanceolatae, incanae, pedunculis breviores. Corollae purpureo-coerulae.

E Pennsylvania.

Accedit ad Sc. Columnae, sed huius folia sunt oblonga utrinque pubescentia villosa, cordata; bractee petiolatae, ovatae, nec ulla canities.

52. *SCUTELLARIA ELLIPTICA*, foliis ellipticis crenatis subpubescentibus, floribus racemosis aequalibus.

Sc. elliptica Mühlenb. in lit.

Caulis quadrangulus, pubescens. Folia remotissima, opposita, petiolata, elliptica, obtusa, basi producta, pollicem longa, semipollicem lata, crenata, pilis raris utrinque tecta. Racemus termina-

lis subcompositus. *Bractee* ovatae, petiolatae, integrusculae pedunculis longiores. *Corollae* pallidae.
- E Pennsylvania.

53. *LINARIA FILIFORMIS*, foliis omnibus alternis lineari-filiformibus piloso-viscidis, racemis raris paucifloris, corollae calcarii longissimo recurvo.

Caules dodrantes, ramosissimi, erecti, tenues. *Rami* foliosi, apice divisi, floriferi. *Folia* sparsa, alterna, lineari-filiformia, flaccida, pilis minutissimis viscidis obsita, semiunguicularia. *Racemi* terni, tri-quadriflori. *Pedunculi* brevissimi. *Corollae* saturate luteae, calcarii recurvo.

Ex herbario *Römeri Turic.*

54. *RAZUMOVIA TRANQUEBARICA.*

Charact. gener. *Cal.* 1-phyllus, subbipartitus, quadrangularis. *Cor.* campanulata 5-fida. *Caps.* 2-locularis polysperma.

Locus inter Orobanchen et Toreniam.

Planta sesquiuncialis, annua, hirsuta. *Radix* fibrosa. *Caulis* strictus subsimplex. *Folia* spathulata, linearia, opposita, integerrima, enervia, unguicularia. *Flores* axillares sessiles. *Calyx* monophyllus, subbipartitus quadrangularis, bracteis foliaceis linearibus suffultus. *Corolla* campanulata 5-fida, purpurea. *Antherae* 4, staminibus duobus brevioribus hirsutis. *Capsula* turgida bilocularis polysperma.

E Tranquebaria. *Rottler.*

In honorem Comitissae Razumovii, summi et liberalissimi rei herbariae promotoris dictum genus.

55. *BISCUTELLA SAXATILIS*, siliculis glabris, foliis lanceolatis hirtis subdentatis.

Caulis pedalis, erectus, basi hirtus, apice glaberrimus. *Folia* radicalia oblonga utrinque acuta, superiora elongato-lanceolata, apice dilatata, basi

attenuata, acutiuscula, hirta, subdentata; caulina integerrima, linearia. *Corymbus* compositus terminalis. *Flores* sulfurei. *Silicula* orbicularia, margine glaberrima, medio scabriuscula.

E Vallesiae rupibus. *Schleicher*.

56. *ARABIS BULBOSA*, foliis radicalibus cordatis subrotundis integerrimis petiolatis, caulinis oblongis dentatis sessilibus, radice bulbosa.

Radix e bulbis duobus aut tribus aggregatis compolita. *Caulis* pedalis, simplex, strictus. *Folia* omnia glaberrima, radicalia cordato-subrotunda, obtusa, integerrima, longe petiolata; caulina oblonga acutiuscula, sessilia, profunde dentata. *Racemus* terminalis, nudus. *Flores* candidi.

E Pennsylvania. *Mühlenb.*

57. *PELARGONIUM RAZUMOVIANUM*, pedunculis multifloris, foliis cordatis trilobis dentatis cauleque villosis. stipulis ovatis aristatis.

Caulis suffruticosus, villosus purpurascens, ramis patentissimis. *Petioles* sesquipollicares, villosi, divaricati. *Folia* pollicaria, cordata triloba, lobis obtusis dentatis, utrinque pubescenti-villosa. *Stipulae* membranaceae, ovatae, aristula terminatae. *Pedunculi* oppositifolii, petiolos aequantes. *Umbella* quinqueflora, floribus purpureo-violaceis. *Involucrum* pentaphyllum, rubrum, foliolis ovatis, aristatis.

Ex horto Razumoviano.

Simile P. patulum, sed huius pedunculi biflori, folia glauca, summa sessilia.

58. *PELARGONIUM RENIFORME*, pedunculis bifloris, foliis subrotundis reniformibus crenatis incano-pubescentibus.

Caulis fruticosus, fuscus, ramis suberectis. *Folia* petiolata, subrotunda, reniformia, crenata, incano-pubescentia, semipollicaria. *Pedunculi* bi-

pollicares, biflori. *Involucrum* scariosum, luridum, tetraphyllum, foliolis aristatis. *Flores* saturate purpurei.

Ex horto Razumóviano.

Accedit ad P. betulinum, quod vero differt foliis glabris, ovatis, serratis.

59. *ONONIS MACROPHYLLA*, pedunculis muticis unifloris, foliis ternis ellipticis apice serratis, stipulis lanceolatis integerrimis, caule diffuso piloso viscoso.

Caulis herbaceus, ramosissimus, ut tota planta, pilis mollibus viscidis oblitus. *Folia* ternia, elliptica, superiora lanceolata, extimum pollicem fere longum, unguem latum, lateralia minora, apice serrata, lineata. *Stipulae* lanceolatae, integerrimae. *Pedunculi* axillares petiolis breviores, patentes. *Flores* albi.

- E Lusitania. *Brotero*.

60. *GLYCINE REPANDA*, foliis ternatis subrhombeis punctatis, apice serratis, floribus verticillato-racemosis.

Caulis herbaceus, decumbens, ramosus, dracantalus. *Folia* ternia, rhombico-subrotunda, apice serrata, punctata, subincana, longe petiolata, unguicularia. *Racemus* nudus terminalis, e verticillis remotiusculis compositus. *Flores* pallidi. *Calyces* punctati.

Ex horto halensí.

61. *LATHYRUS CORNUTUS*, pedunculis unifloris muticis, cirrhis tetra- hexaphyllis, foliolis lanceolatis alternis obtusiusculis, vexillo utrinque appendiculato.

Dolichos esset, ni totus habitus alienus et character Lathyri in stylo applanato manifestus fuerit. *Planta* annua omnino glabra. *Caulis* flexuosus decumbens, alatus. *Stipulae* lanceolato-falcatae.

Folioli latissime foliacei. *Foliola* ultra pollicem longa, lanceolata, obtusiuscula, mucronulata, nervoso-venosa. *Circhi* trifidi. *Pedunculi* axillares, reflexi, fructiferi elongati. *Corollae* vexillum purpureo-violaceum, basi utrinque tuberculis appendiculatum. *Carina* alba obliqua. *Legumen* glabrum ensiforme acutum.

Hort. halens.

Vicia MICHAUXII, leguminibus sessilibus reflexis subdispermis, foliis lineari-lanceolatis mucronatis ciliatis.

Adspici V. peregrinae, sed huius foliola emarginata, multo longiora, glaberrima, legumina pubescentia. Nostrae foliola apice rotundata mucronulata, ciliata; legumina glabra. Stipulae subulatae, macula fusca notatae.

Ex horto halensi.

63. *HEDYSARUM GRANULIFERUM*, foliis ternatis subrotundis retatis subtus sericeis; pedunculis axillaribus villosois, leguminibus monospermis. *Rami* villosi sublignosi, patentes. *Folia* ternata; foliola lineam lata et longa, subrotunda, rugosa, supra glabra reticulato-venosa, subtus sericea. *Pedunculi* et *calyces* tomentoso-villosi. *Corolla* purpurea. *Legumen* sericeum, subrotundum, monospermum.

E Guinea. *Thonning*.

Accedit ad H. canescens, quod vero abunde differt floribus racemofo-paniculatis.

64. *ASTRAGALUS PALLASII*, caulescens adscendens villosus, foliolis linearibus pilosis, racemis pedunculatis axillaribus folia excedentibus, leguminibus lanceolatis acuminato-uncinatis glabriusculis.

Simillimus A. microphylo, cuius nomine *Pallasius* Ill. misit. Differt autem foliis non ovatis obtusis, sed linearibus, stipulis ovatis, nec

subulatis minimis, calycibus pilosissimis, nec glabriusculis, leguminibus lanceolatis nudiusculis, nec subrotundis villosis. Simillimus etiam A. lanato P all. astrag. t. 81., qui vero differt caule prostrato, pedunculis folia non excedentibus et leguminibus villosis.

Ad mare calpium inventus. *Pallas.*

65. *SONCHUS CAUCASICUS*, foliis sessilibus, inferioribus cordatis dentatis, superioribus integris hispidis, pedunculis squamosis.

Caulis orgyalis, herbaceus, ramosus. *Folia* inferiora cordata, grosse dentata, acuta, utrinque scabra, petiolis late alatis, ramea integerrima, hispida, ciliata, obtusa amplexicaulia. *Panicula* pauciflora, ramis patentibus. *Pedunculi* squamosi. *Flores* lutei.

E Caucaſo.

66. *SERRATULA SALSA*, foliis radicalibus lyratis, caulinis lanceolatis decurrentibus basi dentatis, corymbo composito.

Similis S. multiflorae, quae vero differt foliis omnibus lanceolatis integerrimis subtus villosis.

Ad lacum Baikal invenit *Redowsky.*

67. *CARDUUS ASTRACANICUS*, foliis sessilibus rigidis lanceolatis dentato-pinnatifidis subtus lanatis, lacinii spinosis, calycibus globosis tomentosis, squamis lanceolatis spinosis divaricatis.

Cum Cnico echinocephalo *Willd.* facile commutandus, ni pappus constanter esset setosus, folia non exacte pinnatifida, subtus potius lanata, quam tomentosa, calycis laciniae non purpurascentes.

Caulis adscendens, dodrantalis, rectus. *Folia* lanceolata, basi angustata, inferiora dentato-spinosa, superiora subpinnatifida, lacinii spinosis, omnia subtus albissima lana recta. *Calyces* pauci in apice ramorum, subtomentosi, squamis patentissimis spinosis viridibus. *Flores* pallidi.

E Serepta missus.

Ad Cardum orientalem Adami (Weber et Mohr: Beyr. t. 63.) proxime accedit. His vero folia habet semidecurrentia et squamae ovatas erectas.

68. **CHRYSOOMA AYTOMI**, fruticosa, foliis obovatis sericeo-tomentosis integerrimis.

Caulis fruticosus ramosus. Ramis terebinthaceis. Folia obovata, obtusa, utrinque sericeo-tomentosa, nervosa, petiolata. Flores subcorymbosi sessiles. Calyces tomentosi. Corollulae albae.

Ex horto Kewensi.

69. **ELICHAYUM KATTANOROSOR**, fruticosum erectum, foliis ovatis crassis canaliculatis punctatis nudis appressis, calycibus pubescentibus.

Singularis et africanus eminens habitus.

Rami incano-tomentosi. Folia laevia, crassa, acuta, punctata, appressa, canaliculata, lineam longa. Calyces terminales, sessiles, imbricati, tomentosi, squamis acutiusculis: squamis internis scariosis albidissimis. Totus flos pisum mole non superans.

Ex interiore Africa attulit Sparmanus.

70. **SOLIDAGO LITORALIS**, caule subramoso incano, foliis obovatis serratis incanis, pedunculis patentibus unifloris squamosis, ligulis elongatis.

S. minutae proxima, ut, si praepressis Bocconi iconem (musco di piante rare t. 118.) comparaveris, facile eandem esse tibi persuaseris. At cunctis partium onthium, folia obovata et corymbi defectus, cuius loco pedunculi uniflori apice caulis biuncialis.

E litore maris tyrrhenici. Savi.

71. **CINERARIA CALEDONIAE**, floribus corymbosis radiatis, foliis oblongis sinuato-pinnatifidis inaequaliter dentatis utrinque nudis, petiolis alatis amplexicaulibus.

Caulis suffruticosus, bipedalis videtur. *Folia* petiolata, petiolis alatis amplexicaulibus. Pelargonii quercifolii speciem fere prae se ferunt: sinuato-pinnatifida, laciniis obtusis inaequaliter dentatis, bipollicaria, utrinque nuda; superiora lanceolata inciso-dentata, sessilia aut amplexicaulia. *Corymbus* terminalis, viscoso-pubescent, foliis suffultus. *Calyx* aequalis polyphyllus, apice non sphacelato. *Radius* albus: discus flavus.

E nova Caledonia. *Forster.*

72. CINERARIA AITONIANA, floribus corymbosis radiatis, foliis pinnatis utrinque tomentosis inciso-dentatis, pinnula extima quinqueloba.

Caulis frutescens, albo-tomentosus, subsimplex. *Folia* pinnata, petiolata, petiolis basi auratis, utrinque tomento albo obducta, pinnulis lateralibus oblongis horizontalibus inciso-dentatis, extima subcordata quinqueloba dentata. *Corymbus* compositus terminalis, ramis calycibusque nudiusculis. *Radius* purpurascens, discus flavus.

Ex horto Kewensi.

73. CHRYSANTHEMUM MACROPHYLLUM; (Leucanthemum,) foliis oblongo-lanceolatis sessilibus serratis basi integerrimis.

Proximum Chr. Leucanthemo, *diversum tamen foliis caulinis multo latioribus, basi haudquaquam incisae sed integerrimis, et statura multo altiore.*

Hort. halensis,

74. PERETHAUM FRUTICULOSUM (Leucanthemum) foliis bipinnatifidis incanis, pinnis extimis confluentibus incisae, laciniis obtusis, caule virgato, floribus corymbosis, radio calycem triplo excedente.

Simillimum P. parthenifolio Willd., *sed differt canitie foliorum et laciniis obtusis, quae in*

aut sericeus, qualem et in *Pimelaea* speciebus et aliis fruticibus arboribusque insularum australium animadverto. *Petioles* canaliculati; villosiusculi. *Folia* lanceolata, tripollicaria, pollicem fere lata, integerrima, coriacea, nervosa, acutiuscula, utrinque glabra. *Pedunculi* axillares, aggregati, cernui, angulati; sericeo-villosiusculi. *Calyx* fere clausus, pentaphyllus, fulvus. *Antherae* 20 et ultra in calyce clausa, staminibus brevissimis, *Ovarium* in 2 obtusum, 4-loculare. *Receptaculum* in utroque sexu setoso-villosum.

Ex insula Tanna. *Forster*.

81. *TERMINALIA CORIACEA*, foliis obovatis coriaceis obtusissimis basi eglandulosis integerrimis utrinque glabris.

Posset omnino cum T. glabrata Forst. coniungi, ni folia aliena essent. Nostrae enim coriaceae flavida, bipollicaria, obtusissima: T. glabratae vero membranacea, saturate viridia, quadripollicaria, duos pollices lata, apice attenuata obtusiuscula.

E Zeylona. *Rottler*.

82. *ASPLENIUM AMBIGUUM*, fronde pinnata, pinnis subpetiolatis lanceolato-falcatis attenuatis obtuse serratis basi angustatis, indusiis utrinque dehiscentibus, stipite laevi.

Ex herbar. *Römeri Turic.*

Cum A. falcato non confundendum, quod pinnas trapezoiden-falcatas habet (Burm. zeyl. p. 43.). Singulare in hoc, quod indusia utrinque dehiscant, medium ergo locum inter Asplenium et Caenopteridem (Darcam Smith.) occupat.

83. *GRIMMIA GEBHARDI*, caulescens, foliis lanceolatis canaliculatis nervosis siccitate subtortilibus, capsulae pyriformis erectae operculo curvirostro.

In monte Baldo. *Gebhard*.

Possset cum Weisia recurvirostra Hedw. commutari; at huius capsulae cylindricae et foliis siccitate non tortilibus.

34. GRIMMIA CANESCENS, trunco subramoso, foliis lanceolato-acuminatis nervosis, apice longo canescentibus, capsula cylindrica breviter pedicellata.

In rupibus Valleisae. *Schleicher.*

A Grimmia apocarpa facile distinguitur foliis omnibus apice producto canescenti.

35. DIDYMODON TORTILIS, trunco erecto subsimplici, foliis lanceolatis nervosis siccitate tortilibus, seta axillari, capsula curvata cylindrica.

In montibus Italiae borealis. *Gebhard.*

Similis Barbulae unguiculatae, cum nulla alia sui generis commutandus.

36. LESKEA EXTENSA, trunco procumbente diffuso, ramis erectiusculis, foliis siccitate appressis imbricatis lanceolatis acuminatis nervosis, capsula erecta cylindrica.

In comitatu Glatz invenit *Seliger*, misit *Starkius*.

A L. subtili, cum qua confundi posset, diversa foliis nervosis, et capsulis erectis.

37. BRYUM WHIGLII, trunco erecto ramoso, foliis lanceolatis integerrimis nervosis subdecurrentibus pellucidis patulis, seta elongata, capsula cernua cylindrica.

In Sudeticis montibus ad pagum Roth-Zechau invenit *Weigelius* Silesiacus: misit amicissimus *Starkius*, idem existimans cum *Br. cubitali Dickf. fasc. 2. 9. tab. 5. f. 2.* sed huius folia sagittata, capsulae claviformis.

Maximum etiam habet *Dicksonius* inter *Brya* nota, quod in nostrum non quadrat.

88. *HYPNUM GERRARDII*, trunco vage ramoso, ramis subsimplicibus incurvatis, foliis elongato-lanceolatis acuminatis secundis tortilibus integerrimis enerviis, seta curvata, capsula cornua longicollis.

In montibus Italiae borealis. *Gebhard*.

Ad H. molluscum quodammodo accedit, sed abunde diversum habitu, foliis integerrimis tortilibus, ramorum dispositione et seta constanter curvata.

89. *HYPNUM RUPESTRE*, furculis erectis subsimplicibus, foliis ovatis obtusiusculis integerrimis enerviis subsecundis, capsula nutante.

In monte Simplon ad rupes humidias invenit *Schleicher*. Nulli alii adfuit.

90. *LECIDEA GLAUCO-PRASINA (Lepidoma)* crassa effusa imbricata lobata glauco-prasina, lobis minutis, patellulis fulco-badiis mammillatis.

In cortice *Laurus Cassiae*.

Locus inter L. luridam et scalarema.

91. *LECIDEA CINCHONAE (Saphenaria)* thallo membranaceo depresso sinuato-lobato candido, patellulis convexis atris immarginatis.

In cortice *Cinchonae Condamineae Humb.*

Simillima L. Cocoës, sed patellulae non marginatae, non planae.

92. *LECIDEA GYROPHOROIDES (Omphalaria)* thallo submembranaceo umbilicato, margine eroso, supra pustulato cinereo, subtus lacunoso lurido, patellulis planiusculis atris, margine et disco subflexuosis triaëformibus.

E Pennsylvania. *Mühlentb.*

Accedit ad L. pustulatam, sed colore thalli et patellularum forma differt.

93. **VERRUCARIA CASSIAE**, crusta laevi olivacea tartarea, verrucis papillatis rubro-fuscis. $\frac{1}{2}$

In cortice *Laurus Cassiae*.

94. **PARMELIA LUDWIGII** (Lecanaria) crusta tartarea rimosa dispersa flavida, areolis convexis rotundatis, scutellis tumidulis bruno-nigris, margine pallido.

In montibus sudeticis invenit *Ludwigius*.

Accedit ad P. ventosam, praesertim ad varietatem P. lepadolemma: differt tamen haec crustae granulatae colore virescente.

95. **PARMELIA CINCHONAE** (Lecanaria) crusta tartarea subfarinosa pallide flava, scutellis elevatis planis nigris nitidis, margine et substantia fulvureis.

In cortice *Cinchonae*.

Locus inter P. coracinam et grumosam.

96. **PARMELIA INCONSPICUA** (Lecanaria) crusta tartarea dispersa cinereo-alba, scutellis planis elevatis fordide incarnatis, margine tenuissimo albido.

In cortice *Cinchonae*.

Locus inter P. craspediam et salicinam.

97. **PARMELIA TUMIDULA** (Lecanaria) crusta tartarea subeffusa alba verruculosa, verrucis scutelliferis tumidis, scutellis fuscis planiusculis.

In Cortice *Cinchonae*.

Locus inter P. fuscam et puniceam.

98. **PARMELIA CERANIUM** (Collema) thallo submembranaceo crispo plumbeo, lobis inflatis, scutellis urceolatis rufo-fulvis, margine integro.

In cortice *Cinchonae*.

Accedit ad P. bullatam (Achar. n. 129.), quae vero thallo vesiculoso differt et scutellis convexis.

99. *PARMELIA APPRESSA* (Lobaria) thallo membranaceo appresso glabro pallido lobato, lobis elongatis subintegris planis, scutellis planiusculis badiis.


In cortice Cinchonae.


Locus inter *P. perlata* *et* *perforata*.

100. *PARMELIA PENNSYLVANICA* (Lobaria) thallo subcoriaceo expanso lobato supra ochroleuco laevi subtus fusco fibrilloso, margine lobato, scutellis convexiusculis badiis.

¶ Pennsylvania. *Muhlent.*







CURT. SPRENGEL,

PROF. BOT. HAL.,

OBSERVATIONES

BOTANICAE

IN

FLORAM HALENSEM.

MANTISSA SECUNDA.

HALAE

CVNTIBVS KÜMMELII 1811.

CURT SPRINGER

PHOTOGRAPHY

OBSERVATIONS

OF THE

ORGANIZATION

AMERICAN ASSOCIATION

PART II

THE ORGANIZATION

die 1. mensis Martii 1847. Hic die
1847. Hic die 1847. Hic die 1847.
1847. Hic die 1847. Hic die 1847.
1847. Hic die 1847. Hic die 1847.
1847. Hic die 1847. Hic die 1847.
1847. Hic die 1847. Hic die 1847.

Triennium est, cum primum florae Ha-
lenfis supplementum edidi. Ex eo au-
tem tempore meis minus quam amico-
rum sedulitate novas flora nostra divitias
acquirit: ipse melius notas plantas exa-
minavi, loca natalia studiosius investiga-
vi, dubiis plantis certiore adiudicavi
locum, variaque collegi, quae tironibus
usui esse ac rem herbariam augere existi-
marem. Quae, divini illius praecepti:
ἀργύρομ, τὸς ἡμέρας ἵστῶν, memor, ne diutius
in adversariis lateant, divulganda ac exa-
mini publico submittenda esse arbitratus

[illegible]

1. **VERONICA SPURIA**, fl. hal., manifesto varietatem *V. foliolae* inveni: namque folia huius ut plurimum inaequaliter serrata, si gracilior est habitus, aequaliter sunt serrata. Itaque releganda est illa species e flora nostra.

2. **VERONICA HYBRIDA**, fl. hal., quam in mant. prima n. 1. varietatem credidi *V. spicatae*, nequaquam ambigo pro eadem habere. Neque tamen inde veram Linnaeanam plantam huc trahendam esse existimo, cum eam in horto cultam curatius observaverim. Distinguitur toto habitu et praesertim foliis radicalibus ovatis petiolatis.

* 3. **UTRICULARIA MINOR**, nectario carinato brevissimo obtuso, labio superiori emarginato, foliis tripartito-dichotomis. *Pluken t. 99. f. 6. Bocc. mus. t. 14. Schmidel t. 21. f. 1.*

In palude ad Benndorf. Maio. 24.

Utriculariam vulgarem, nectarto contico, foliis pinnato-multipartitis, Bächius medicus in palude ad Weissenfels invenisse testatur.

4. **FEDIA DENTATA**, scabritie et Ieriore anthesi illico a *F. olitoria* dignoscitur. Floret enim post solstitium aestivale inter segetes. Primam rammi fructiferi iconem exhibuit Fab. Columna (*Cephras. stirp. p. 209.*), optimam *Fl. dan.* 738.

- * 5. *Scirpus strictus*, culmo teretiusculo foliato, foliis canaliculatis linearibus, floribus fasciculatis. *Eagl. bot.* 1575.

In palude der Heide, links vom Dölauer Wege, Jun. 24.

Perperam in mant. 1. n. 3. pro varietate Sch. albi (Rhynchosporae Wahl.) habui. Hic differt stylo persistente rostrato, qui caducus est in illo, staminibus tribus, cum duo habeat suspens, setis subulnis ad basin germinis, cum suspens habeat subternas. Tota planta tenerior albo, folia fere floribus longiora.

- * 6. *Scirpus ovatus*, radice fibrosa, culmo compresso nudo monostachyo, vaginis aphyllis glaucis obtulis, setis receptaculi lenis. *Fl. dan.* 372.

Auf der grossen Wiese bey Pallendorf. Jun. 20.

N. Differt Sc. palustris maiore altitudine, radice repente, glumis acutis, setis receptaculi quaternis.

- * 7. *Panicum glabrum* (*Syntherisma Schrad.*), spicis subdigitatis alternis, floribus geminis muticis scabris, altero pedicellato altero sessili, foliis vaginisque glabris. *Schk. t. 10. Schrad. fl. germ. t. 3. f. 6.*

Ad Oberriesdorf auf dem Stoppelacker. Sept. 20.

Glabritie et humiliore statura a P. sanguinali differt. Os vaginarum cetero pilosum.

- * 8. *Holcus mollis*, quem exulem habui in mant. 1. n. 10., vere occurrit ad Eisleben, am Käthelhölschen, wenn man dasselbe zur linken Hand hat. *Bot.*

- * 9. *Elymus hystrophylus* et *horvaciulus*, fl. hal., vere eadem esse, iam cum Schrad.

Aleur. Namque: fustulo comparatis innume-
ris exemplaribus, et collatis cum *F. hetero-*
phylla Haenk. [Jacqu. coll. 2. 93.] ex-
ploratum habeo, folia inferiora complicato-
setacea vel triquetro-filiformia, culmea plati-
uscula, flo. plerumque glabra, interdum quo-
que pubescentia, glumas corollinas post an-
thesin patulas remotiusculas, interiores cilia-
tas, aristulis varia longitudine, modo glumas
aequantibus, modo excedentibus.

- * 10. *BROMUS RACEMOSUS*, paniculae erectae ramis
simplicibus, spiculis oblongo-ovatis compres-
sis subsexfloris glabriusculis, glumis obtusis,
aristis rectis glumas aequantibus, foliis vaginis-
que pilosis. *Morif. vol. III. sect. 8. t. 7. f. 19.*
Engl. bot. 1679.

Auf den Wiesen von Eisleben nach Oberriesa-
dorf unweit des Schielshauses. Iun. ♂ *Hbk.*

- * 11. *AVENA ORIENTALIS*, panicula secunda con-
tracta, flösculis geminis glabris calyce mino-
ribus, altero mutico, radice fibrosa aeterna.
Haller nov. comm. Gott. VI. t. 4. f. 33. 34.
Inter segetes ad Eisleben. Iul. ☉ *Hbk.*

- * 12. *AVENA TENUIß*, panicula aequali, calycibus
subtrifloris, flösculis calycem excedentibus su-
perioribus triaristatis, foliis subpubescentibus,
ligula elongata. *Leers tab. 9. f. 3.*

Ad Eisleben im Kätherhöltschen, am sonnigen
Abhänge nach Wimmelburg. Iun. ☉ *Bok.*

- * 13. *ARUNDO ACUTIFLORA*, *Schrad.*, calycibus
unifloris acuminatis, panicula patente, pilis
corolla brevioribus, aristula dorsali geniculata
calycem subaequante.

In nemoribus ad Lodersleben. Iul. 24 *Wall-*
roth.

- * 14. *ARUNDO CALAMAGROSTIS*, calycibus unifloris, arista terminali brevi curva, pilis corollae longioribus. *Engl. bot. t. 403. Schrad. fl. germ. t. 4. f. 4.*

In nemorosis ad Lodersleben. *Wallroth.*

Hanc et priorem cum *A. epigeio* olim commutatas ita distinguo ut in *A. ep.* aristam dorsalem rectam, in *A. acut.* aristam dorsalem geniculatam, in *A. Calam.* aristam terminalem curvam, in *A. ep.* pilos corollam aequantes, in *A. acut.* pilos corollae breviores, in *A. Calam.* pilos corollae longiores notem.

- * 15. *GALIUM TRICORNE* Smith. SPURIUM L., *APARINE* L. et *VALANTIA APARINE* L., quomodo differunt?

Galium spurium, fructu laevi, foliis subsexis linearilanceolatis retrorsum aculeatis, pedunculis subtrichotomis. *Cl. Roth neue Beytr. 141.*

Galium tricorne, fructu granulato, foliis suboctonis retrorsum aculeatis, pedunculis subtrifloris. *Vaill. t. 4. f. 3. aa.*

Valantia Aparine, fructu tuberculato, foliis suboctonis antorsum aculeatis, pedunculis trifloris, floribus masculis pedicellatis, hermaphrodito neutro. *Vaill. t. 4. f. 3. b.*

Galium Aparine, fructu hispido, foliis octonis lanceolatis retrorsum aculeatis, pedunculis subbifidis. *Fl. dan. 495. Engl. bot. 816. Curt. n. 17. Lobel. stirp. obs. 464.*

Omnia haec quatuor sibi simillima inter segetes et in versuris vulgaria Iunio occurrunt. ☉

16. *PLANTAGINIS LANCEOLATAE* varietas memorabilis nuper ad Breitungem in comitatu Stollbergensi a *Wallrothio* inventa, quam fusius describere libet.

Est plantula digitalis, foliis e radice fibrosa numerosis in rosaceum caespitem congestis, exacte lanceolatis, utrinque attenuatis, supra spinus, subtus magis pilosis, ceterum viridibus, trinerviis, margine tri-quadridentatis, longitudine pollicis unius, latitudine sesquilineae. Caespitium centrum occupatur lana candida longa densa, qualis in Plantagine barbata, Wulffentii, et maritima occurrit. Scapus digitalis quadrangulus, rectus, pilis appressis asper. Spica exacte ovata, nuda, bracteis calyces aequantibus.

Peculiaris species esse nequit, cum characterem totum *Pl. lanceolatae* servet, lana centrali et exigua statura exceptis. Iconum seriem perlustranti nulla obvia est omnino plantulam nostram referens.

Pl. lanceolata I. Bauh. hft. III. 506. f. 1. simillima, sed lana centralis desit.

Pl. minor Dodonaei Dalechamp. hft. 1255. similis, sed lana centralis desit.

Pl. minor Dodon. pempt. 107. satis dissimilis, spica etiam magis oblonga.

Pl. incana trinervia montana Column. ophraf. 1. 258. f. 2. similis, sed denticuli foliorum et lana non adsunt.

Pl. angustifolia minima Zannichell. flor.

Provenit in colle arido saxoso hinter dem Pfarrhaufe in Breitungon.

17. *PLANTAGO* mea *Wulffentii* est mera varietas *Pl. maritimae*. Sed examen meum occasionem praebuit curatius investigandae plantae, quam *Wulffentius* in *Iacqu. coll.* 1. 204. descripsit: haec enim iam peculiaris species, nomine *Pl. Wulffentii*, habetur. Sic error veritatem parit!

- * 18. *Veronica prostrata*, foliis radicalibus ovatis nudis rugosis subsessilibus subcrenatis, caule subnudis racemoso. *Gerard. emac.* 776.
Auf der Steinklippe bey Wangen an der Unstrut.
Jun. ♂ *Wallroth*.

19. *Chironia Centaurium, Pulchella* et *inaperta*, olim distinctae, repetito examine in eandem incidunt speciem, quamvis *Gentianam pulchellam* *Swartz.* peculiarem speciem habeam. Nostrae autem, pro soli vicissitudine et diei tempore, corollam habent vel magis vel minus apertam, lacinias calycinas vel longiores vel breviores, caulem magis vel minus ramosum, subsessiles etiam aut pedunculatos flores, unde aegre concederem *Perfoonio*, Ch. ramosissimam floribus pedicellatis, *Centaurium* floribus sessilibus distinguentem.

Sed bene post *Richardium* *Perfoonius* et *Willdenovius* plantam nostram cum adstantibus ab exoticis *Chironiis* distinxerunt nomine *Erythraeae*. Utrique quidem antherae spirales, sed huius corolla infundibuliformis, illius rotata; huius capsula uni-illius est bifolcularis. Igitur loco *Chironiae Centaurii, inapertae* et *pulchellae* unica ponenda est

Erythraea Centaurium Richard.

- * 20. *Gentiana ciliata*, corollis quadrifidis, laciniiis serratis medio inciso-serratis, foliis lanceolato-linearibus, caule angulato subuni-flo-ro. *C. Gesner opp. tab. lign. IX. f. 81. Column. ephraf. I. p. 221.* [*Gentianella coerulea fimbriata autumn.*] *Sturm* 23.

Auf dem Buchberge bey Ziegelrode. Sept. 24

Knauth. et Leyss. ad Schmon indicant, ubi, quantum meminimus, haud reperitur. Wallrothius, juvenis egregius, eam florae nostrae vindicavit.

21. *SELINUM SYLVESTRE*, quod olim a *palustri* separatum tradidi, iam distinguere nequeo, cum plures indies medias formas invenio et *S. sylvestre* e *Loderslebia* transplantatum in horto colo. Est enim omnino et hoc idem cum *palustri*: et persualum habeo, caulem striatum, radicem multiplicem aut simplicem, caulem magis aut minus ramosum, lacinulas foliorum magis cuspidatas aut obtusiusculas, involucri foliola tenuiora vel latiora margine membranacea, stylos postremo rectos aut divaricatos nullum posse discrimen certum inter utramque speciem statuere. Icones etiam *Dodon. p. 699.* et *Morif. III. sect. 9. t. 17. f. 2. S. palustre* pariter repraesentant ac *sylvestre*. *Selinum sylvestre* *Candoll.* quod *Parisienses Athamantam flexuosam* dicunt, quamvis verum *Selinum*, tamen longe alia planta. Est enim *S. Cervaria*.

22. a. *PEUCEDANUM SILAUS*, fructu ovato solido, costis quinque acutis valleculis cavis alternis, recedit a *Peucedani* genere, quod fructum habet ovalem compressum alatum, iugis obtusis quinque approximatis. Congenera *Silao* sunt *Selinum Monnerii*, *Athamanta chinensis*, *Seseli Hippomarathrum* et *S. leucospermum* *Schrad.* Pertinent ad genus *Cnidium* *Cusson.*, de quo alibi uberius.

23. *SELINUM PRATENSE*, verum *Seseli* est, ut iam e seminibus maturis liquet. Itaque nomen *Seseli venosi* *Hofm.* restituendum.

24. *OENANTHE PEUCEDANIFOLIA*, a *Krussio* paedagogo ad *Trebnitz* inventa, valde dubia est, cum nec ego nec discipuli per quinque annos eam invenire potuerimus.

25. *Sium NODIFLORUM*, relegandum e flora nostra. Qui primus eam invenisse credidit, veram

- * 18. *Verascum prostratum*, foliis radicalibus ovatis nudis rugosis subsessilibus subcrenatis, caule subnudis racemoso. *Gerard omac.* 776.

Auf der Steinklippe bey Wangen an der Unstrut.
Jun. ♂ *Wallroth*.

19. *Chironia Centaurium, pulchella* et *inaperta*, olim distinctae, repetito examine in eandem incidunt speciem, quamvis *Gentianam pulchellam Swartz.* peculiarem speciem habeam. Nostrae autem, pro soli vicissitudine et diei tempore, corollam habent vel magis vel minus apertam, lacinias calycinas vel longiores vel breviores, caulem magis vel minus ramosum, subsessiles etiam aut pedunculatos flores, unde aegra concederem *Perfoonio*, *Ch. ramosissimam* floribus pedicellatis, *Centaurium* floribus sessilibus distinguentem.

Sed bene post *Richardum Perfoonium* et *Willdenovium* plantam nostram cum adfinibus ab exoticis *Chironiis* distinxerunt nomine *Erythraeae*. Utrique quidem antherae spirales: sed huius corolla infundibuliformis, illius rotata; huius capsula uni-illius est bilocularis. Igitur loco *Chironiae Centaurii, inapertae et pulchellae* unica ponenda est

Erythraea Centaurium Richard.

- * 20. *Gentiana ciliata*, corollis quadrifidis, laciniiis ferratis medio inciso-ferratis, foliis lanceolato-linearibus, caule angulato subuni-floro. *C. Gesner opp. tab. lign. IX. f. 81. Column. ephraf. I. p. 221.* [*Gentianella coerulea fimbriata autumn.*] *Sturm* 23.

Auf dem Buchberge bey Ziegelrode. Sept. 24

Knauth. et Leyss. ad Schmon indicant, ubi, quantum meminimus, haud reperitur. *Wallrothius*, iuvenis egregius, eam florum nostrae vindicavit.

ruit, ideoque nomen cum *O. villosa* commutavit. Itaque

O. villosum, foliis radicalibus geminis, floralibus imis oppositis, pedunculis ramosis corymbosis petalisque hirsutis. *Sturm. I. 12.*

28. *Juncus nemorosus*, delendus e flora halensi. Est enim *J. campestris*, paullo magis racemosus, petala non sunt ciliata. Sed *campestris*, *villosus* et *albidus* differunt a reliquis capsula uniloculari trivalvi trisperma, seminibus receptaculo centrali adfixis. Reliqui *Junci* habent capsulam triloculatam polyspermam, valvulis medio septiferis. [Cf. *Gaertn. Fr. tom. 1. tab. 45.*] Hinc cum *Candolle* id discrimen primo observante et *Willdenowio* *Luzulam* appellamus prius genus.

29. *Epilobium roseum* Schreb. nil est, nisi varietas *E. montanum* L. Folia enim in hoc opposita, in illo quandoque superne alterna sunt.

30. *Epilobii angustifolii* synonyma confusa sunt, nec nisi aegerrime extricantur. Etenim *Lythmachia Chamaenerion* dicta *angustifolia* *Bauh. pin. 245.* plures coniungit species. Antiquissimas et verissimas icones habet sequentes:

Dalechamp. hist. 865.

Parkinson parad. 267.

J. Bauh. hist. II. 906.

31. *Euphorbia dulcis* dubia. Eius loco *E. platyphyllon* semper inveni, praesertim ad *Dieskau*.

32. *Ranunculus auricomus* nostras nullo modo a *R. cassubico* differt. *Willdenowius* nullum discrimen nescit, nisi foliola caulina lanceolata dentata (iuxta *Loefelii* iconem)

plantam non cognovit. Statim exemplar
quod nuper mecum communicavit, habet fo-
liola inaequaliter et incisè serrata, umbellas
pedunculatas et caules erectas; unde *S. au-
gustifolium* esse nullus dubito.

ALLIUM ARENARIUM cum *SCORODOPRASO* in flor.
hæc mihi commutavi. Illud vaginis foliorum te-
retibus, foliis latioribus margine integerrimis,
umbella maiore distinguitur. *Icones fl. dan.*
290. et *Rupp. ien. t. 2. f. 2.* (ed. et *Fuchs.*
p. 737. (*Allium sylvestre primum*) huc per-
tinent. Provenit verum arenarium rarius in
monticulis ad ripam Unstrut, auf der Stein-
klippe bey Wangen, ubi primus *Wallro-*
th invenit.

Allium Scorodoprasum vero foliis crenu-
tis angustioribus, vaginis ancipitibus, umbel-
la minore et corollis raro efflorescentibus,
caule etiam ante anthesin convoluto differt.
Icon prima apud *Clusium hist. t. p. 191.*
(*Scorodoprasum* 4.) Commune hac nemoribus
et collibus nostris.

26. *ORNITHOGALUM LUTEUM*, Perloonio primo
(*Usteri ann. XI. 7.*) diu etiam *Hoppio*
et *Willdenowio* monentibus, in duas di-
ducitur species, nimirum

O. sylvestre, bulbo solitario, folio radicali
solitario lineari-lanceolato. *Fl. dan.* 378. et
Reichm. spec. hist. pl. t. 90.

In nemoribus et dumetis nostris. Apr. 24.

O. luteum, bulbo aggregato, folio radicali
solitario lineari. *Perf. l. c. t. 2. f. 1.*

In pratis et pascuis. Apr. 24.

27. *ORNITHOGALUM MINIMUM*, florae nostrae ut
omnis Germaniae haud Linnæanum esse *Bie-
bersteinius* (*flor. taur. cant. t. 274.*) bene mo-

Facillime confunditur cum Brassica Napo. quae differt anthesi praecociori et radice caulescente fusiformi; Sinapis hrvensis differt calyce patentissimo, foliis omnibus sublyratis; Raphanus, Raphanistrum calyce clauso, siliquis artocollatis torosis et corolla pallida. In Brassica enim campestris calyx patentissimus; reliquae teretes, rostratae, et corolla aurea.

35. *SILVARIUM sylvestre*, vulgatissimum test in locis humidis: pertinet huc fl. dan. 931. S. terrestre rarius, ita definiendum: foliis pinnatifidis, laciniis ovatis incisus inaequaliter dentatis, petalis calyce brevioribus. fl. dan. 409. S. *amphibium*, foliis oblongis indivisis serratis.

36. *RUCA DUMETORUM*, auf der Steinklippe bey Wengen et auf der Hüneburg bey Eisleben frequens.

37. *TRIFOLIUM DENTATUM*, auf der Wiese bey Eisleben, wenn man von der Zellerwiese nach dem Oberrielsdorfer Grunde geht. Bök.

Bona, quod tam Tournesfortius, Adansonius et Lussivius fecerant, Willdenowius nuper Melilotum a Trifolio distinguit. namque praeter inflorescentiam racemosa, illius. huius spicato, capitataque, corolla est persistens in hoc, in illa decidua, legumen illius dehiscentes calyce longius, huius evalve calyce tectum.

Melilotus officinalis igitur, quem flore aureo et albo variare dixi, in duas, Haenke doctente, species dirimitur:

M. officinalis, leguminibus racemosis dispersis ovatis acutis, carina et alis longitudine vixit. [Corolla flava.]

M. vulgaris, leguminibus racemosis monospermis obovatis acutis, alia carina longioribus vesicillo brevioribus. [Corolla alba.]

38. *HIERACIUM DUBIUM* ita definiendum: scapo subquadrifloro, foliis oblongis subintegerrimis, glabris undulatis basi ciliatis, stolonibus reptantibus.

39. *CNICUS BRIOPHORUS*, auf der Hüneburg bey Eisleben, nach Wimmelburg zu. *Bok.*

40. *ANTHEMISIA SALINAM* iam *Valerius Cordus* ad lacum salsum prope Seeburgum invenit. Indicat enim ibi *Scrophitum*, i. e. *Asinthium marinum*. (*Sylv. var. obs. f. 223. b. ed. Conr. Gesner.*)

41. *CONYZA squarrosa*, in der Lindenschlacht bey Seeburg, und auf der wüsten Burg bey Born-Radt.

42. *ORCHIS sambucina*, labello subdentato trilobo lobo medio emarginato, calycis foliolis obtusiusculis exterioribus reflexis, calcare inflato conico germen aequante, bracteis longitudine florum coloratis. *Tacqu. austr. t. 108. Clus. 1. 269. [pannonica VIII.]*

Hinter Krosigk im Holze nach Löbejün zu; im Kätherhölzchen bey Eisleben; bey Bischofroda im Neckendorfer Grunde. Mai. 24.

O. latifoliae simillima bulbis palmatis, bracteis longis et statura: sed odor sambucinus, color pallide flavus et maxime lobus medius labii emarginatus hanc manifestant.

Cum O. pallente commutata fuisse videatur. Namque Leysserus hanc indicat; quae differt bulbis subrotundis simplicibus non palmatis, cornu ascendente, ut in O. Morione, labello subvillose

multofo quadrifido integerrimo. Cf. Haller.
Strep. helv. t. 30.

- * 43. *MALAXIS LÖSELI*, foliis binis oblongo-lanceolatis, scapo trigono, labello apice ovato recurvato. *Fts. dun. 877. Loesfel. pruss. t. 58. Richer. de Belleval icon. t. 261. Dbdon. p. 242. (Bifolium bulbosum) I. Bauh. hist. II. 770. fig. superior.*

Auf der Benndorfer Wiese bey Delitsch copiose,
 Mado. 24.

44. *EPIPACTIS ANSEPOLA* in sylvis ad Erdeborn et Memleben.

45. *MELIUS CALLITRICHE* inter monoicas militat, cum flores hermaphroditi rarissimi sint. Species tres olim distinctae melius a *Smithio* coniunguntur in unam, cui nomen *C. aquaticae* impertit. *C.* saltem vernalis per Octobrium floret, foliis subrotundis integerrimis, aliis paullo emarginatis, inferioribus spathulato-linearibus, ut bifida dici possint. ☉

- * 46. *CHARA TOMENTOSA*, caulibus spongiosis subhispidis, ramulis basi foliosis, foliis teretibus obtusiusculis. *Morif. III. sect. 15. t. 4. f. 9. [Pluken. t. 29. f. 4. obscura icon, Ceratophyllo similis.]*

Copiosa in stagnis prope Wansleben.

47. *CHARA FLEXILIS* a *Wallrothio* prope Rolleben inventa.

48. *EQUISETUM PRATENSE Ehrh.*, quod *Willdenowio Spec. plant. tom. V. p. 6.* ignotum, vere provenit in nostris regionibus. Ab *E. arvensi*, cui simile, differt caulibus ramosis fructificantibus, ramis strictis scaberrimis. *E.*

polystachyanlibus glabris angulatis differt. Sub hoc *Schrankiana* fl. t. 169. comprehendenda videtur.

- * 49. *Loesostoma annuatum*, species solitaria foliibus, caule repente, foliis quinquefaris patentibus linear-lanceolatis subserratis, funiculis annotinis articulatis. *Pluk.* t. 205. f. 2. *Dill.* t. 65. f. 9. *Fl. dan.* 127. *Schrank* fl. t. 162.

Ad Lodersleben. *Wallroth*. Inf. 26.

- * 50. *Phacelia nervosa*, caule subdiviso, foliis ovato-apiculatis erectis, lora elongata rectifolia, capsula exserta. *Dicks.* f. 10. f. 3. *Schwägrichen suppl. ad Hedw. spec. posth.* t. 1.

In arvis ad Hofleben. *Wallroth*.

- * 51. *Phacelia patens*, acaule, foliis lanceolatis nervosis serrulatis patentiusculis. *Hedw. stirp.* I. t. 10.

In argilla sterili sub rupe alabastrina in Bauerngraben prope Breitung. ☉

- * 52. *Gymnostomum fasciculare*, foliis oblongis acuminatis serrulatis, capsulae pyriformis operculo mammillato. *Hedw. spec. posth.* t. 4.

Bey Ziegelrode auf dem Birkenberge. *Wallroth*.

N. G. pyriforme omnino differt operculo rostrato.

- * 53. *Dicranum pellucidum*, foliis lanceolatis nervosis undulatis, capsula obovata cernua, operculo conico. *Dill.* t. 46. f. 25. *Schwägrichen suppl.* t. 48.

In umbrosis ad lapides des Mühlthals zwischen
Rosaleben und Leimbach. *Wallroth.*

- * 54. DICRANUM ADIANTOIDES, caule erecto labra-
moso, foliis distichis oblongo-lanceolatis ner-
vosis. *Dill. t. 34. f. 3. Hedw. stirp. III.*
t. 26.

Auf der Wiese bey Benndorf.

- * 55. DICRANUM VARIUM, caule simpliciusculo, fo-
liis lineari-lanceolatis integerrimis supremis
subsecundis, capsula subcernua, operculo acu-
minato incurvo. *Dill. t. 50. f. 59. Hedw.*
stirp. II. t. 34.

In argilla sabulosa, ad Ziegelrode. *Wall-
roth.*

- * 56. DICRANUM CERVICULATUM, caule simplicius-
culo, foliis lanceolato-subulatis integerrimis,
capsula ovata subcernua strumosa, operculo
rostrato. *Hedw. stirp. III. t. 37. A.*

In turfosis fossis ad Dölau.

- * 57. POLYTRICHUM AURANTIACUM, caule subdiviso,
foliis margine diaphano carinaque serratis, cap-
sulae angulatae apophysi obsoleta. *P. longi-
setum Swartz. musc. suec. t. 8. f. 16.*
Sturm. II. 4.

In palude Doelaviensi.

- * 58. TRICHOSTOMUM HETEROSTICHUM, caule ramo-
so, foliis lanceolatis patulis subsecundis, api-
ce canescente subserrato, seta recta, capsula
elliptica. *Dill. t. 47. f. 27. A. P. G.*
Hedw. stirp. II. t. 25.

In laevis des Neckendorfer Grundes bey Bischof-
rode. *Bok.*

- * 59. *TRICHOSTOMUM TORTILE*, caule simplici, foliis subulatis subheteromallis, siccitate tortilibus, capsulae oblongae operculo acuminato. *Schrad. Schwägrichen suppl. ad Hedw. spec. posth. t. 35.*

Bey Ziegelrode auf dem Birkenberge. *Wallroth.*

- * 60. *BARBULA RIGIDA*, trunco simplici, foliis lanceolatis obtusis enerviis margine inflexis, capsula oblonga erecta. *Dill. t. 49. f. 55. Hedw. stirp. I. t. 25.*

In muris limosis.

- * 61. *BARBULA CONVOLUTA*, caule simpliciusculo, foliis lanceolatis patentibus, perichaetialibus obtusis vaginantibus. *Dill. t. 48. f. 44. Hedw. stirp. I. t. 32.*

Bey Rolsleben häufig. *Wallroth.*

- * 62. *ORTHOTRICHUM OBTUSIFOLIUM*, foliis ovatis obtusis, dentibus octo geminatis, calyptra subpilosa. *Swartz. musc. frond. t. 4. f. 8.*

In falicibus vetustis.

- * 63. *LESKEA POLYCARPA*, caule repente, ramis procumbentibus, foliis ovatis acutis concavis nervosis, capsula subaequali. *Dill. t. 42. f. 65.*

In falicibus vetustis zwischen Wormleben und Unterrielsdorf. *Bok.*

- * 64. *BRYUM PYRIFORME*, foliis subulatis subflexuosis, capsula pyriformi pendula. *Dill. t. 50. f. 60. Hedw. stirp. I. t. 3.*

In fossis limosis prope Westowitz invenit *Wallroth.*

- * 65. *MNIUM LONGIROSTRUM* Bridel., foliis oblongis acuminatis marginatis serrulatis nervosis, capsulae pendulae operculo rostrato. *Dill. t. 53. f. 80.*

In nemusculo Seebensii.

Mn. punctatum differt foliis integerrimis Mn. cuspidatum, operculo conico.

- * 66. *HYPNUM STELLATUM*, foliis cordato-subulatis integerrimis subnerviis laxè reflexis, capsula subcylindrica cernua. *Dill. t. 39. f. 35. Hedw. spec. posth. t. 66. (H. polymorphum.)*

Auf der Benndorfer Wiese bey Delitzsch.

- * 67. *HYPNUM PALUSTRE*, foliis ovato-acuminatis homomallis margine superne inflexis integerrimis nervosis. *Dill. t. 37. f. 27. H. luridum Hedw. stirp. IV. t. 38.*

Auf der Benndorfer Wiese bey Delitzsch.

- * 68. *HYPNUM POPULUM*, foliis lanceolato-subulatis patentibus nervosis serrulatis margine reflexis. *Hedw. spec. posth. t. 70. f. 1—6. Turn. hibern. t. 16. H. implexum Turn. Leskea plumosa Bland. et Crom.*

In arboribus hinter dem Fasanenhaufe.

- * 69. *DIPHYSCIUM FOLIOSUM* Mohr. *Dill. t. 32. f. 13. Schmidel. Buxbaum t. I. f. I—XIV. Spreng. Anl. 3. t. VII. f. 69.*

In sylva Ziegelrodenſi prope viam, qua itur ad Querfurth, bey der Klappermühle. *Wallroth.*

In cortice quercuum annosarum im Bischofroder Walde über der Neckendorfer Mühle. *Bok.*

- * 82. *LECIDEA DRYINA*, crusta effusa alba pulverulenta, patellulis minoribus subglobosis demum planiusculis rugulosis atris, intus carnosus cinereo-fuscis.

In cortice quercuum et betularum.

- * 83. *LECIDEA ULLIGINOSA*, primum est gelatinosa, ubi simillima Collemati.

- * 84. *LECIDEA EHRHARTIANA*, crusta effusa rugoso-plicata rimosa albido-virescente, patellulis concavis marginatis flexuosis difformibus conglomeratis flavescentibus. *Achar. prodr. l. 2. f. 1.*

In ligno putrescente.

- * 85. *LECIDEA NIGRA*, thallo suborbiculari imbricato nigro, lobulis minutis inciso-crenatis, centralibus tenuissime ramulosis, patellulis concavis demum planis atris. *Engl. bot. 1161.*

In faxis des Ram- und Hutberge bey Eisleben. *Bok.*

- * 86. *LECIDEA PARADOXA*, crusta effusa subimbricata rufo-umbrina, lobis aggregatis planis marginatis demum convexis, patellulis pruinosis margine albo, tandem convexis nigris.

Ad terram auf dem Hutberge bey Eisleben. *Bok.*

- * 87. *VERRUCARIA EPIDERMIDIS*, crusta tenuissima effusa lactea, tuberculis confertis papillatis nigris.

In tenera epidermide Betulae albae.

- * 88. VERRUCARIA SPONGIOSA, crusta spongiola viridi, tubercula immersis ampulliformibus poro pertusis nigris. *Sphaeria Bernhardtii* in Röm. Arch. T. 4. p. 11. t. 1. f. 2.

Ad terram bey Eisleben. Bok.

- * 89. VERRUCARIA EPICAEA, crusta pallida, tuberculis immersis punctiformibus nigris.

Ad terram limosam in sylvis.

- * 90. RIVULARIA RUGOSA, gelatinosa pallida viridis granulosa rugosa, filamentis dichotomis, ramulis fasciculatis in pileis attenuatis. *Rock. bot. Beytr. I. 280.*

In rivulo prope Breitungem.

- * 91. ENDOCARPON TEFEROIDES, thallo crustaceo subfoliaceo cinereo, ambitu sapando sublobato, thalamiorum ostiis prominulis atris.

Ad terram auf dem Hutberge bey Eisleben cum Parmelia lentigera et fulgente. Bok.

- * 92. BAEOMYCES CAESPITICUS, thallo crustaceo cartilagineo lobato, laciniis pinatifido-incisis lacero-crispis laete viridibus subtus albis, cephalodiis subsessilibus conglomeratis subrugosis rufis.

Inter muscos auf dem Zorge et in sylva Loderslebenfi. Huc Lecidea demissa fl. hal. n. 1309. quae ergo delenda.

- * 93. PARMELIA EXIGUA, crusta leprosa tenui obscure cinerea, scutellis minutis aggregatis planis atris, margine albo crenulato, demum evanescente.

In cortice vetusto Quercuum.

- * 94. *PARMELIA LUTEA*, crusta effusa pulverulenta cinereo-pallida, scutellis minutis sparsis planiusculis fulvis, margine tenui dilutiori pulverulento. *Dickf. t. 2. f. 6.*

Ad terram in sylvis.

- * 95. *PARMELIA CORRUGATA*, thallo coriaceo membranaceo rugoso-plicato glauco-virescente, subius nigro-fusco fibrilloso, laciniis rotundato-lobatis plicato-flexuosis rugulosis, scutellis concavis amplissimis flexuosis rufis, margine tenui crenulato. *Dill. t. 24. f. 79. Jacq. coll. 3. t. 9. f. c.*

Ad salices annosas, bey Eisleben. *Bok.*

- * 96. *PARMELIA SPRENGELII*, thallo cartilagineo sordide viridescente, laciniis erectiusculis lineari-lanceolatis nodulosis subius pallidioribus, scutellis pedicellatis carnis. *Flörke.*

In rupe unica ad Giebichenstein. Primus invenit *Cuſter Helvetus.*

- * 97. *PELTIDEA HORIZONTALIS*, thallo glauco fuscoque viridescente glabro, subius venis nigris reticulato, lobulis fertilibus abbreviatis, apotheciis terminalibus planis horizontalibus transverse oblongiusculis rufo-fuscis integris. *Achar. lichenogr. 515. Dill. t. 28. f. 104. B. Fl. dan. 533.*

In sylva Loderslebenfi.

- * 98. *CONIZOMA FLOCCULOZA*, minutissima diffusa densa, pallide ochracea, filamentis gemculatis subramosis, geniculis alternatim solutis, articulis prismaticis alternatim refractis.

Roth. catal. bot. 1. p. 192. tab. 4. f. 4. tab. 5. f. 6

Copiose ad lapides in lacu salso *Conf. glomeratae* varietate marina.

99. *CONFERRA BRONCHIALIS* e vegetabili regno in animale releganda esse videtur. Est enim *Vibrio* paxillifer *O. F. Müller animalc. infus. n. 62. tab. VII. f. 3—7. Stäbegevier Schrank. faun. boic. III. Abth. 2. p. 48.* Analogon est animalculum, quod *Stäbgenthier O. F. Müller* appellat in *kl. Schriften*, p. 6. Sale adpersa corrugantur et evanescunt. Adhaerent *Confervis*; articuli haud raro ovales sunt, plerumque parallelepipedei, linea longitudinali perducta.

100. *ULVA PROLIFERA*, tubulis teretibus filiformibus ramosis, ramis e basi tuberculosa sparsis capillaribus. *Ond. fl. dan. 763. f. 1. Conferva crinita Roth. catal. I. 162. tab. 1. f. 3. Conferva Plinii Lobel. ic. 2. 257.*

In der Salzke copiose, et in paludibus lacui salso conterminis.

101. *SPHAERIA CERATOSPERMUM*, ovata sparsa atraintus albida, ostioliis spinulosis e medio prorumpentibus. *Tq de fung. meklenb. 2. 17. f. 131.*

In truncis *Quercuum* annosarum.

102. *SPHAERIA FIMBRIATA*, epiphylla subcircinata: ostioliis spinulosis incurvis basi fimbria albicante cinctis. *Batsch el. fung. 1. 30. f. 231.*

In foliis *Coryli* et *Carpini*.

- * 103. SPHAERIA MEDIA, simplex. Sphaerulis sparsis ligno totis immersis, ostiolo prominente latiusculo.

In ramis aridis, sub epidermide.

- * 104. SPHAERIA MAMMAEFORMIS, simplex. Sphaerulis subglobosis laevibus subconfluentibus, ostiolo papillato. *Perf. ic. pict. t. 5. f. 6. 7.*

Ad ligna sicca.

- * 105. SPHAERIA ALBICANS, simplex subirregularis, Sphaerulis papillatis; subiculo sordide-albido subimmerfis. *Tode fung. meklenb. t. 10. f. 87.*

In salicibus cavis.

- * 106. SPHAERIA TILIAE, sparsa ampullaeformis glabra annulata circumscissa atra, orificio largo.

In ramis aridis Tiliae.

- * 107. XYLOMA HERBARUM, confertum oblongum molliusculum fuligineum, corticis margine repando subalbicante. *Albertini et Schweinitz fung. niesk. p. 65. tab. 4. f. 6.*

In Potentillae vernaе foliis. *Bok.*

- * 108. XYLOMA ALNEUM, minutum sparsum planiusculo plicatum lucidum atrum.

In foliis Alni glutinosae.

- * 109. HYSTERIUM QUERCINUM, erumpens flexuosum subventricosum molle nigrescenti-cinereum. *Tode fung. meklenb. t. 8. f. 64.*

Ad ramos quernos.

- * 110. *SCLEROTIUM DURUM*, oblongum durum stratum nigrum.

In caulibus aridis umbellatarum.

- * 111. *SCLEROTIUM FUNGORUM*, difforme lobatum pallidum paraliticum. *Tode fung. meklenb. t. 1. f. 5. c. d. e.*

In fungis putrescentibus.

- * 112. *SCLEROTIUM QUERCINUM*, epiphyllum sparsum convexum laeve sordide pallidum subnigrescens.

In foliis deciduis Quercuum.

- * 113. *PHYEARUM CONFLUENS*, confertum sessile cinereum, peridiis variis subconfluentibus, capillitio compacto.

In Hypno lutescente.

- * 114. *BOVISTA PUSILLA*, gregaria minuta ovata nigrescens, squamulis furfuraceis albidis. *Perf. syn. 1. 138. Batsch elench. fung. t. 41. f. 228.*

Ad Roseleben. *Wallroth.*

- * 115. *PHYEARUM CONTEXTUM*, acaule flavum, peridiis ut plurimum subcompressis flexuosis confluentibus. *Perf. syn. 1. 168.*

Ad muscos. *Wallroth.*

- * 116. *TRICODERMA PYRENIO*, cortice tomentoso aureo, nucleo molliusculo exalbido.

In ligno sagineo putrescente. *Wallroth.*

- * 117. *AECIDIUM TUFFILAGINIS*, macula purpurascens flava, peridiis immersis, caespitulo plano.

In foliis Tuffilaginis Farfarae.

- * 118. *AECIDIUM OROBI TUBEROSI*, caespitosum ovatum albidum, peridiis flavescens.

- * 119. *UREDIO CONFLUENS*, flava appianata circumnata confluenta.

In Mercuriali perenni. *Bok.*

- * 120. *LEOTIA LUBRICA*, flavo-virens subremellata pileo convexo. *Fl. dan.* 719.

In sylvis ad Eisleben. *Bok.*

- * 121. *HELVELLA LEUCOPHAEA*, pileo libero crispo pallido-albescente, stipite costato lacunoso basi ventricoso. *Sowerby fung.* t. 39.

In monte dem Vogelsberg bey Bessstadt. Octobr.

- * 122. *Peziza HYETERIUM*, sparsa nigra mollis oblonga rugosa, primum clausa; dein hians ore oblongo.

In lichenibus crustaceis quercuum annosarum.

- * 123. *PEZIZA OLIVACEA*, interne fusca, externe rugulosa olivacea orbicularis plana, margine angusto convexo. *Batsch el. fung.* f. 51.

In truncis subputridis. *Wallroth.*

Addendus:

- * 124. *DIANTHUS SYLVATICUS*, floribus subfoliariis, squamis calycinis ovato-lanceolatis tubo calycis brevioribus, petalis barbatis duplicatodentatis, foliis lineari-lanceolatis glabris obsolete subtrinerviis. *Hopp.*

Ad Ziebigk bey Radegast invenit *F. Naumann*, ornithologus eximius, exemplaria viva et iconem mecum communicavit elegantia summa et dexteritate pictam.

